

POCKET

عابد کینٹ میٹر یا میڈیکا



کتاب خانہ طبیب | Facebook

مرتب: • ڈاکٹر عابد
• ڈاکٹر مسعود حفیظ

عثمان پبلی کیشنز

پاک

عابد کینٹ میڈیر یا میڈریکا گائیڈ

مصنف

ڈاکٹر مسعود حفیظ رفاعی ایم۔ اے

نظر ثانی

حکیم و ڈاکٹر عابد

ڈاکٹر احمد مسعود ایم۔ اے

ناشر عثمان پبلی کیشنز

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-7640094,

سیل پوائنٹ

جلال دین ہسپتال بلڈنگ اردو بازار لاہور

موبائل: 0333-4275783

فون نمبر

انتساب

امراض کے یلغار سے دکھی انسانیت کے

محسنِ عظیم

سید محمد رفیع منہا


کے نام

فہرست مضامین


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲	ایونٹا	۹	حرفِ اول
۴۷	ایونٹا	۱۲	کچھ اس میٹر یا میڈیکا کے بابے میں
۵۰	ایونٹا	۱۵	آرٹھنیکم البم
۵۳	ایونٹا	۱۸	آرٹھنیکم آئیوڈائیڈ
۵۵	ایونٹا	۲۰	آرٹھنیکم ٹائیٹریکیم
۵۷	ایونٹا	۲۳	آرٹھنیکم ٹیلیکیم
۵۹	ایونٹا	۲۴	آرٹھنیکم میوڈ
۵۹	ایونٹا	۲۶	آرٹھنیکم مانٹ
۶۲	ایونٹا	۲۸	آرٹھنیکم ورس
۶۸	ایونٹا	۲۹	آرٹھنیکم ڈیوڈیم
۷۰	ایونٹا	۳۱	آرٹھنیکم ابراہیم
۷۲	ایونٹا	۳۳	آرٹھنیکم ایکاک
۷۶	ایونٹا	۳۵	آرٹھنیکم سی موسا
۷۸	ایونٹا	۳۷	آرٹھنیکم
۸۲	ایونٹا	۴۰	آرٹھنیکم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۷	ٹیری بنقینا	۸۳	ایمرا گیشیا
۱۴۰	جٹیشیا	۸۶	ایونیم کارب
۱۴۱	جلی میم	۸۹	اینٹی مونیم ٹارٹ
۱۴۴	چائنا	۹۲	اینٹی مونیم کروڈ
۱۴۷	چینی نم سلف	۹۵	بیشیا
۱۴۹	چیلی ڈونیم	۹۸	برائی اونیٹا
۱۵۱	چیو بنقنس	۱۰۳	بربرکس ونگرس
۱۵۳	ڈائسکوریٹ	۱۰۵	بریٹا کارب
۱۵۶	ڈوروسرا	۱۰۷	بلاٹا اوری
۱۶۰	ڈرکامارا	۱۰۸	بوریکس
۱۶۳	ڈیجی ٹیلیس	۱۰۹	بیلٹا ڈونا
۱۶۹	رٹاکس ۱۶۶	۱۱۳	پاڈو فائلم
۱۷۰	روڈو ڈینڈرن	۱۱۶	پیرولیم
۱۷۲	ریٹونیا	۱۱۸	پلائینا
۱۷۴	رین کولس بلب	۱۲۰	پلسٹیل
۱۷۵	ریو میکس	۱۲۴	پلمیم ٹیلیکم
۱۷۷	ریو ہم	۱۲۶	تھوجا
۱۷۹	رنجیر	۱۳۰	ٹوبرکین لینیم
۱۸۰	رنکیم ٹیلیکم	۱۳۲	ٹوبیکیم
۱۸۱	سابل سیرولاٹا	۱۳۵	ٹیرنولا

صفحو	مضمون	صفحو	مضمون
۲۱۸	سیما	۱۸۲	سار سا پرپلا
۲۲۰	سیکیل کار	۱۸۶	سائیز بچیم
۲۲۲	سیلینیم	۱۸۷	سایکیونا
۲۲۳	سینی کولا	۱۸۹	سانا
۲۲۵	نفسورس	۱۹۱	سبادیلا
۲۲۷	ناتولا کا	۱۹۲	سبانا
۲۲۹	ناتی سوشکا	۱۹۴	سپانجیا
۲۳۰	نورک ایڈ	۱۹۶	سپانی جیلا
۲۳۲	نیرم میسکیم	۱۹۸	شانی سیکیا
۲۳۴	کاربالاک ایڈ	۲۰۰	شائم
۲۳۵	کاربو انیاس	۲۰۲	سٹرا مونیم
۲۳۷	کاربو ورج	۲۰۴	سفلینم
۲۳۹	کاسٹیم	۲۰۶	سلف
۲۴۱	کافیا کروڈا	۲۰۸	سلیشیا
۲۴۲	کاپیکیم	۲۱۰	سمبوکس ٹائیڈا
۲۴۳	کالمیا	۲۱۲	سمفا ٹم
۲۴۵	کالین سونیا	۲۱۳	سمی سی فینوگا
۲۴۶	کالوسنتہ	۲۱۳	سٹلو نیریا
۲۴۷	کالونائلم	۲۱۵	سورینیم
۲۴۸	کالی بامیکرام	۲۱۷	سیانو تھس



صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۹	کینٹرکس	۲۵۰	کالی برومیٹم
۲۹۲	کیوریوم ٹیلیکیم	۲۵۲	کالی کارب
۲۹۵	گرنیٹس	۲۵۴	کروٹن گلب
۲۹۷	گلوٹائن	۲۵۵	کروکس شایوا
۲۹۹	گوس پیٹم	۲۵۶	کریازوٹ
۳۰۱	لانی سین	۲۵۸	کریٹے گس
۳۰۳	لایکو پوڈیم	۲۶۰	کلیریا آرس
۳۰۵	لیم گلب	۲۶۱	کلیریا فاس
۳۰۸	لو بیلیا	۲۶۲	کلیریا کارب
۳۱۰	لیڈم پال	۲۶۴	کو کا
۳۱۲	لیکے سس	۲۶۶	کو کوس
۳۱۴	مانکس	۲۶۸	کونیم
۳۱۶	مرکوریس	۲۷۰	کیپی کم
۳۱۸	مرکوریس بن آیوڈائیڈ	۲۷۲	کیکٹس
۳۱۹	مرکوریس پریو آیوڈائیڈ	۲۷۵	کیلنڈولا
۳۲۰	مرکوریس سال	۲۷۸	کیلٹیٹیم
۳۲۲	مرکوریس سائی	۲۸۰	کیمفر
۳۲۳	مرکوریس کار	۲۸۳	کیمو ملا
۳۲۵	مٹی فولیم	۲۸۵	کینا بس انڈیکا
۳۲۶	میڈو رینم	۲۸۷	کینا بس شایوا



	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۸	در یثیم در ایٹ	۳۲۸	مز یثیم
۳۵۰	در یو یونیم	۳۲۹	ملی لوفس
۳۵۱	نایپر یکم	۳۳۰	میورکس
۳۵۲	نایپر اسٹس	۳۳۲	ناجا
۳۵۴	نایپر و کوٹا میل	۳۳۳	نکس موسکاٹا
۳۵۵	نایپر سیامس	۳۳۵	نکس وامیکا
۳۵۷	نایپر سلف	۳۳۸	نایپر سلف
۳۶۰	نایپر لاوا	۳۴۰	نایپر میور
۳۶۱	نایپر میل	۳۴۲	نایپر یکم
۳۶۳	یو پے ٹوریم پرف	۳۴۴	ور یکم
۳۶۶	یو فریشیا	۳۴۶	ور یثیم البم

حرفِ اوّل

ہومیو پیتھی ، جیسا کہ ہر ہومیو پیتھ کو بخوبی علم ہے ، علاج بالمثل ہے یعنی جس دوا کی بیشتر علامات (خاص کر مخصوص علامات) مریض کی اپنی علامات سے مطابقت رکھتی ہوں ، وہی دوا اس مریض کے لئے شفا بخش ہوگی۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اور صرف ہومیو پیتھک میڈیا میڈیکا (خواص الادویہ) کا پورا علم مکمل ہومیو پیتھک معالج بنانے کا ضامن ہو سکتا ہے۔

جب سے ہومیو پیتھک طریق علاج کی عظیم دریافت منظر عام پر آئی ہے اس وقت سے اب تک ہومیو پیتھک خواص الادویہ پر مبنی ان گنت میڈیا میڈیکا معرض وجود میں آچکے ہیں۔ نہ صرف انگریزی زبان میں بلکہ اردو میں بھی ایسی متعدد کتب موجود ہیں۔ بلاشبہ ہر مصنف نے بڑی ہی جانفشانی اور پوری پوری قابلیت سے اپنی اپنی تصانیف ترتیب دی ہیں اور ان جلد علمی خدمات کا اعتراف اور ان کی قدر کرنا جہاں فرض ہے۔

تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیر نظر میڈیا میڈیکا پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وجہ جواز کے طور پر چند ایک معروضات پیش خدمت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

عام طور پر جو ہومیو پیتھک میڈیا میڈیکا دستیاب ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت مشترک طور پر نظر آئے گی۔ وہ یہ کہ ہر دوا (خاص کر اہم ادویہ) کی علامات کا پھیلاؤ کچھ زیادہ ہی وسیع ہوتا ہے۔ ہر مصنف کی بالعموم یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ادویہ کی زیادہ سے زیادہ علامات بلکہ تا دمِ تحریر دریافت شدہ تمام تر علامات کو متعلقہ دوا کے ضمن میں بیان کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوشش اپنی جگہ نہایت اہم اور مستحسن ہوتی ہے۔ کہ دوا کے خواص کا پورا علم حاصل کرنے میں اس سے مدد حاصل ہوتی ہے لیکن اس صورت حال سے جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں ان سے بھی انکار ممکن نہیں۔

ایک تو یہ علامات کی وسیع جھڑ سے ایک عام ہومیو پیتھک کو کئی ایک مختلف ادویہ میں یکسانیت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے لئے مریض کو بالمش دوا جاننا بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ دوسری وقت یہ پیش آتی ہے کہ علامات کی بہتات کے باعث ایک عام ہومیو پیتھک کے لئے ادویہ کے خواص کو ذہن نشین کرنا کافی محال ہو جاتا ہے۔

زیرِ نظر میڈیا میڈیکا میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ ادویہ کی عام علامات جو بیک وقت کئی ایک ادویہ میں مشترک ہوتی ہیں سرے سے نظر انداز نہ ہوں بلکہ مناسب طریق پر اختصار سے پیش کر دی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر دوا کی مخصوص علامات کچھ ایسے انداز سے تحریر کر دی جائیں کہ وہ آسانی قاری کے ذہن نشین ہو سکیں اور ان ہی علاماتِ فارقہ کی روشنی میں وہ مختلف ادویہ کے فرق کو بخوبی یاد رکھ سکے۔

میڈیا میڈیکا کی بڑی بڑی ضخیم اور مفصل کتب کا بھی اپنا ایک اہم مقام ہے۔ ہم ان کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے بلاشبہ ریفرنس بکس

یعنی حوالہ دیکھنے کی کتب کے طور پر ان کی اپنی ایک مسئلہ اہمیت ہے۔
 لیکن ذہن نشین کرنے کے لئے خواص الادویہ کی ایک ایسی کتاب کی
 ہی ضرورت ہوتی ہے جس میں اگرچہ اختصار سے کام لیا گیا ہو لیکن
 ساتھ ہی ساتھ اہم اور ضروری نکات کو نظر انداز بھی نہ کیا گیا ہو۔
 زیر نظر تصنیف میں راقم الحروف نے اسی ضرورت کو پورا کرنے کی
 مقدور بھر کوشش کی ہے۔ یہیں یقین ہے کہ یہ پیشکش اہل فن حضرات
 کے لئے بیحد ممد و معاون ثابت ہوگی۔ بایں ہمہ اگر کسی وقت کسی دوست
 کو اس سلسلہ میں کوئی خامی یا کوتاہی محسوس ہو تو یہیں اس سے ضرور
 آگاہ کریں۔ تاکہ آئندہ اشاعتوں میں اس کا تدارک کیا جاسکے۔

منعوض حفیظ برناعی



کچھ اس

میٹر یا میڈیکا

کے بارے میں

اس میٹر یا میڈیکا کا اولین مقصد چونکہ یہی ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک عام ہومیو پیتھ کے ذہن نشین ہو سکے اس لئے روایتی انداز سے ہٹ کر اس کی ترتیب تدرین کچھ ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ دوا کے استعمال کا ہر پہلو حافظہ میں محفوظ ہوتا چلا جائے۔

(۱) کسی دوا کی اگر کوئی بہت ہی مخصوص علامت ہے تو اس کا ذکر بالکل ابتداء میں کر دیا گیا ہے۔

ہومیو پیتھی میں اگرچہ امراض کے نام کوئی اہمیت نہیں رکھتے ، ہومیو پیتھی میں تو براہ راست مریض کی مجموعی علامات کا علاج کیا جاتا ہے لیکن عام رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ مرض کے نام کے لحاظ سے متعلقہ ادویہ فوری طور پر ذہن میں آسکیں۔ اس طریق کار کے مستحسن یا غیر مستحسن ہونے سے قطع نظر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرض بھی آخر چند ایک علامات کا ہی مجموعہ ہوتا ہے اور مرض کا نام آتے ہی اس سے متعلقہ علامات بھی مجموعی طور پر ذہن میں آ جاتی ہیں۔ لہذا یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ دوا کی نام علامات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے شروع میں ان چیدہ چیدہ امراض

کا ذکر کر دیا جائے جن میں وہ دوا عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔

(۲) دواؤں کی علامات کے بیان میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ عمومی

علامات کے دوران اگر اس دوا کی کوئی مخصوص علامت بھی آگئی ہے

تو اس کو خاص طور پر خط کشیدہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کسی علامت کے

نیچے آپ لکیر کیپنی ہوں پائیں تو اسے دوا کی مخصوص علامت سمجھیں

علامات کی تفصیل کے دوران اگر کوئی ایسی خاص علامت آگئی

ہے جو اس دوا کے علاوہ مشترک طور پر کسی مزید ایک دوا یا ایک سے

زائد ادویہ میں پائی جاتی ہو تو اس علامت کے فوراً بعد بریکٹوں یعنی واوین

میں ان مزید ادویہ کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پاؤڈر فائلیم میں سر

کی علامات کے دوران ایک علامت آتی ہے ”بچہ و انت نکلنے کے

زمانہ میں اپنا سر اور صدر چھپے اور ستریکہ میں دھنسا ہے۔ یہ علامت

چونکہ صشر پاؤڈر فائلیم میں ہی نہیں بلکہ ایمپس اور بیلادونا میں بھی پائی

جاتی ہے اس لئے علامت کے ساتھ ہی بریکٹوں میں ان مزید دواؤں

کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صشر اس

ایک علامت کی بنا پر ہی پاؤڈر فائلیم مریض کو نہیں دی جا

سکتی بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاؤڈر فائلیم، ایمپس اور بیلادونا تینوں میں

کس دوا کی دیگر بیشتر علامت مریض کی علامات سے مطابقت

رکتی ہیں۔ تینوں میں سے جس دوا کی زیادہ تر علامات مریض کے

بائل ہوں گی وہی دوا مریض کے لئے پوری طرح سودمند ہوگی۔

دوا کے انتخاب میں عام جسمانی علامات کے علاوہ ایک تو

مریض کی ذہنی کیفیات اور دوسرے علامات کو گھسانے اور بڑھانے

والے عوامل بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس لئے ہر دوا کے متن میں ان امور کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

علاوہ بریں ایک ہومیوپیتھ کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی دوا کا دیگر ادویہ کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی کسی دوا سے پہلے یا بعد میں کون سی ادویہ کا استعمال موزوں ہے اور کن ادویہ کا استعمال غیر مناسب ہے۔ نیز یہ کہ مرہین پر استعمال شدہ کسی دوا کا اثر اگر کسی ضرورت کے تحت نذائل کن مقصود ہو تو مصلح کے طور پر کون سی ادویہ استعمال ہوں گی علاوہ بریں یہ کہ کوئی دوا عام طور پر کن کن طائفوں میں مستعمل ہے۔ ایسے جملہ امور بھی جہاں جہاں ضروری سمجھے گئے۔ اس میٹریا میڈیکا میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ غرضیکہ آپ اس میٹریا میڈیکا کو دوسری ضخیم کتب کے مقابلہ میں کسی لحاظ سے تشنہ نہ پائیں گے۔ بلکہ اختصار کے باوجود اسے ایک جامع میٹریا میڈیکا پائیں گے۔

ARSENICUM ALBUM

آرسینکیم البوم

خصوصی علامات

- ۱۔ پیاس بار بار لگے لیکن پانی تھوڑا تھوڑا ہی پیا جائے۔
- ۲۔ بچہ کمزوری، قوت حیات یعنی طاقت کے جلد جلد سلب ہونے کیساتھ
- ۳۔ دماغی بے چینی، لیکن جسمانی طور پر اس قدر کمزور ہو کہ ہل نہ سکے خصوصاً رات کو۔
- ۴۔ مریض سمجھے کہ تکلیف لا علاج ہے، موت کا خوف۔
- ۵۔ جلن وار درد، ماؤنہ حصص آگ کی طرح جلیں لیکن گرامہٹ سے ہی افاتہ ہو۔

- ۶۔ لیٹ نہ سکے کیونکہ لیٹنے سے دم گھٹنے کا خدشہ ہو۔
- ۷۔ غذا کی خوشبو یا غذا کی صورت برداشت نہ کر سکے (کاٹیکیم، سپیا)

عام استعمال

یہ دوا جسم کے جلد آلات اور ساختوں پر گہرا اثر کرنے والی ہے۔ غذا سی سخت سے ترکان ہو جائے، سمندر کے کناروں کے عوارض، پھلوں کے بعد کے نقصانات اس کے زیر اثر آتے ہیں۔ شراب یا تمباکو سے جو عوارض پیدا ہوئے ہوں، جسم کے ذہریلے مادوں سے خون خراب ہو گیا ہو، خراب گوشت یا

مچھلی وغیرہ کے استعمال سے پیدا ہونے والے عوارض، ایسے امراض جو ہر سال موت
لوٹ کر آتے ہوں، خون کی کمی، سبز جیس، مدیر یا کی کمزوری، جلدی عوارض
سخت اور مسک لاغری، سیرقان، سل، جلد پر جھریاں پڑ جانا، استسقا اور
سوجن اور ہر قسم کے جریان خون وغیرہ میں مستعمل ہے۔ استسقا حمل کا خطرہ
ہوتے ہی اس کی حد تک ایک خوراک بسا اوقات استسقا کو روکنے کی ضمانت
ہوتی ہے۔

عمومی علامات

رنج، بے چینی، موت کا ڈر، تنہائی کا خوف، ایک بستر سے دوسرے
بستر کو جانا چاہے لیکن کسی طرح قرار نہ ہو۔

دورہ سے آنے والا دورہ سر (صرف یہ ایک ایسی علامت ہے جس میں
مٹنڈک سے کمی ہوتی ہے۔ آد سینکیم البم کی دیگر علامات گرامہٹ سے ہی کم
ہوتی ہیں اور مٹنڈک سے بڑھتی ہیں،

آنکھوں میں دم، کھجلی، سرخی، پوٹوں کا سوجنا، پوٹوں کا چپک جانا،
آنسو بہنا، جلن۔

ناک میں زہریلا زخم، کینسر، سخت جلن، زکام میں جلتا ہوا پانی ناک سے
بہے، مکان میں یا گرمی سے کم ہو جائے۔ سردی سے زیادہ ہو۔ کھانے کی
خوشبو برداشت نہ ہو۔

چہرہ اترا ہوا، زرد، ڈراؤنا، سر چہرہ، ناک سیلی، ہونٹ سوجے ہوئے، خون
بہتا ہوا، سیاہ خشک ہونٹ جس کو تر کرنے کے لئے بار بار زبان پھیرنی پڑے۔
دانت میں شدید درد جیسے کوئی شدید جھکے مارتا ہے، بستر میں یا

گرمابٹ سے کم ہو، مسوڑھے سے بچے ہوئے نیلے اور جلن دار، زبان نیلی سفید
جودی یا سیاہ، حلق میں جلن

تمام کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ کڑوا، نہایت سخت پیاس لیکن
تھوڑا تھوڑا پانی پینے سے تسکین ہو جاتے، کھانے پینے کے بعد تھوڑا
کھانے کے خیال سے متلی ہو تو کالچیکیم اور کھانے کی بو سے متلی ہو تو
سیپا دوا ہوتی ہے)

دست آنا، گہری سبز آؤں، سیاہ پانی کا پتلا، بدبودار پاخانہ، انٹرولوں
میں مروڑ، پاخانہ جلن دار

کھانے پر ایسا محسوس ہو کہ سینہ میں دھواں بھرا ہے (چائنا)، بغم کم
بعض دفعہ خون کی چھینٹ بھی ہو۔ سانس پھونکنا خاص کر چڑھائی چڑھنے
پر اور رات کو لیٹنے میں۔ دم گھٹنے کے ڈر کی وجہ سے لیٹ نہ سکتا۔ خشک
اور تھکا دینے والی کھانسی، رات کو دورہ سے آئے۔ سینہ میں رکاوٹ
اور جلن، دھڑکن خاص کہ رات کو چیت لیٹنے پر۔
بخوابی، برابر بے قراری اور گھبراہٹ۔

بخار بہت تیز ہو، باری سے یا وقفہ سے آنے والا بخار، غصہ تیزی یا
جراثیمی بخار جن کے ساتھ شدید کمزوری، بے چینی اور جلن کا احساس ہو،
نرسام جو آدھی رات کے بعد شدت اختیار کر لے۔

زیادتی :- مرطوب موسم میں، آدھی رات کے بعد، ٹھنڈک سے، ٹھنڈک
پانی سے یا ٹھنڈی غذا سے، سمندر کے کنارے، دھوپ سے
کمی :- گرمی سے، سر کو اٹھائے رکھنے سے، گرم چیزوں کے
پینے سے۔

معاون :- کاربودیج ، فاسفورس ۔

مصلح :- چائنا ، گریفائیٹس ، ہیرسلفر ، اپیکاک ، نکس و امیکا ،

دریٹرم البم ۔

طاقت :- ۶ سے ۲۰ تک نیز بڑی طاقتیں بھی مستعمل ہیں ۔

ARSENICUM IODIDE

آرسینکیم آیوڈائیڈ

خصوصی علامات

۱۔ تمام اخراج خراش دار اور بدبودار

۲۔ سہل اور دق کی سی علامات ، اندھ کنزوری ، نبض تیز اور شویدہ
بار بار نمودار ہونے والا بخار ، شرکے پسینے ۔

عام استعمال

انفلوئنزا ، بخار ، پرانے زکام اور نزلہ اذن میں مفید ہے ، جن
میں اخراج خراش دار ہوتے ہیں ۔ علاوہ بریں ناک کی اندرونی ساختوں کا
سوج جانا ، بہرائین ، بوڑھوں کے دل کی سوزش ، قلب پر چربی چھا جانا
نبض کا جھٹکے دار تیزی سے چلنا اور فوطوں کی سوزش نیز بالخصوص سہل اور
دق میں مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

سر چکرائے اور ساتھ ہی سر کانپتا ہوا محسوس ہو یا مخصوص بوٹے افراد میں، ناک سے پانی کی طرح پتلا، خراشدار، جلا نیوالا اخراج اندرونی اور بیرونی نھنوں سے گزرے۔ چھینکیں آتی ہوں، بے فیوہ یعنی بنجار کاہی، مزمن نزلہ، ناک سوچی ہوئی، بکثرت گاڑھی زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہو، ناک میں زخم ہوں، جھلیاں دکھتی اور چھلی ہوئی ہوں، چھینکنے سے مرض میں زیادتی ہو، حنجرہ میں جلن، لوز میں سوجھ ہوئے، ہونٹوں کی جھلیاں موٹی ہو گئی ہوں، سانس بدبودار آتا ہو، غدود ماؤف ہوں، خناق ہو۔

خنازیری مدخشم، درد گوش کے ساتھ بدبودار، جلانے والی رطوبت خارج ہو، کان کا پردہ سخت ہو گیا ہو، جلن دار تیز زکام ہو۔

معدہ میں درد ہو اور کلیجہ جلتا ہو، کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد قے آجاتی ہو، تکلیف دینے والی مثلی ہو، پیاس شدید ہو اور پانی پینے سے فوراً قے ہو جائے۔

خفیف، سجنے والی کھانسی کے ساتھ نتھن خشک اور بند ہوں، فونیا جو اچھا ہونے میں نہ آئے، براںکو فونیا جو بنجار کے بعد ہو جائے، آواز بالکل بیٹھ گئی ہو۔

بنجار بار بار چڑھ جاتا ہو اور پینے آتے ہوں، رات کو پینے کی وجہ سے کپڑے تر پتر ہو جائیں، نبض تیز، کمزور اور بے قاعدہ چلے، سردی لگے مگر سردی کی برداشت نہ ہو۔

جلد خشک ہو، بھوسی اترتی ہو، خارش ہوتی ہے، جلد پر ٹپے بڑے

کھڑکھڑاتے ہوں، جن کے نیچے کچی جگہ نمودار ہو، مچھل کی طرح کے چھلکے
جسم سے اترنے کا مرض، خنازیری غدو کا بڑھ جانا، آتشکی گٹیاں، واٹر جی کا
ایگزیا جس سے پانی کا ساموا نکلے، خارش ہو، دھونے سے تکلیف پڑھے،
چہل میں بھی مفید ہے۔

طاقت :- ۳x سے ۳۰ تک اور اوپر

ARGENTUM NITRICUM

ارخیم نائٹریک

خصوصی علامات

- ۱۔ غیر معمولی یا مسلسل دماغی محنت سے ہونے والی عادی مرض من تکلیف
- ۲۔ آنکھوں میں سرخی جیسے لگائے کے کچے گوشت کا رنگ ہوتا ہے۔
- ۳۔ معدہ کی مختلف تکالیف کے ساتھ ریاح کے اخراج کی زیادتی۔
- ۴۔ دست کٹے ہوئے باریک گھاس کی طرح کے، کچھ دیر پڑا رہنے
پر سبز ہو جاتے۔
- ۵۔ جماع کے بعد شرمگاہ سے سیلان خون۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر دماغ اور حرام مغز پر نہایت واضح ہوتا ہے

حرام مغز میں مصلوح اور بے حس ہونے کا احساس ہو، سر میں گرانی، ہاتھ پاؤں میں درد، میٹھی اشیاء بکثرت کھانے کی رغبت کیسا تھ نظام انہضام میں نفع اور ریج کی کثرت ہو اور ریج بلند آواز سے خارج ہو تو اس دوا کا استعمال نافع ہوتا ہے۔

عمومی علامات

کام کرنے کو مجباً نہ چاہے، خود کشی کرنے کو طبیعت چاہے، مایوسی، سر ہکچکائے، کان میں جھنجھٹ، سر کی طرف دوران خون اور کپٹیوں میں تسکین، درد سر جو کہ ٹپا کس کر باندھنے سے کم ہو، کان بند معلوم ہوں۔ پیوٹوں میں سرخ کھنڈ پڑے ہوتے، کھجلی اور جھین ہو، پیوٹے سوجے ہوتے اور موٹے، آنکھ کے اندر کی سفیدی کی سوجن، آشوب چشم بکثرت کیحڑ والا۔

تصبح کو منہ سے بدبو آئے، زبان کی نوک سرخ اور دانہ ابرے ہوتے، زبان کے بیچ میں سرخ لکیر۔

منہ کا ذائقہ میٹھا، کھلا، شکر کھانے کو بہت جی چاہے (سانا)۔ ہر دفعہ کھانے کے بعد ٹھکار آتے اور ریاح کی وجہ سے معلوم ہو کہ پیٹ پھٹ جاتے گا۔ آئس کریم کھانے کے بعد سائے پیٹ میں پھیل جانے والا درد، گڑگڑاہٹ،

پانخانہ سبز، بدبو دار آؤں اور آواز کے ساتھ ریاح خارج ہوں، پیٹ پھٹ کی آواز پیدا ہو، ریاح بہت زور سے خارج ہو۔

پیشاب سرخ، سیاہی مائل، اس کے نیچے یورک ایسڈ کے ذرے بیٹھ

جائیں، پیشاب خود بخود ہو جائے، رات کو پیشاب نہ لگے۔

مرووں میں نامردی، عضو سکڑا ہوا، سوزاک، مستورات میں مباشرت کے وقت درد اور اندام نہانی سے خون کا اخراج، رحم کا باہر نکل ٹپنا، رحم کی گردن میں گھاؤ، حیض بے قاعدہ خواہ بہت جلد خواہ بہت دیر کو، خواہ کثیر المقدار خواہ قلیل ہو لیکن ہمیشہ گاڑھا جلتا ہوا خون نکلے، سیلان رحم زرد اور چھینے والا بکثرت ہو۔

آواز سے زیادہ کام لینے والوں میں حلق کے ورم کا مرض، آواز بلند کرنے سے کھانسی آئے، حلق میں وکھن، خراش، دھڑکن، متلی۔

زیادتی :- کسی قسم کی گرمی سے، رات کو ٹھنڈی غذا سے، میٹھی اشیاء سے، کھانے کے بعد، حیض کے وقت، جذبات کی شدت سے اور بائیں جانب۔

کمی :- ٹوکاردوں سے، تازہ ہوا سے، ٹھنڈک سے، دبانے سے۔

مصلح :- نیٹرم میور

طاقت :- ۲ سے ۲۰ طاقت یکم مستعمل ہے۔

AURUM METALLICUM

آرم میٹلیکیم

خصوصی علامات

- ۱۔ ہڈیوں کا بھرجھراہٹ
- ۲۔ رات کو ہڈیوں میں درد
- ۳۔ کھوپڑی، ناک اور نالو کی مڈی کا زوال پذیر ہونا۔

عام استعمال

دل کی دھڑکن اور سوزش، پاسے کے اثرات بد، جنسی امراض، خنازیری حالتیں، وق، گھٹیا اور دم منفاصل، ناک میں سونگھنے کی قوت کا زوال، قوتِ مردمی کی کمی، شریانوں کی سختی، بلڈ پریشر کی زیادتی، جگر کا چھوٹا ہو جانا، سینہ میں درد جس میں رات کے وقت زیادتی ہو۔ ان کیفیات میں عام طور پر متعلق ہے۔ مایخو بیا شدید جس میں مریض خود کشی پرتلاش ہے، یہ دوا بچہ مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

بچہ مایوسی، زندگی سے بیزاری، ہمہ وقت خود کشی کے خیالات، مگ موت کا خوف بھی ہو۔
جسم کے مختلف حصوں کی ہڈیاں دھیرے دھیرے آشک کی مانند گل ٹر

رہے ہوں یا ان میں درم اور درد عسوس ہو۔ جگر یا فطول میں اجتماعِ خون
 آنکھوں کے لئے روشنی ناقابلِ برداشت ہو۔ ایک کے دو نظر آئیں یا چیز کا صرف
 نیچے کا حصہ نظر آئے اور اوپر کا حصہ دکھائی نہ دے، کانوں یا ناک سے بدبو دار مواد
 کا اخراج، غدد و گلو درد کستے ہوں، تالو گل سڑ گیا ہو۔ معدہ میں جلن اور گرم
 ڈکلاہ غدد و جنگاسہ سو جے ہوئے اور پیپ دار، خصلوں میں پرانا دم یا
 خصلوں میں پانی بھر گیا ہو۔ دل بڑھ گیا ہو۔ نبض کی رفتار تیز، کمزور اور
 بے قاعدہ، رات کے وقت تنفس کی تنگی۔

زیادتی :- ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈ لگ جانے سے، موسمِ سرد میں،
 غروبِ آفتاب سے طلوعِ آفتاب تک۔

مصلح :- بیلادونا، کیوپریم، مرکوریس، کاکولس، سپائی جسیلا،
 پلسا ٹیلا۔

طاقت :- ۳۰ اور اوپر

AURUM MUR

آرم میو

خصوصی علامات

- ۱۔ دم میں ٹیومر یعنی توڑی
- ۲۔ نظامِ عصبی کے بگاڑ کی وجہ سے ہڈ پریش بڑھ جائے۔
- ۳۔ آنکھ کی مادہ کے زہر سے پیدا شدہ دورانِ خون کی رکاوٹ۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر خاص طور پر مستورات کے اعضا پر ہوتا ہے جو اکثر برنیٹ کا تجربہ ہے کہ رحم کے ٹیومر کے لئے اس سے زیادہ مؤثر کوئی دوا نہیں۔

عمومی علامات

آتشکی مادہ کے نہریلے پن سے نیچے کے جب بڑ کی ہڈی میں ورم، اندیشین میں سوجن، نظامِ عصبی کے بگاڑ کی وجہ سے بلڈ پریشر کی زیادتی یا رگوں میں دورانِ خون کی رکاوٹ، مزمن وجع المفاصل اور گھٹیا کا درد، جگر میں ورم اور سختی، ورم گردہ، رحم کی گردن میں ورم، پیٹرو میں سردی اور ٹنڈک، مزمن ورم یا خروجِ رحم، بچہ دانی اور اندامِ نہانی میں زخم، سیلانِ رحم اور اس کے ساتھ دفعتاً رحم میں تشنچ اور تنگی، نموں میں ورم، بقیۃ الرحم میں رطوبت اور استسقاء، بقیۃ الرحم کا ٹیڑھا پن۔ رحم میں ٹیومر (سولی) مصلح :- سلفر کے چٹے

طاقت :- ۱ x سے ۳۰ طاقت تک

ARNICA MONT.

آرنیکا مانٹ

خصوصی علامات

۱۔ تمام جسم میں پھوٹے کا سادہ، چوٹ کا سا احساس، جیسے جسم کو ٹپا پٹیا گیا ہے۔ ہر چیز جس پر لیٹا جائے سخت اور تکلیف دہ محسوس ہو۔

۲۔ جسم کا اوپر کا حصہ گرم اور نیچے کا ٹھنڈا

۳۔ بچوں کی کلائیوں میں مروہ کی سی ٹھنڈک، سر میں پانی کے اجتماع کے ساتھ۔

عام استعمال

چوٹ یا حادثہ کی وجہ سے جسم میں کہیں کچلا ہٹ یا ٹوٹن ہو جائے جو نرم حصے کے کٹے بغیر ہو تو یہ دوا بہت کارگر ہوتی ہے۔ چوٹ کے علاوہ موچ آنا اور بل کھا جانا بھی اس کے دائرہ اثر میں ہے۔ علاوہ بریں سکڑ دماغ تپ محرقہ مسلسل بخاروں، خون کے زہریلے ہو جانے، خون میں پیپ بل جانے، دل کے عوارض جو زیادہ محنت کی وجہ سے ہوں، زوات الجنب کالی کھانسی، دوران سر، جوڑوں کی تکالیف، استسقاء سر اور خصبہ اور عرق النسا وغیرہ میں بھی مستعمل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

طبیعت گرمی رہنا، چڑچڑاپن، تشویش، بیہوشی یا سرسائی حالت
سر چکراتے اور گرم ہونے کے بعد دھڑکدھڑکے ہوئے ناک سے خون جاری ہونا، کپ
کا سوجنا، ٹوکا کے ساتھ گنداسٹری ہوتے انڈے جیسا بدبودار پانی
منہ میں آجاتے، گوشت اور شوبے سے نفرت، کھانے کے بعد متلی،
وضع حمل کے بعد اعضاء متعلقہ کی دکھن۔

کالی کھانسی کے دور، سنجار، لہزدہ اور پیاس کے ساتھ، صدمہ حیرہ
میں جلن اور باقی جسم سرد۔ اندرونی لہزدہ بیرونی گرمی (آرٹیک) بخار
میں ذرا بھی کپکپاتے ہٹانے یا بستر میں حرکت کرنے سے جاڑا معلوم ہو
(اسٹاکس)

زیادتی :- ذرا سا چھونے سے، حرکت سے، آرام سے، شراب اور
مطلوب سردی سے۔

کمی :- لیٹ جانے سے یا سر کو نیچا رکھنے سے

معاون :- ایکونائیٹ، وریٹرم، اسپیکاک

مصلح :- ایکونائیٹ، آرسنیکم ایبم، کیمفر، چائنا، اگنیشیا، اسپیکاک

طاقت :- اسے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔ پرانی چوٹوں کے لئے

۲۰۰ طاقت بھی استعمال کی جاتی ہے۔

تخصوصی علامات

تھے یادستوں کی صورت میں ترش، خراش پیدا کرنے والے اور جلن دار
اخراج، کھانا کھانے کی نالی میں جلن

عام استعمال

معدہ اور ہاضمہ کے عوارض مثلاً، تھے، دست وغیرہ نیز ہیضہ میں
کارآمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

پست ہمتی اور منہموم و متفکر رہنا۔

زبان مجلسی ہوئی مسوس ہو (ایس، اسکولس، پلائینا، پلسا ٹیلا،
سیپیا) رال بکثرت ہے (مرکیورس، نائٹریک ایسڈ) جھوک نہ ہو، ڈکانیں
کی کثرت، متلی، تھے، نرم معدہ میں جلن، تیلے پاخانے جو جلن کے ساتھ آتے
تھے کھٹی اور گلیے میں خراش پیدا کرنے والی، بچوں کا ہیضہ، پیٹ کی خرابیوں
کے ساتھ پیٹ، حلق اور زبان میں جلن، غذا کی نالی میں جلن۔ بعض اوقات
کڑوی تھے۔

جگر کی خرابی سے ہر صبح کو ہونے والا درد، عرق النسا یعنی شکر کی کادو۔

مصلح :- نمکس و امیکا
 زیادتی :- شام کو، رات کو، آرام کرنے سے
 کمتری :- مسلسل حرکت سے
 طاقت :- ٹنگر سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر ۔

IQDIUM

آئیوڈیم

تخصیصی علامات

- ۱۔ جسم کا گوشت پوست گھٹتا جاتے، لاغری جو مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔
- ۲۔ مھوڑے پر چنچ گھٹا بعد محسوس ہو، کھانا کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے۔
- ۳۔ لٹیکھا سخت

عام استعمال

اس کا خاص اثر نہروں اور لمف پڑھتا ہے۔ شروع میں ان کے فعل میں زیادتی پیدا کرتی ہے بعد میں کمزوری، لاغری اور مٹھن ہوتی ہے۔
 خنازیری مادہ کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ علاوہ برسی ذات الجنب لٹیکھا، سلی اور جوڑوں کے درد میں بھی مؤثر و کارآمد ہے۔

عمومی علامات

خنازیری مزاج، انتہائی کمزوری، لاغری، آہستہ آہستہ زہریلے پن کا اثر کرنا، وجہ معلوم ہونے بغیر بیکمزوری محسوس ہوا، ذہینہ پر چڑھنے سے سانس پھولے۔

بھوک بار بار محسوس ہو لیکن مریض بہت کچھ کھانے کے باوجود لاغر ہوتا جاتے۔ کھانا کھانے کے بعد مریض بہتر محسوس کرے۔

خواتین میں پستانوں کی ٹھنڈی اور دکھن، رحم سے خون کا بکثرت اخراج، رحم میں زہریلا زخم، مزمن سیلان الرحم جس میں کہ رطوبت بہ کثرت اور تیزاب کے مانند جاری ہو جو کپڑوں تک میں سوراخ کر دے۔

ذات المجنب (سپل) سانس لینے میں محنت جتنا بٹ، آدا ملنے کی سی آواز، بھونکنے والی کھانسی خاص کمزوریوں کی، کھانتے ہوئے پسینہ گلے کو پکڑے گھسیٹا، سل، جوڑوں کے درد (وجع المفاصل)

زیادتی :- چپ چاپ رہنے سے، گرم مکان میں، دامنہ جانب، بھوک کے وقت (مدہ خال ہونے کے دوران)

کمی :- ادھر ادھر چلنے پھرنے سے، کھل ہوا میں، کھانا کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد

معاون :- بڈیاگا، لائیو پوریم

مصلح :- اینٹی مونیم مارٹ، ایسپس، آرمینیکم البم، بیلادونا، کیمفر، اپنا سلف، کافیا، فیرم، گریفائیٹس، گریشویلا، ہیرسلف اوپیم، فاسفورس، سپینیا، تھوجا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

ABROTANUM

ابراہیم

خصوصی علامات

ناطاتی اور لاغری خصوصاً نیچے دھڑک، مرض سوکھے کی سی۔

عام استعمال

بچوں میں سوکھے کے مرض کے لئے عام استعمال ہوتی ہے۔ باضمومت ہونے کے باوجود دبلا پن بڑھتا جائے، دستوں کے بند ہونے پر لاحق ہونیوالا جوڑوں کا درد، ایسے امراض خواہ اپنی اصل جگہ سے دور کسی دوسری جگہ ظاہر ہوں، سرطان، گتھیا کے مریضوں میں بیماری کے دب جانے کی وجہ سے پیدا شدہ خرابی، ذات المجنب میں پردہ باریطون کی سوزش جبکہ مواد ہوتا ہو اور دیگر اخراجی کیفیتوں میں چھاتی میں پیپ یا پانی پڑ جانے کا اندیشہ، اپریشن کروانے کے بعد متاثرہ مقام پر مسلسل بوجھ کا احساس، انفلوئنزا کے بعد کی کمزوری، خونی بواسیر جو گتھیا کو خافقہ ہونے پر بڑھ جائے، بچوں کا مرض سوکھا نیز بچوں کو نحسیر آنا یا فریملوں میں پانی بھر جانا وغیرہ کا لیف میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

مزاج غصیلا، چڑچڑا، فکر مند، پست ہمت۔

چہرہ سرد، خشک، نڈ، جھریوں بھرا، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔

منہ کا ذائقہ پھیکا، بھوک اچھی، لیکن کمزوری بڑھتی جاتی، غذا بغیر ہضم ہوتی، معدے سے نکل جاتی، پیٹ میں درد جو رات کو زیادہ ہو، ایسا احساس کہ پیٹ میں پانی تیرتا ہے، ٹھنڈا معلوم ہو، بھوک کے باعث معدے میں کھروچن کا احساس، بد ہضمی کی بکثرت بدبودار رطوبت والی تہ، ناف کے نیچے سخت گولہ محسوس ہو، پیٹ بھولا ہوا، کبھی تھن، کبھی دست، بواسیر بار بار پاخانہ کی حاجت، خون ملا پاخانہ، باقی کا درد اچھا ہو جانے پر پاخانہ کی تکلیف بڑھ جاتی، کیڑے گریں، ناف سے رطوبت نکلے ایسا معلوم ہو کہ انتڑیاں بیٹھی جاتی ہیں۔

سینہ میں خراش، سانس میں رکاوٹ، خشک کھانسی، سینہ میں درد۔
کمر کا درد جو فوطوں تک پہنچے، بواسیر کے ساتھ ریڑھ کے نیچے حصہ کی کڑیوں میں درد ہو۔

زیادتی :- ٹھنڈی ہوا سے اور غماز کے اخراجات کے بند ہو جانے سے کمی :- حرکت سے

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

خصوصی علامات

- ۱۔ کسی بھی بیماری میں مسلسل اور رگتا رگتا متلی۔
- ۲۔ معدہ ڈھیلہ محسوس ہو جیسے نیچے ٹنگ رہا ہے۔
- ۳۔ چمکدار سرخ خون کا سیلان جسم کے کسی بھی مخرج سے۔
- ۴۔ کالی کھانسی میں بچہ سانس کھو بیٹھے۔

عام استعمال

معدہ میں تشنجی اثر سے متلی اور پھیپھڑوں میں تشنجی اثر سے کھانسی یا سانس پھولنے کی تکلیف لاحق ہو، معدہ میں خون کے حرکت کرنے سے خون کی پیچش یا خون کا اسہال اور پھیپھڑوں میں خون کے حرکت کرنے سے تپے ہوتی ہو یا منہ سے خون آتا ہو تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ نیز کچے یا باسی چل کھانے سے جو عوارض ہوتے ہیں ان کے لئے نافع ہے۔

عمومی علامات

سر میں ایک جانب کا درد متلی اور تپے کے ساتھ، سر پھرتے، چہرہ زرد ہو، سخت متلی اور تپے ہو، پیٹ میں درد، خون کی تپے، ناف کے گرد سخت درد، سبز گھاس جیسی آکڑی ملی تیچش، مروڑ کے ساتھ خون ہو یا شیر کے

مانند سیاہ ہو مگر در کے ساتھ پیشاب خون کا ہو۔

خواتین میں حیض بہت قبل از وقت اور کثیر مقدار میں، سرخ خون کا
لو تھڑے خارج ہوں۔

سینہ میں بغم بھرا ہوا محسوس ہو جو کھانسنے سے خارج نہ ہو، پھیپھڑوں کا
اندزہ والی نالی ہوا کی نالیوں میں غرغراہٹ۔ بیدم کرنے والی کھانسی۔ کھانسنے
میں بغم کی تپے ہو جائے۔ منہ سے خون آ جانا۔

لنزدہ بلا بنجار کے، جو گرم کمرے میں یا بیرونی گرمی سے زیادہ ہو، پانی پینے
سے یا کھل ہوا میں سردی کم ہو۔

تمام جسم میں تپ عموماً زیادہ دیر تک رہنے والی متلی اور تپ، سانس لینے
میں تکلیف، خشک کھانسی، کمرہ میں جانے سے ایک دم پسینہ آ جائے، بدبودار
پسینہ اور گندہ پیشاب۔

زیادتی :- حرکت سے، سرد خشک موسم میں، رات کو گرم کمرہ میں۔
کمی :- آرام کرنے سے، آنکھ بند کرنے سے۔

معاون :- کیو پریم، نکس و امیکا، پیسا ٹیلا

مصلح :- آرنیکا، آرسینک اہم، چائنا

طاقت :- عموماً ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

ACTAEA RACEMOSA

اکٹیا رسی موسا

خصوصی علامات

- ۱۔ عفونی مزاج میں مریض کو احساس جیسے اس پر سیاہ بادل چھا گیا ہے،
اور داغ کو گھیر لیا ہے۔
- ۲۔ حمل میں متلی اور جھوٹے دروزہ۔
- ۳۔ وضع حمل کے پہلے درجہ میں لرزہ۔

عام استعمال

یہ مستورات کے عوارض کی خاص ادویہ میں سے ایک دوا ہے۔ ہسٹیریا،
(اضنق الرحم) عفونی یا ہسٹیریائی مرق، حیض کی خرابیاں، سیلان الرحم اور
زمانہ حمل اور وضع حمل سے متعلقہ عوارض نیز وجع المفاصل وغیرہ اس کے
دائرہ اثر میں آتے ہیں۔

عمومی علامات

داغی سستی، خودکشی کی طبیعت، چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ، تنہائی
کی خواہش، یہ کہے کہ پاگل ہو جائے گا۔
سر چکرائے اور بھاری اور بڑا محسوس ہو، ہاتھ میں میٹھا میٹھا درد، سر
کے بائیں حصہ میں درد، سر اور آنکھ کے ڈھیلے میں سخت درد، آنکھوں کے

سامنے سیاہ دھبے۔
 زخاں کی ٹہنی میں درد، جورات کو موقوف ہو جائے۔ کان میں موسیقی
 کی آواز نہ ہو۔ عسوس ہوں۔ ذرا سے شہد سے بنی تکلیف ہو۔
 منہ اور حلق گرم اور خشک جس کی وجہ سے کھانسی آئے۔ تانے کے
 ذائقہ کا سیلا بلغم خارج ہو۔

سبز رنگ کی تے، پیٹ میں بدمعھی لگنے کا سادرد

رحم کے قریب اعضاء نہایت ذکی الحس ہوں، حیض بہت قبل از وقت
 بکثرت جس میں لوتھڑے خارج ہوں۔ پیٹ کے آر پار سخت درد جو دہرا
 کمرے، درد ذہ کے سے درد، وجع مفاصل کا درد ایام حیض میں جس کے
 باعث سر پھٹ چلائے اور فٹے، سیلان الرحم میں ایسا محسوس ہو کہ رحم
 میں بوجھ ہے۔ زمانہ حمل میں درد ذہ کا سادرد ہو، نقاس رک جائے یا بند
 ہو جائے۔

سینہ میں دانہی جانب درد ہو، چپٹ لیٹ جائے، سینے کو دو دانوں بقول
 سے دبائے، حوالی دل میں درد اٹھ کر سینہ میں ہو کہ بائیں بازو کے نیچے
 تک جائے، دل کی دھڑکن، ماتقول میں سرد سپینہ، بائیں بازو سن ہو جائے۔
 ایسا محسوس ہو کہ پہلو میں بندھا ہوا ہے۔

گردن جکڑی ہوئی، یہاں تک کہ ہاتھ ہلانے سے بھی پیٹھ اور گردن میں
 درد ہو، ریٹھ ذکی الحس ہو جائے۔ خاص کر گردن کے مہروں میں پیٹھ سے
 لے کر کولے تک اور ران تک سخت درد ہو۔

زیادتی :- دوران حیض میں جس قدر زیادہ مقدار میں حیض ہوگا اسی
 قدر زیادہ تکلیف ہوگی۔

کھی :- گرمی سے ، کھانے سے ۔

طاقت :- مدد شکر سے ۲۰۰ طاقت تک استعمال ہوتا ہے ۔ ۳ طاقت زیادہ مستعمل ہے ۔

IGNATIA

اگنیشیا

تخصیصی علامات

- ۱۔ یہ دوا جذدین (گٹری میں تولد ، گٹری میں ماشہ یعنی ایک بات یا ایک کام پر قائم نہ رہ سکیں) کی بہت بڑی دوا ہے ۔
- ۲۔ وہ انسان جو دیرینہ غم و اندوہ سے دماغی اور جسمانی طور پر کمزور اور نحیف ہو چکے ہوں ۔
- ۳۔ مرض از خود آہیں ہوتا ہے ۔
- ۴۔ تمباکو برداشت نہ کر سکے ۔
- ۵۔ قبض جس میں جمید حاجت بھی شکم کے اوپر ہی حصہ میں محسوس ہو ۔
- ۶۔ تیز سوئیاں چھینے کا سادہ مبرز میں جواد پر تک جائے ۔
- ۷۔ جارا پائیس کے ساتھ صرف جائے کے دوران پائیس ۔
- ۸۔ ہنار بفر پائیس کے جو کپڑا اوڑھنے سے بڑھ جائے ۔

عام استعمال

درد معدہ، تشنّج اور تشنّجی درد، اینٹمن، ہشیر یا یعنی باؤ گولہ (انضاق) امراض گروہ و مقعد، نوبتی بخار، قبض بوجہ کمزوری، امعار، خرمج مقعد یعنی کانچ لنگھ میں عام طور پر مستعمل ہے۔ علاوہ بریں پیگ کے لئے بطور حفظہ ماقدم اور شافی مرض ایک کارآمد دوا ہے۔

عمومی علامات

مزاج نہایت منعم، ہر چیز کی طرف لاپرواہی، گفتگو کرنے سے جی چرائے متغیر ہونے والا مزاج، کبھی مذاق، کبھی تہقّقہ کبھی جیننا چلانا، عاشق مزاجی۔ سر کو کھلا معلوم ہو، بھاری معلوم ہو (اوسیم) درد سر جو جھکنے سے زیادہ ہو۔ پیشانی میں پھٹنے والا درد، چپٹ لیٹنے سے کم ہو، درد والے پہلو لیٹنے سے آرام ہو (تھوہا میں اسی قسم کا درد گدی میں ہوتا ہے) ناک کی جڑ میں اینٹمن کا درد۔

آنکھوں میں ریت بھری محسوس ہو، روشنی کی چپکا چوند برداشت نہ ہو، آنکھ کے سامنے سفید مچکتی ہوئی لہر معلوم ہو، ایسا محسوس ہو کہ آنکھ کا ڈھیلا بانہ نکل پڑے گا۔

سامنے کے دانت میں چھیدنے والا درد جو کہ حقہ یا تمبوہ پینے سے زیادہ ہو، دانت میں ایسا درد کہ گویا دانت کچل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دانت کا درد جو کھانا کھانے کے دوران یا دونوں کھانوں کے وقفہ میں زیادہ ہو۔

بعض اوقات غذا منہ کو آجاتے اور اس کے ساتھ کڑواہٹ ہو، جو غذا شام کو کھائی جائے وہ رات کو تپے ہو جائے۔ منہ میں دال زیادہ پیدا ہو۔ معدہ میں تشنجی درد، معدہ میں جیسے سوئی چھبوتی جاتی ہے (رٹا کس) معدہ میں تپکن (ایلو، سینگو نیریا)

پانخانہ کے وقت متعہ میں تنگی اور رکاوٹ، پانخانہ ہونے کے بعد درد، کھڑے ہونے اور چلنے میں درد، بیٹھنے میں آرام، بواسیر خونی یا باری پانخانہ ہونے کے بعد تکلیف زیادہ ہو، بواسیر میں درد اور تکلیف اس وقت اور زیادہ ہو جبکہ پانخانہ پستلا ہو۔

پیشاب صاف بلانگ کا مقدار میں زیادہ ہو۔ مہشیر یا میں اکثر ہوتا ہے حیف تھوڑی مقدار میں سیاہ اور بدبودار، حیف کے دوران نہایت کمزوری، غشی اور سپٹ اور پیرڈ میں درد، رحم میں تشنج، حیف کثیر مقدار میں اور جلد جلد ہو۔ مہشیر یا کے دوے۔

حلق میں رکاوٹ محسوس ہو جیسے دھواں بھرا ہے (آرسنک چائنا) حلق خشک، تشنجی کھانسی، دن اور رات نہ کام بہتا ہوا، سینہ میں بائیں طرف کونچن، دل میں دھڑکن اور کونچن۔

شانے کے جوڑ پر درد جیسے اکھڑ گیا ہو۔ اٹھنے پر گھٹنے کے جوڑ جکڑے ہوئے محسوس ہوں اور آواز دیں (کونیم) تمام جوڑ آواز دیں (کالی بائیکرام) پیر کا بھاری پن۔

بخار زیادہ لہرزہ اور پیاس کے ساتھ اور زیادہ مقدار میں پانی پیا جائے ہائینے والا لہرزہ، چہرہ سرخ، شام کے وقت گرم کمرہ یا انگلیٹھی کی گرمی سے آرام ہو جاتے۔

بخار بغیر پیاس کے سہ پہر کو تمام جسم میں گرمی مگر پیاس نادرہ، جلد خشک
 بیرونی گرمی اور سرخی ہو لیکن اندرونی گرمی بالکل نہ ہو، تمام جسم پر پتی اچھلے
 زیادتی :- تمباکو، تہوہ، برانڈی سے، چھوٹے سے، حرکت کرنے سے
 تیز بڑے سے، دماغی جذبات، رنج وغیرہ سے، ٹنڈی ہوا سے
 کھی :- گرمی سے، زیادہ دبانے سے، چت لیٹنے سے
 معاون :- نیزم میوہ، ایسڈ فاس، پلسا ٹیلا، سیپیا
 متضاد :- کافیہ، ٹوبیکم، نکس و امیکا
 مصلح :- ایٹک ایسڈ، آرنیکا، کمیفر، کمیولا، کوکولس، کانیا
 نکس و امیکا، پلسا ٹیلا
 طاقت :- ۶ سے ۲۰۰ طاقت تک

AGARICUS

اگیرکس مسکریس

خصوصی علامات

- ۱۔ عیاشی کے اثرات بد۔
- ۲۔ بوائیاں جن میں ناقابل برداشت خارش اور جلن ہو۔
- ۳۔ ازخود حرکات عالم بیداری میں۔
- ۴۔ درد مکر کے مقام میں، دن کے وقت، صحت کے دوران جب
 بیٹھا ہو (زنگم)

عام استعمال

اعصابی فتور، چٹھوں کے درد، حرام مغز کی سوزش اور جلدی امراض خاص کر جو شدید سردی لگ جانے سے لاحق ہوں وغیرہ میں عام طور پر مستعمل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

منہ سے تیز بو آئے، ذائقہ بچید خراب ہو، خالی ڈکار میں آئیں پیٹ میں بوجھ، جگر اوتلی میں درد، آنکھوں میں گرگڑا ہٹ، صبح بیدار ہونے پر اسہال ہوں، اور پیٹ میں گرگڑا ہٹ ہو، ریح بغیر بو کے کثیر مقدار میں خارج ہو۔

نظام عصبی میں کونچن محسوس ہو، آنکھوں اور پوٹوں کی تشنجی حرکات رشتہ، نیند کی حالت میں حرکات بند ہو جاتیں، طوفان آنے سے پیشتر علامات میں شدت ہو، ریڑھ کو چھو نہ جاسکے، ہر حرکت درد انگیز ہو۔ چہرہ سکڑا ہوا، چہرہ میں خارش، اور جلد، لبوں پر اجار ہوں، تالو میں آبلے نظر آئیں، پیاکس زیادہ ہو، حلق میں خارش ہو، سونے کے بعد کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف۔

جلد میں جلن، خارش، سرخی جیسے شدید سردی لگ گئی ہو، سرد ہوا سے تکلیف بڑھے، نشیں پھول ہوتی ہوں۔ زیادتی پر ٹھنڈی کھلی ہوا میں، کھانے کے بعد، جماع کے بعد سرد موسم میں، بادل کی گرج سے قبل۔

کسی :- ریڑھ پر دباؤ سے از خود منہی، آہستہ آہستہ اوپر اوپر حرکت کرنے سے ۔

مصلح :- کیمفر، کانیا، پیسا ٹیلا، رسٹاکس

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ تک نیز ۲۰۰ طاقت بھی مستعمل ہے ۔

ALUMINA

الیومینا

خصوصی علامات

- ۱۔ آکو موافق نہ آئیں ۔
- ۲۔ قبض جس میں نہ تو پاخانہ کی حاجت ہو اور نہ پاخانہ کو خارج کرنے کی طاقت ، اتنا دقتیکہ بڑی مقدار میں جمع نہ ہو جائے ۔
- ۳۔ مہرز میں اتنی نا طاقتی کہ نرم پاخانہ بھی بمشکل خارج ہو ۔
- ۴۔ سیلان الرحم (لیکوریا) تیز سوزش پیدا کرنے والا مقدار میں اتنا زیادہ کہ ایڑیوں تک پہنچ جائے ۔
- ۵۔ حیض کے بعد دماغی اور جسمانی طور پر کمزوری کا احساس ۔

عام استعمال

قبض ، حلق کی سوجن ، لسیکوریا (سیلان الرحم) ، خون حیض قبل از وقت خفیف اور زردی مائل آکر بند ہو جائے جو مریض کو بچہ کمزور کر دے ۔

نخاع کے اعصاب میں نقص واقع ہو جاتے جس کے باعث ٹانگوں کے انحال میں باقاعدگی نہ ہے، مریض لڑکھڑاتا ہو۔ کھانسی خاص کر جو صبح کو آئے، نیز نشاستہ، کھڑیا مٹی، چاک، کوئلہ وغیرہ کھانے کی رغبت وغیرہ میں یہ دوا کارگر اور مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

عقل زائل ہوتی ہوئی محسوس ہو، لپست ہمتی ہو، وقت کاٹے نہ کئے مزاج یکساں نہ ہے، جیسے جیسے دن چڑھے ویسے ویسے طبیعت اچھی ہوتی جائے۔ نشتر یا خون دیکھ کر خود کشی کرنے کو جی چاہے۔ درد سر جلن اور کوسنچن والا جو صبح کو زیادہ ہو مگر کھانے سے کم ہو جائے۔ قبض بھی ساتھ ہو، سر چکراتے، بالوں کا گرنا، چاند پر کھلبلی چیزیں زور دکھائی دیں۔

چلنے کی نا اہلیت، ذرا سی بے خیالی ہونے پر لڑکھڑائے اور گرجائے (آر جنٹیم ٹائٹرکیم، جلسی میم) معمول سے زیادہ بھوک لگے، نشاستہ، چاک، مٹی، کوئلہ، لونگ، تہوہ، کھٹی اور ثقیل چیزوں کی نہ کھانے والی خواہش (سائیکیوٹا، سورنیم) کو موافق نہ آئیں۔

منہ سے بدبو نکلے، دانتوں پر میل، مسوڑھوں میں دکھن اور آنکھوں سے خون نکلے، حلق خشک اور چرہ درد۔

پاخانہ خشک، سداں والا، پاخانہ کی خواہش ندر، مقعد سوجی ہوئی خشک اور چرہ درد، مبرز پر کھلبلی اور جلن، نرم پاخانہ بھی وقت سے نکلے،

پیشاب کرنے کے لئے بھی زور دگنا پڑے۔

مرد میں جماع کی خواہش زیادہ ہو، پاخانہ کے وقت زور دگانے پر مزہ کا اخراج یا نڈی خارج ہو۔ مستورات میں حیض بہت جلد جلد تحلیل مقدار میں اور زور و رنگ کے۔ خواش پیدا کرنے والا شفاف ڈرے کا سا بکثرت سیلان الرحم جن کے ساتھ جو کہ دن میں اور حیض کے بعد زیادہ ہو اور ٹنڈے پانی سے دھونے سے کم۔

جلد خشک ہو، ناخن نازک جو جلد ٹوٹ جائیں۔ رات کو بستر پر لیٹے تو بے انتہا کھجلی ہو، یہاں تک کہ کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آئے اور بعد میں درد ہو، ناخن کے اوپر کی کھال اکھڑے۔

زیادتی :- بعد دوپہر، آلو کھانے سے، صبح بیدار ہونے پر، گرم مکان میں۔

کمی :- کھل ہوا میں، ٹنڈے پانی میں نہانے سے، شام کو اور ہر تیسرے دن مرطوب موسم میں۔

معاون :- برائی ادویا، فیرم۔

مصلح :- برائیویا، تیمضر، کمیوٹلا، اپیکاک، پلساٹیللا

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اونچی طاقتیں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ یکایک حافظہ کا جتنے رہنا۔
- ۲۔ گالی دینے اور قسمیں کھانے کی نہ رکنے والی خواہش۔
- ۳۔ مسلسل و عائیں مانگے۔ (سٹر مونیٹم)
- ۴۔ در در سہر جو کھانا کھانے پر جاتا ہے۔
- ۵۔ پاخانہ کی بچہ خواہش لیکن جو نہی پاخانہ جاتے پاخانہ آئے بغیر ہی حاجت جاتی ہے۔

عام استعمال

جب فکر و تردد کی زیادتی، نسیان اور دماغی کمزوری کے باعث ذہنی فتور واقع ہو تو اس دوا کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ مریض کا حافظہ کمزور ہو جائے اور وہ معمولی نام بھی یاد نہ کر سکے۔ اسے ہر شے خواب و خیال محسوس ہو۔ مریض خود کو دو خیال کرے یا دو ارا دون کا مالک محسوس کرے جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوں، چلتے وقت خیال کرے کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ بھوت پریت کا خوف ہے۔ نہایت غصیللا اور بدی کی طرف مائل ہو۔ قسمیں کھاتے اور وہی تباہی بکے، نہ ہر آمیزی کا دم ہو اور وہ کھانے

پینے سے انکار کر دے۔ مردوں اور قبروں کے لئے خوشنک خواب دیکھا کرے
توبہ دلا کر گمراہ اور مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سر میں شدید گہا درد جیسے میخ ٹونک دی گئی ہے، کھانے پینے
سے افاقہ ہو جائے لیکن دماغی محنت سے پھر عود آئے۔
خانہ چشم میں دبانے والا درد، نزدیک کی چیزیں دور دکھائی دیں بصر
میں کمزوری۔

سماعت میں فرق آجائے۔ کان میں کوئی شے ٹھونکی ہوئی محسوس ہو۔
قوتِ شامہ یعنی سونگھنے کی صلاحیت جاتی رہے، بار بار پھینکیں آتی
ہیں، نزلہ زکام مع اختلاجِ القلب۔

اختلاجِ قلب یا پودہ دل متورم ہونے کے باعث متواتر درد کی
ٹیسیں رہتی ہوں توبہ دوا مفید ہوتی ہے۔

معدہ خالی ہو تو پیٹ میں درد رہے لیکن کھانا کھانے پر جاتا ہے۔
مردوں میں خواہشِ جماع کی زیادتی، آلہ تناسل کے اندر بھینچنا،
عورتوں میں سیلانِ الرحم جس کے ساتھ دکھن اور کھجلی ہو۔

جلد میں شدید کھجلی، جلن جس کے ساتھ دماغی علامات بھی موجود ہوں۔
نارِ فارسی۔

زیادتی :- گرم پانی لگانے سے
کمی :- کھانا کھانے سے
مصلح :- کامیا، رسناکس

طاقت :- ۶ سے ۳۰ طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے ۔

OPIUM

اوپیم

خصوصی علامات

- ۱۔ تمام تکلیفات جن کے ساتھ غنودگی بہت ہو، تمام تکلیفات بغیر درد کے جن میں مرض کسی بات کی بھی شکایت نہ کرے، مریض کچھ نہ چاہے ۔
- ۲۔ خراٹے دار سانس کے ساتھ نیند، چہرہ سرخ، آنکھیں آدھی بند ۔
- ۳۔ جلد پر گرم پسینہ آئے ۔
- ۴۔ بستر اتنا گرم محسوس ہو کہ اس پر لیٹ نہ سکے ۔
- ۵۔ پانخانہ سیاہ، متعفن مقعد کے فالج کے ساتھ ۔

عام استعمال

دماغی سکے، دماغی جریان خون، ہڈیان خری، قبض، قولنج سیسہ حاد، بخار، جن کے ہمراہ غشی ہو، ذیابیطس، بچوں کا ہیضہ، پانخانہ کی تپ، شدید درد قولنج، انٹریوں کا الجھ جانا، خوف یا ڈر کے برے اثرات، بچوں کی لاغری، شہابیوں کی خون کی تپ جیکہ چھاتی گرم اور اطراف سرد ہوں، بچوں کا ہیضہ، مرقہ سنار کے اسہال، نمونیہ اور نوبی سنار میں حسب علامات مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

دوبنی طور پر لا پروا، گھبرایا ہوا، بے چین، دہشت زدہ، چونک چونک پڑے۔ یہ خیال کرے کہ گھر میں نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی اور زبان بکے، چہرہ سرخ اور پھولا ہوا، بالکل بے ہوش، حافظہ بالکل زائل ہو جائے، آدھی آنکھیں کھلی اور آدھی بند، پستیاں سکڑی ہوئی، زور سے خراٹے، گفتگو بے تنگی ہو۔

مریض نشہ کا متوالا معلوم ہو، احمق سا نظر آئے، سر چکرائے، سکتہ کی سی حالت، اٹھنے سے چکر آئے، لیٹ جائے، سر کسا ہوا معلوم ہو، سر کی شریان (رگیں) تپکتی ہوئی معلوم ہوں۔

آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی، آنکھیں ٹشکی لگی ہوئی، آدھی کھلی آدھی بند اور کپڑے ہی ہوئی نگاہ، پستیاں پھیلی ہوئی، نگاہ دھندلی۔

چہرہ سرخ، سیاہی مائل، سوجا ہوا، جھرجھرایا ہوا، چہرے کے چٹھے (عضلات) خود بخود حرکت کریں۔ چہرہ کی رگیں پھولی ہوئی، نیچے کا جبڑا لٹکا ہوا۔

منہ میں رال بکثرت ہو، حلق خشک، کچھ نگلانا جاسکے، زبان مفلوج پیٹ میں درد قوی، تے اور تشنچ، خون کی تے ہو، منہ سے غلیظ اور پیشاب کی سی تے ہو، پیٹ میں گرانی، ہجوک کم۔

بہت پرانی قبض، چھوٹی چھوٹی سیاہ گولیاں سی پاخانہ میں نکلیں، دہشت کے بعد خود بخود پاخانہ ہو جائے، بچوں کا مہیضہ جس کے ساتھ غفلت ہو۔

پیشاب میں رکاوٹ، پیشاب قلیل المقدار ہو۔

سینہ میں تنگی معلوم ہو اور سانس لینے میں تکلیف ہو، آواز بھاری منہ

کھول کر خراٹے لے، کھانسی خشک رات کو، پانی پینے سے کم ہو۔

نیند معلوم ہو مگر سونے کے، نہایت غنودگی ہو، مغبوط الحواس افراد

کی سی نیند، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند، زردی سے خراٹے، سونے میں بہتر

پر کوئی چیز چھنے، سونے میں بھی ذرا کھٹکے سے جاگ پڑے۔

بخار زہ کے ساتھ پیاس کے بغیر، سر گرم اور گہری نیند ہو، نیند میں

سر کے گرد بہت پسینہ۔

زیادتی :- پسینہ سے، رات کو، صبح کو، سونے کے درمیان اور بعد

کسی :- سردی سے، حرکت سے دن کو اور شام کو

مصلح :- آر جنٹم نائٹرکیم، بیلادونا، کیملفر، کیوملا، اسپیکاک، نکس و امیکا،

سلفر، سارسا پرلیا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

خصوصی علامات

- ۱۔ آنکھوں کے نیچے تھیلی کی سی پھلاوٹ
- ۲۔ درد، جلن دار، ٹونک لگنے سے، پھوٹے کے سے۔
- ۳۔ دست از خود ہر حرکت پر جیسے مقعد کھلی پڑی ہے۔ (نافسور)
- ۴۔ نوبت بنجارہ ہمیشہ پیاس کے ساتھ

عام استعمال

اعضار کی سوجن اور پھول جانا۔ استسقا، سرخ گلابی رنگت، ٹونک مانے کے سے درد، دکھن، گرمی ناقابل برداشت ہو اور دوپہر کے بعد شدت سرخ باد کی طرح کی سوزش، گردوں کی شدید سوزش جسے چھوتے سے سخت تکلیف ہو یا عام جسمانی تکلیف ایسا معلوم ہو کہ کچھ اندر پھینسا ہوا ہے یا جسم کے اندر کوئی شے پھٹی جا رہی ہے وغیرہ تکلیف میں مشغول و معید۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر خیالات میں یکسو نہ ہو، چھپک وغیرہ کے دب جانے سے سرام ہو گیا ہو۔

سر جھکائے، متلی، درد سر، بھاری پن کے ساتھ درد پیشانی اور پیٹ

میں جو کہ اٹھنے اور بستر کی گرمی سے زیادہ ہو۔ وہ بانے سے آرام ملے گا، اگر تری
میں درد جس سے مریض دفعتاً چیخ اٹھے، بچوں کے سر میں پانی اتر آئے،
یہ ایک چیخ ماریں۔

آنکھوں کا آشوب، روشنی برداشت نہ ہو، اور پے کے پھوٹے سوجھے
ہوتے ہوں اور چہرہ زرد ہو۔

ہونٹ سوجھے ہوتے ہوں۔ خاص کر اوپر والا ہونٹ۔ حلق میں جلن،
نیش زنی کا سادرد، حلق کے غدود ورم کئے ہوتے ہوں، زبان خشک
سو جی ہوئی ہو، کوئی چیز نگل نہ سکے، گردن پر کسی چیز کا چھونا برداشت
نہ ہو سکے۔

ورم معدہ جس کے باعث تپ ہو جاتی ہو، معدہ میں گویا آگ جلے
مگر پیاس بالکل نہ ہو۔ سخت درد اور معدہ ذکی الحس ہو جائے۔ پیٹ
میں ایسا محسوس ہو کہ اگر پاخانہ کے لئے زور لگایا جائے گا تو کوئی چیز
جو کسی ہوئی ہے ٹوٹ جائے گی، پیٹ میں دھن۔

پاخانہ سبزی مائل، زردی مائل، چکنی آؤں یا زرد پانی ایسا بلا درد کے،
اسہال صبح کو زیادہ ہوں۔ اکثر اسہال شام کو بھی ہوتے ہیں۔ خود سنجود
پاخانہ بند ہو جائے گویا مہر نہ کھلا ہو ہے۔ بواسیر میں نیش زنی کا سادرد،
خروج مقعد یعنی کا پیچ نکلا۔

پیشاب سیاہ رنگ کا اور کھ کے ساتھ، رات کو پیشاب نہ روک
سکے، خاص کر کھانستے وقت اور خود سنجود نکل جائے۔

مردوں کے اعضائے تناسل میں ورم اور ٹیس، عورتوں میں دانے
خصیۃ الرحم میں سوجن، ورم اور پانی اتر آنا۔ تیز کاٹنے والا اور نیش زنی

کا سادر دھو۔ (بائیں خصیتہ الرحم میں ورم ہو تو گریٹا ٹیس دوا ہوتی ہے) اسقاطِ حمل، ہر قسم کی گرمی سے علامات میں زیادتی، علاوہ بریں چھوٹنے سے رکاوٹ سے، دباؤ سے، رات کو یا چھکے کی حالت میں زیادتی۔ رطوبات کا جمع ہونا، سینہ میں، دماغ کی جھتی میں، پھیپھڑے کی جھتی میں، مناسل یعنی جوڑوں میں۔

صبح کے وقت آواز بھاری ہو، سینہ میں دکھن، سونے کے بعد کھانسی آنا، تیز درد کے ساتھ سانس آتے، لیٹنے سے زیادتی ہو۔ ہاتھ نیگلوں، سردی کی طرف مائل، ٹانگیں سرد، ٹانگوں، گھٹنے اور پیر کی سوچن۔

بخار ہمیشہ پیاس کے ساتھ، جو گرم کمرہ میں اور بیرونی گرمی سے زیادہ ہو دورہ ۲ بجے سے پہر کو یا ۲ بجے سے ۴ بجے سے پہر تک ہو۔ سینہ میں جلن، سر یعنی بچانے کی کوشش کرے، آگ کی گرمی برداشت نہ کر سکے۔

پسینہ ٹھوکانہ ہو۔

جلد پر سرخ چکتے جن میں جلن اور نیش زنی کا سادر دھو۔ ایسے چکتے جو مثل بھڑکے چتے کے ہوں، پتی اچھلنے کے سے چکتے۔ زیادتی :- رات کے آخری حصہ میں، دن کے تین بجے، گرم کمرہ میں، گرم مشروبات سے لیٹنے سے، چھوٹنے سے، دبائے سے، نیند کے بعد، دہلیز جانب، تہہ ہو جانے سے، درزش سے، نیز دن کے تین اور پانچ کے دوران کبھی :- دن کے وقت، سیدھا بیٹھنے پر، کھلی ہوا میں، سرد غسل سے، بالعموم ہر قسم کی سردی سے، نیند کے دبائے، چلنے اور کھڑکھڑانے سے۔

معاون :- نیٹرم میور
 مصلح :- ایپس ، اپیکاک ، یکے کس ، لیکک ایڈ ، پائینا ، نک
 میٹا تیل ۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ، استقامت حالتوں میں چھوٹی
 طاقتیں ۔

APOCYNUM

ایوپوساٹم

تخصوصی علامات

۱۔ استسقاء جس کے ساتھ پیاس ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر استسقاء اور پیشاب کی تکالیف خاص کر پیشاب رک
 جانے کے عوارض میں مستعمل و مفید ہے۔ شدید عرق النساء میں بھی تسکین
 بخش ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض الجھا ہوا ، پریشان ، پرمردہ ، مایوس اور کم ہمت ہوتا
 ہے۔ بوڑھے تاش بینیوں کی غشی میں جبکہ دل کا فعل باقاعدہ نہ ہو اور پیٹ

میں بھی شور ہو۔ اس دوا کا استعمال اکثر اچھے نتائج پیدا کرتا ہے، قوت
حافظہ کمزور ہو، ناک میں سوزش ہو، جلد دکام لاحق ہو جاتا ہے۔
جی متکاتے، غنودگی ہو، قے زیادہ ہو، استسقاء اور مقامی ورم جبکہ
پیشاب مثانہ میں اکٹھا ہو، جلد پھول ہوئی اور چمکتی ہوئی، نبض کمزور ہو،
قبض اور فم معدہ میں گراوٹ محسوس ہو رہی ہو، پیاس شدید ہو، لیکن
پانی پینے کو جی نہ پائے، اگر پی لیا جائے تو فوراً قے ہو جائے یا درد پیدا کرنے
کا باعث ہو۔ اگر گرتے صبح سالم ہوں تو استسقاء میں اس کا استعمال شاف ہے
بصورت دیگر یہ عارضی طور پر مسکن دھم ہے۔ ایسے استسقاء میں جبکہ دل کمزور
ہو گیا ہے اور خون کا دباؤ کم ہو یا استسقاء لمبی کے آخری درجوں میں
اس کے استعمال سے حوصلہ افزا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

نونیہ کا آخری درجہ جبکہ سانس میں وقت ہو، ورم شش اور فل کمزور
ہو، دمہ جو پیپٹریوں میں سو جن کا باعث ہو، خشک کھانسی، مریض لمبا
سانس لے،

تیلے اسہال ہوں، مبرز میں دکھن ہو۔

مثانہ پھولا ہوا، درد کا احساس، پیشاب کی نالی میں جلن اور قوت
واضعہ کمزوری۔

عورتوں میں قلت حیض، پیٹ پھولا ہوا، کمی خون، کمزوری اور غشی ہو۔
زیادتی :- سرد موسم میں، سرد اشیا کے استعمال سے یا جسم سے کپڑا اتارنے پر۔
طاقت :- زیادہ تر مدد لکچر ہی مستعمل ہے۔ بعض اوقات دیگر طاقتیں بھی
استعمال ہوتی ہیں۔

ASAFOETIDA

ایسا فوسید

تخصوصی علامات

- ۱۔ ریاحی نفع جس کا رخ نیچے کی بجائے اوپر کی طرف ہو۔
- ۲۔ مہشیر یا کدوے۔

عام استعمال

معدہ اورد آنتوں میں یسج کا اجتماع ہو یا خواتین میں مہشیر یا کدوے ہوں تو اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ برسی آنکھوں اور کانوں کی سوزش تکالیف میں نیز مدیوں کی بھر بھراسٹ ہو اور ان میں درد ہو تو ان عوارض میں بھی یہ دوا کار آمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

معدہ میں ہوا، معدہ پھولا ہوا، انترا یاں ہوا سے بھری ہوئی اور ان کی حرکات میں بے قاعدگی۔ ڈکار آنے میں تکلیف ہو، ڈکار کے ساتھ صلق میں پانی آئے، غم معدہ میں تسکین ہو، پیٹ میں تیز درد ہو، ریاح کی گر گر اسٹ جو کہ بعد میں زور کی ڈکار کے ساتھ باہر نکلے۔

آتشک کی وجہ سے ہونے والا آنکھ کی سیاہ پیل کا درم، آنکھ کا درد جو رات کو زیادہ ہو۔

کان میں درد ہو اور بد بو نکلتے، یا بد بو دار پیپ خارج ہو، ناک میں آنکھ کے مارہ کی وجہ سے نہایت بد بو دار مواد ہو اور ساتھ ناک کی بڑی بھی مشابہ ہو کر کوئی گولہ گلے میں آکر اٹک گیا ہے۔ اور ایسا احساس ہو کہ انتر زبانی لٹے رخ حرکت کر رہی ہیں اور خوراک کی نالی معدہ کی طرف سے کھینچ کر گلے کی طرف آ رہی ہے۔

پیٹ اور معدہ میں ہوا کے اجتماع سے تکلیف، تنگی اور بے چینی خوراک کا معدہ میں اور پکی جانب اچھٹا، تناؤ کے ساتھ معدہ میں دھڑکن کا احساس، زرد اور ڈکار آئیں، شدید درد معدہ، معدہ اور پیٹ دھچکاتی کے درمیان کی جھتی میں درد، بے چینی، پیٹ میں ہوا کے چلنے سے آنسوؤں میں گر گر اہٹ۔

غیر حاملہ مستورات کے پستانوں میں دودھ کی موجودگی، حاملہ میں دودھ کی کمی اور ساتھ درد کا احساس۔

مقعدہ تنی ہونے اور درد والی، شدید قبض، سیون میں درد، سینہ میں گھٹن، ایسا احساس کہ پھیپھڑے پورے ہی طرح پھیلی نہیں رہ سکتے شدت کی دھڑکن۔

بڈیوں میں شدید درد اور بھر بھرا ہٹ، بڈیوں کے سرے درد کریں، سوزش اور بڑھے ہوئے، ایسے پھوٹے جو بڈیوں تک پہنچے ہوں اور جن سے رقیق زرد رنگ کا مواد خارج ہوتا ہو، گویا کہ مینٹیک کو پانی میں گھول دیا گیا ہے۔

جلد خارش کرنے والی، کھجلائے سے آرام ملے، پھوٹے جن کے کنارے

شدید طور پر درد کریں اور امراضِ جلد کے فہنے سے پیدائشی والے
عصبی عوارض۔

زیادتی :- رات کے وقت، چھونے سے، باتیں پہلو لیٹنے سے، آرام
کرنے سے، گرم ٹیکو سے۔

کسی :- کھلی ہوا میں، حرکت سے، دباؤ سے۔

مصلح :- کمیض، مرکبوریس، کاشیکیم، چائنا، پلساٹیل، ولیریانہ۔
طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ تک متعلق ہے۔

ACID PICRIC

ایسڈ پیکریک

خصوصی علامات

- ۱۔ عصبی نقاہت (نیورسٹینیا) اور اس کے باعث پیدا ہونے والے
عوارض۔
- ۲۔ دماغی تھکن لکھنے پڑھنے والوں کی۔
- ۳۔ درد سر گدی یا گردن کے مقام میں جس کی زیادتی ذرا سی دماغی محنت
سے ہو جاتی۔
- ۴۔ ریڑھ کے ستون کے ساتھ ساتھ جلن
- ۵۔ تمام جسم میں تھکاوٹ اور بھاری پن۔

عام استعمال

اس دوا سے قوائے جسمانی جو مفصل ہو گئے ہوں اور موجودہ دند کی طرز معاشرت کے باعث قوت سلب ہو گئی ہو اور از سر نو اپنی اصل حالت پر آجاتے ہیں، خراب ہنس جو تدریج بڑھ رہا ہو، سوزاک، انجیر کی طرح متے، شدید عصبی نقامت اور اس سے متعلقہ عارض، ضعف، درد گردہ، اور باؤ گولہ (ہسٹیریا) میں مستعمل و مفید ہے۔ اس کا ایک فیصلی معمول خارجی طور پر استعمال کرنا، جل جانے اور احراق کے لئے نافع ہے۔

عمومی علامات

ذرا سی محنت سے تکان معلوم ہو، اس کے ساتھ ایسا محسوس ہو کہ تمام جسم تنگ ہو گیا ہے، کسی سے گفتگو کرنے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہر ایک امر سے بے توجہی، جسم کے کسی حصہ کا سُن اور بے حس ہو جانا، جسمانی ریاضت کرنے کی طبیعت نہ چاہے، تھوڑا سا لکھنے پڑھنے سے طبعی تکان واضح ہو جائے۔ مطالعہ کرنے یا خیالات کو یکسر کرنے کی اہلیت معدوم ہو گئی۔ عصبی نقامت واضح ہو، پٹھے کمزور ہوں۔ لکھنے والوں کا فالج، حلقہ کمزور اور قوت شہوانی بڑھی ہوئی، کمی خون جو روز بروز بڑھتا جائے، پیشاب مکمل طور پر بند ہو جانے کے باعث پیشاب کا زہر بایاں پیدا ہو جائے۔ دماغی محنت کی وجہ سے سرد و گرمیوں کے مرض کی وجہ سے ایسا داگ بلا شہرت ہوتی ہو۔ چھوٹے چھوٹے جسم کے مختلف مقامات پر نکل آئیں۔ بالخصوص بیرونی کان

کی نالی میں، ریڑھ کے ساتھ ساتھ جلن ہو، ریڑھ کے ستون اور کمر میں اُرد
 کمزوری ہو، حرام مغز نرم ٹپ گیا ہو، غدہ قدامیہ بڑھ گیا ہو۔
 زیادتی :- خفیف محنت سے، خاص کر دماغی محنت سے، سونے
 کے بعد، مرطوب موسم کے بعد۔

کسی :- ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈے پانی سے، دباؤ سے۔
 طاقت :- ۶ نمبر سے ۳۰ طاقت تک عام طور پر مستقل ہے۔

ACID SULPH

ایسڈ سلف

خصوصی علامات

۱۔ باوجود نہلانے کے بچے سے کھٹی بو آئے۔

۲۔ کھٹی ٹوکاریں جس کے باعث دانت تک کھٹے ہو جائیں (دوبنیا)

عام استعمال

ماضیہ کی کمزوری، خورک اغذیہ کھانے کو جی چاہے، لرزش، لرزدہ،
 اور عام کمزوری، مریض عام طور پر جلد باز ہوتا ہے، چہرہ پر موزنی جسم میں
 حرارت کا احساس جس کے بعد پسینہ سے شرابود ہو جاتے، چوڑ
 لگ جانے کے بعد کسی زخم کے مراد ہو جانے کا اندیشہ، سیدہ کا اثرات
 بد، لکھنے والوں کے ہاتھوں کا لرزش یا تشنج وغیرہ عوارض میں عام طور

پرستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض جلد باز ہوتا ہے، سوالات کا جواب دینے کو جی نہ چاہیے۔

سر میں داہنی طرف درد، ایسا احساس کہ سر میں داغ یا دھبہ ڈھلا ہوا ہو گیا ہے۔ اور ادھر ادھر ٹکرا رہا ہے۔

منہ آیا ہوا، منہ سے بدبو آئے، مسوڑھوں سے خون نکلے۔

معدہ اور سینہ میں جلن، کھٹی ڈکاریں آئیں، وانت کھٹے ہو جائیں، شراب

پینے کی خواہش ہو، پانی پینے سے پیٹ میں ٹنڈک ہوتی ہے۔ معدہ ڈھیلہ ڈھالا معلوم ہو، قہوہ کی بو سے نفرت ہو، کھٹی تے ہو، تازہ کھانا کھانے کو جی چاہیے، پچکایاں آئیں، ایسا محسوس ہو کہ بائیں طرف کی آنت اتر آئے گی۔

بواسیر میں کچھ رطوبت کا اخراج، ایسا محسوس ہو کہ مقعد میں بڑے گیند کی طرح کچھ اٹکا ہے۔ اسہال سیاہ، بدبو دار یا خاند، اس کے ساتھ جسم سے کھٹی بو آئے اور پیٹ خالی ہو۔

مستورات میں حیض جلد اور بکثرت آئے، جلن والا اور خراش پیدا کرنے والا سیلانہ الرحم، اس کے ساتھ اکثر خون آمیز رطوبت کا اخراج ہو۔ سن رسیدہ عورتوں کے رحم کی گردن میں خراش ہو۔

ماٹھ یا بازو میں تشنچ ہو، لکھنے کے وقت انگلیاں پھڑکیں (سینم) کا ٹیکم، سائیکلامن)

جلد پر بیرونی خستہ وغیرہ سے تکلیف ہو، سرخی جس پر کھجلی محسوس ہو

کسی مخزج سے سیاہ خون کا اخراج ۔

زیادتی :- زیادہ گرمی یا زیادہ ٹھنڈک سے ، سہ پہر کو اور شام کو ۔
کمی :- گرمی سے اور مقام تکلیف کے پہلو لیٹنے سے ۔

معاون :- پلسا ٹیلا

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک عموماً مستعمل ہے ۔

ACID PHOS.

ایسڈ فاس

خصوصی علامات

- ۱۔ رطوباتِ زندگی کے ضائع ہوجانے کے باعث کمزوری ۔
- ۲۔ مریض لاپرواہ ، بے توجہ ، زندگی کے کاروبار سے بے پروا ۔
- ۳۔ غم و اہم سے کمزور شدہ مریض ان اشیاء کی طرف سے بھی لاپرواہ اور بے توجہ ہوجائے جن سے قبل ازیں اسے خاص لگاؤ رہا ہو ۔
- ۴۔ چاند پر کھینے والا وزن ۔
- ۵۔ دست سفید رنگ کے اور بغیر درد کے جن سے کمزوری پیدا نہ ہو ۔
- ۶۔ پیشاب مقدار میں زیادہ بغیر رنگ کے پانی کا سا خصوصیات کو ۔
- ۷۔ انزال ، بار بار ، مقدار میں زیادہ کمزور کرنے والے ۔
- ۸۔ مریض غمگین اور شفا سے مایوس ہو ۔
- ۹۔ دماغی ٹائیفائیڈ یا مائیفیس میں مکمل لاپرواہی اور غنودگی ۔

عام استعمال

کمزوری، عصبی تکان، خاص کر ایسی کمزوری جو رطوباتِ زندگی کے ضائع ہو جانے کے بعد پیدا ہو، محبت میں مایوسی کے اور غم و اندوہ سے پیدا شدہ خراب نتائج۔ ایسے نوجوان افراد جو بہت جلد تیزی سے بڑھ گئے ہوں اور جسمانی یا دماغی کام بہت کرتے ہوں، شام کے قریب یارات کو پسینہ کی زیادتی، ہڈیوں کے عوارض، ہڈیوں کے پردوں کی سوزش، ہڈیوں کا سوکھ جانا، لڑکھڑاتی چال، جلادرد اسہال، بچوں کا زرد اور بیمار نظر آنا، محرقہ بخار میں جریانِ خون کا خطرہ وغیرہ ہو تو اس کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ جریان، نامردی اور ذیابیطس میں بھی نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر لا پرواہ، گفتگو کرنے کو جی نہ چلے، خاموش اور غمگین ہے، سرام، غنودگی، غصہ، آئندہ کے لئے تشویش ہو۔ بہت زیادہ غمگین ہونے کے بعد چاند میں شدید درد ہو جیسے دماغ کچلا گیا ہے۔

آنکھیں متورم، اوپر کے پوٹے پر گونامنی، چمکیلی اشیا کی طرف دیکھنے سے چکا چوند، پوٹے اندر کی طرف سر د معلوم ہوں۔ کانوں میں گنگناہٹ ہو، شور برداشت نہ ہو سکے۔

مسوٹھے دانتوں کو چھوڑ دیں، دکھن ہو اور خون بہتا ہو، رات کو آگے کے دانتوں میں جلن کا درد، لیسڈر بلغم زبان پر، زبان اور

حلق خشک مگر پیاس نہ ارد۔

معدہ میں بوجھ معلوم ہو، ایسا محسوس ہو کہ معدہ اوپر نیچے ہم وزن ہے، حوالی جگر میں بوجھ۔

پاخانہ کثیر المقدار تپلا پانی کا سا، بلادررد کے اسہال جن میں کمزوری نہ ہو، دودھ کی طرح پیشاب اس میں قوام کی طرح خون آمیز ٹکڑے اور گردہ میں درد، رات کو کثیر المقدار پیشاب بلا رنگ کا ہو، ذیابیطس، اعضائے تناسل میں کھجلی ہو، حشفہ میں، فوطوں میں کھجلی گویا کوئی کاٹتا ہے، منی کا اخراج خاص کر حلق کے بعد۔

حیض بہت قبل از وقت اور بہت دیر تک قائم رہنے والا، حیض دردِ جگر کے ساتھ، رحم کا زخم جس سے کثیر المقدار گندی خون آمیز پیپ، درد اور کھجلی کے ساتھ خارج ہو۔

گلے کا بھاری پن، کھانسی جو کہ گلے اور کوڑھی کے پاس خراش ہونے سے پیدا ہو اور صرف صبح کو بلغم آئے، کھانسی اور اس کے ساتھ مواد والا بدبو دار بلغم آئے۔

نیند دن کے وقت بہت آئے، رات کو بیخوابی، پریشان کن خوابوں کی کثرت۔

بخار لرزہ کے ساتھ بغیر پیاس کے، اس کے بعد اتنا شدید بخار کہ مریض بیہوش ہو جاتے، ٹائیفائیڈ بخار، نوبتی بخار جو رات کو آئے (باری والا بخار) پسینہ میں پیاس، صبح کو زیادہ پسینہ آئے، تمام بدن کی جلد پر پچتے پچتے جن میں کھجلی کی وجہ سے صلب زیادہ ہو کھجلیات ہوئے زخم ہو جاتے جس سے گندامواد نکلے۔

زیادتی :- دماغی بیماری سے ، رطوبات زندگی خاص کر منی نالی کے لئے ہے
جلق سے ، کثرت جماع سے ، بات کرنے سے سینہ میں کمزوری
معلوم ہو۔

کسمی :- حرکت سے ، گرمی سے ، مرطوب موسم میں ۔
معاون :- چائنا ، پسینہ ، دست اور کمزوری کی حالت میں قبل
یا بعد ۔

کھانے کے بعد کمزوری کی حالت میں نکس و امیکا کے بعد ۔
ٹائیفاڈ میں رسٹا کس کے بعد ۔
مصلح :- کیفیر ، سٹانی سیکریا ، کافیا ۔
طاقت :- پہلی طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر ۔

ACID NITRIC

ایسڈ نائٹرک

خصوصی علامات

- ۱۔ جسم تکلیف دہ اثرات کو بہت جلد قبول کرے ۔
- ۲۔ درد چھیننے کے سے ، پھانسی لگنے کے سے ۔
- ۳۔ احساس پھانسی کا موقوفہ حصص میں ۔

۴۔ مقدمہ میں پاخانہ کے بعد شدید کاٹنے والے درد جو بہت دیر تک

قائم رہیں (ریشہ نیا، سلف)

۵۔ پیشاب مقدار میں کم، سیاہی مائل بھورا، بہت تیز پروالا۔

۶۔ پیشاب خارج ہوتے وقت ٹھنڈا محسوس ہو۔

۷۔ زخم میں چانس کا سا درد۔

عام استعمال

یہ دوا متعدد امراض میں کام آتی ہے۔ پارہ کے اثرات بدہوں بدبودار
پیشاب آتا ہو، اور آتشک وغیرہ کے باعث سوجنے والے امراض جلد، ٹڈیوں اور
غددوں کے عوارض، پرانی سنگرہنی، مسوڑھوں، دانقوں، زبان اور
دہن کے عارض جو پارہ کے غلط استعمال سے لاحق ہوں، ناک کا ڈھنکیر یا
تبّاق (میں کلکیر یا کاسب کے بعد)، خنازیر، شدید خنازیری رمدِ چشم،
بچوں کا رمدِ چشم، سوزاکی رمدِ چشم، گکٹیوں کی سوجن، سوزاک، سچیش
پھیپھڑوں سے جریانِ خون، بلغم خراب، خونی سیال خارج ہوتا ہو،
تو اس دوا کا استعمال حسب علامات مفید ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض عکین، رنجیدہ، ناامید، موت سے خوف زدہ
ہوتا ہے، کام کرنے کی رغبت نہیں ہوتی، حلقہ کمزور ہوتا ہے۔
درد سر یا چکر صبح اور شام کو جس کی وجہ سے مجبوراً لیٹا پڑے۔
آنکھوں میں ٹھیس، نرم، اوپر کے پچوٹے کا فالج، آنکھوں کے

سامنے سیاہ دھبے گھومتے محسوس ہوں۔ آنکھوں سے پانی جاری ہو،
 روشنی میں آنکھیں چندھیا جائیں۔

کانوں میں گھر گھڑا ہٹ، مواد خارج ہو، بہرائی، کان بند ہو جائیں
 چھونے سے، ٹیس اور جلن ہو۔

ناک سے خون جاری ہو، بدبو دار ہوائیاں نکلے، گندہ اندر و بطن خارج
 ہو، جلن ہو، پیپٹریاں پڑیں، بہت شدید زکام ہو۔

چہرے کا رنگ زرد ہو، مہاسے نکلیں، ہونٹوں میں زخم ہو، کال
 کی ہڈی میں درد ہو۔

دانت زرد اور ڈھیلے ہوں، تھپکن خاص کمرات کو پاسونے کے
 وقت ہو، بوسیدہ دانتوں میں درد ہو، منہ سے گندہ بدبو نکلے، رال بہے
 منہ میں خشکی اور بہت پیاس ہو، مسوٹھے سفید، سوجے ہوئے خون دیتے
 ہوں، آتشک یا پارہ کی وجہ سے منہ اور حلق میں زخم ہوں، حلق میں ورم،
 اور ایسا درد ہو کہ گویا چھل گیا ہے، گندہ دہن ہو، رال میں خون آئے۔

اکثر متلی اور تھکے کرنے کو جی چاہے، ذائقہ تلخ اور خاص کر کھانا کھانے
 کے بعد صبح اٹھتے ہی شدید پیاس ہو، کھٹی ٹوکائی، باضمہ کی خرابی جو کہ
 گاڑی پر سوار ہو کر گھومنے یا چلنے پھرنے سے درست ہو، جگر کے قریب
 درد ہو، ران کی گلیٹیوں میں ورم ہو اور مواد ہو، پیٹ میں بیلج زیادہ اور
 بدبو دار جمع ہوں۔

پانخانہ کبھی کبھار ہائشک اور سخت ہو، عموماً پتلا، بار بار ہو، مقعہ میں
 کھلی، بواسیر کے مستوی میں ورم اور ان سے رطوبت یا خون جاری ہو، مہرن
 کے کنارے چٹخے ہوئے، میعاد ہی بخار میں پانخانہ میں خون آئے، ہمیشہ جس

میں خون آتے اور مروڑ ہو۔

پیشاب رکنا دشوار ہو، پیشاب میں گھوٹے کے پیشاب جیسی باتاں، برداشت بدبو ہو، خون آئے، پیشاب کے سوراخ پر درم ہو، پیشاب کھنے میں درم ہو۔

مردوں پر سپاری پر زخم اور ٹیس کا درد ہو، نوتوں میں درم، ایسا دلگ اور خواہش مباشرت غائب، عورتوں میں حیض جلد اور بکثرت، ایسا معلوم ہو کہ شرمگاہ کے راستے سے ہر ایک چیز باہر نکل پڑے گی، سیلان الرحم سخت بدبو دار اور جھوٹے رنگ کا ہو، پستان کی صفائی میں پیوڑا ہو، فرج کے اندر زخم ہو، سینہ میں چھین، سانس لینے میں تکلیف، دل کی دھڑکن، خاص کر زینہ چڑھنے پر خشک بخون کھنے والی کھانسی، لیٹنے پر سانس لینے میں ہنم کی آواز پیدا ہو۔

بنجار لرزہ کے ساتھ شام کے وقت لیٹنے سے قبل، کپڑا ڈھکنے سے تکلیف زیادہ ہو، پاؤں اور پنڈلیاں گھٹنوں تک سرد جس کے باعث نیند نہ آ سکے بنجار میں کپڑا اوڑھنے سے نفرت، گرمی کے دور، بار بار کسی ایک عضو پر یا کل جسم میں پسینہ، سانس جسم پر کھانا کھانے کے بعد پسینہ، پسینہ کے ساتھ ہاتھ ٹٹڑے، ناخن نیلے، پسینہ مثل گھوٹے کے پیشاب کے بدبو دار ہو، تلووں میں پسینہ بکثرت، پاؤں کے انگوٹھے اور ان کے نیچے تلوے دکنے لگیں، ایسا معلوم ہو کہ سوتیوں پر چلے ہیں۔

جلد پر کھیل ہو، مسامات خشک ہوں، سیاہ جھوٹے سرخی مائل دھبے زخم جو آسانی سے خون دے دیں، متے — پاؤں میں گھٹے کے باعث درد۔

زیادتی :- شام کو رات کو چھوٹے سے ، موسم کی تبدیلی سے ، جاگنے سے ، بیٹھے ہوئے اٹھنے سے ۔
 کسی :- گاڑی پر سوار ہونے سے (بریکس کا کیولس کے) نیز ڈکاء کے سے
 معاون :- آرسینکیم الیم ، کیلڈیم
 مصلح :- کلکیریا ، کونیم ، ہیرپلٹ ، مرکوریس ، عزیزیم ، پٹیل ،
 سفر ،
 یاد ہے کہ ایکس کے بعد نائٹریک ایسڈ ہرگز استعمال نہ کرنا چاہیے ۔

ACID

HYDROCYANIC

ایسڈ ہائیڈروسیانک

خصوصی علامات

- ۱۔ ہسٹیریا اور مرگی کے سے دوہے ۔
- ۲۔ اعصاب کا فعل معطل ہو (فالج)
- ۳۔ غشی جو کہ پھیپھڑوں کے تعطل کا باعث ہو ۔
- ۴۔ بیضہ کی سی علامات (آرسینکیم الیم ، وریٹیم)

عام استعمال

گلے کی بندش ، چھاتی کی تنگی ، دل کی دھڑکن ، نبض کی کمزوری اور

بے قاعدگی وغیرہ کے ساتھ ہونے والے عوارض میں حسب علامات مستعمل مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر غشی اور بے ہوشی کا میلان، سرسہم، خیالی تکالیف کا خوف، ہر ایک چیز سے خطرے کا احساس، گھوڑوں اور گاڑیوں سے ڈر، مکان کے گر جانے کا اندیشہ، موت کی دہشت۔

سر میں شدید درد، احساس جیسے داغ میں آگ لگ رہی ہے، آنکھ کی پتلیوں میں حرکت مفقود یا پتلیاں چھلی ہوتی، کن ٹیویں کے پاس شدید درد اور ان کے آس پاس چہرہ سرخ۔

جہڑوں کا دوروں کی صورت میں جڑ جانا، منہ سے جھاگ کا اخراج، ہنٹ زردی مائل نیلے، زبان سرخ۔

پانی پینے پر نذاکی نالی میں، گلے میں اور معدہ میں گر گڑا ہٹ پیدا ہو۔ معدہ میں درد، جو معدہ خالی ہو تو شدید صورت اختیار کر لے، چھاتی اور معدہ کے درمیان شدید دھڑکن والی درد۔

سانس تیز، زبردست اور شور کرنے والا، خشک، گلانہ کرنے والی شدید کھانسی، دمہ جس سے گلے میں بندش کا احساس ہو، کالی کھانسی، پھیپھڑوں کا فالج، پھیپھڑوں کی سوجن، دمہ، کالی کھانسی۔

شدید دھڑکن، نبض کمزور اور بے قاعدہ، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے، چھاتی میں شدید درد، شدید ویر قلب (سپائی جیلیا، آگڑاٹک ایٹم، مصلح :- کمپیز، کافیا، ایپیکاک، نکس و امیکا، اوپیم، ویرا ژرم البم۔

طاقت :- عام طور پر ۳۰، ۳۵ یا ۴۰ طاقت ہی مستعمل اور مفید ہے
 بڑی طاقتیں بہت کم استعمال ہوتی ہیں۔ خارش اور چھپاکی میں مارچر
 خارجی طور پر استعمال کی جائے۔

AESCULUS HIPPOCR.

ایسکیولس ہپ

خصوصی علامات

- ۱۔ مختلف حصص میں بھراؤ کا احساس۔
- ۲۔ بے حد چڑچڑاہٹ (کیمولا)
- ۳۔ مہرز میں خشکی اور حدت محسوس ہو جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھریں۔
- ۴۔ قبض جس کے ساتھ کمر میں شدید درد ہو۔
- ۵۔ پاخانہ کے بعد مہرز میں بوجھ، بھراؤ اور شدید درد، جو گھنٹوں قائم رہے (ایلو، اگنیشیا، میوریکس ایسڈ، سلفر)
- ۶۔ کمر کی ہڈیوں کے جوڑوں میں شدید درد۔
- ۷۔ بحالت عمل محسوس ہو جیسے کمر جواب دے گئی ہے۔

عام استعمال

خصوصی طور پر بواسیر کے معالجہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

متواتر میٹھا میٹھا کمر کا درد، کولہ اور نشست گاہ کی ہڈی تک ہو جو چلنے یا جھکنے سے زیادہ ہو۔

مقعد بکڑی کے ٹکڑے، بھرے ہوئے محسوس ہوں، مقعد میں کانٹے چھبیں، مقعد میں ریت بھری ہوئی معلوم ہو (کالمن سونیا)

دل کی ایسی دھڑکن جس کی تپکن ہاتھ پیروں تک ہو اور سوتے میں اور دن کو بھی سنائی دے۔ دماغی چڑچڑاہٹ زیادہ ہو تاکہ پستیا ٹیلا اور کالی کارب کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے والا درد، پھاڑنے والا درد پھاڑنے والا درد بھی اس دوا کے خواص میں ہے۔

سر کے پیچھے یعنی گھڑی میں درد ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر کچلا جائے گا۔ سر اور ہاتھ میں بھراؤ محسوس ہو۔

مقعد کی رگوں میں انجماد خون (بواسیر)، آنکھوں کی رگوں میں خون کا انجماد جس سے آنکھیں سرخ ہوں، آنسو آتے ہوں، جلن ہوتی ہو، ان کے ساتھ درد خواہ ہوتا ہو خواہ نہ ہوتا ہو۔

ماضیہ کی خرابی جیسے ہی مریض کھانا کھا چکے ویسے ہی پسینہ میں جلن اور کھانا منہ کو آنے لگے جس طرح کہ فاسفیرین، فیرم اور آرسینکیم میں ہوتا ہے۔ کمر میں درد جو کہ کولہ اور نشست گاہ کی ہڈی تک جاتے خاص کر وضع حمل کے بعد کے فوراً دنوں میں (زمانہ حمل میں ایسا درد ہوتا بھی یہ دوا مفید ہوتی ہے)

گھٹیا (بال کادر) جو کہ شانے سے ہاتھ تک ہو۔

مقعد اور پیڑ میں تباہ اور خشکی۔

بواسیر کے متے بڑے، نیلیوں اور ایسے پھولے ہوئے کہ پانخانہ کے راستہ کو بند کر دیتے ہوں۔ ان میں سخت برجھی مارنے یا کاٹنے کا سادہ ہو جو کہ اوپر آنت تک چڑھ جاتا ہو، مقعد میں رکاوٹ، بھرا معلوم ہونا، درد، خشکی، کھلبلی، چھینٹنے والی، اینٹھن، کانچ باہر نکلنا، درد اس قدر زیادہ کہ مریض نہ لیٹ سکے نہ بیٹھ سکے، ایسا محسوس ہو کہ کوئی اور صراہر پا تو چلا رہا ہے۔ آنتہائی درد والی بواسیر۔

زیادتی :- صبح کو بیدار ہونے پر، حرکت سے، پانخانہ کرتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، شام کے وقت، کھڑا ہوتے وقت۔

کسی :- تازہ کھل ہوا ہیں۔

مصلح :- نکس و امیکا، بواسیری علامات میں۔

طاقت :- در ٹیکچر نیز ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک۔

ACONITE

ایکونائٹ

خصوصی علامات

- ۱۔ حاد اور تازہ تکلیفات خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں جن کے اندر خون کی زیادتی ہو اور جو زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرتی ہوں۔
- ۲۔ تکلیفات جو ٹھنڈی خشک ہوا سے پیدا ہوں۔

۳۔ ڈر، خوف اور قلبی پریشانی

۴۔ چہرے پر خوف، زندگی خوف کے باعث وبال بن جائے۔

۵۔ دماغی اور جسمانی پریشانی اور بے چینی

۶۔ نوجوان موٹائی تیزی لڑکیوں میں حیض تک رک جائے خوف کھا جانے

کے بعد۔

۷۔ بنجار میں جلد گرم اور خشک ہو۔

۸۔ بنجار میں جلن دار پیاس، ٹھنڈے پانی کی زیادہ مقدار کے لئے۔

۹۔ بنجار میں از حد اعصاب لہجے چینی، جان بخشی کی سی حالت میں ادھر ادھر

کروٹیں مے۔

۱۰۔ کھانسی سانس باہر نکالنے پر (کاسٹیکم)

۱۱۔ کھانسی ٹھنڈی خشک ہواؤں سے یا سواکے مھوئے سے۔

عام استعمال

حاد اور شدید اچانک حملہ کرنے والے قریباً سبھی امراض میں یہ فوری اور پہلی دوا ہوتی ہے بشرطیکہ جسمانی اور دماغی مخصوص علامات موجود ہوں۔ مثلاً بے چینی، فکر، تشویش اور گھبراہٹ دماغی اور جسمانی جس کی وجہ سے تڑپ، ٹھنڈی سانسیں بھرنا، پہلو بدلنا، موت کا ڈر موت کے دن کی پیش گوئی، ذرا سی تکلیف میں بھی گھبراہٹ موجود ہو، کسی طرح تسکین نہ ہو۔

ایکونائیٹ ہر بنجار میں اندھا دھند دنیا بہت غلط ہے، یہ دوسرے دوائے بنجار میں دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ گھبراہٹ ضرور ہو۔

ٹائیفاؤ بخار کے آغاز میں ایکنائیسٹ ہمیشہ مضر ہوتا ہے بشرطیکہ
بخار میں کوئی تحریک کن جذبہ ساقہ نہ ہو۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض خوف زدہ ہو، شدید بے چینی، اعصابی تکلیف
موت کا ڈر، بے چینی، گھبراہٹ، تڑپ، درد برداشت نہ کر سکتا ہو،
چھوٹے کا برداشت نہ ہوا، کپڑے کو اتارنا برداشت نہ کر سکے، کبھی زنا
کبھی گانا، سرسام، خاص کر رات کو دماغ میں جھکے، ایسا محسوس ہو کہ کوئی
ادھر ادھر بلائے جا رہا ہے۔ خاص کر بیٹھے بیٹھے ایک دم اٹھنے سے سرور
کے مارے پٹپٹا پڑے، خیالات پر آگندہ، موت کا ڈر، حافظہ کمزور،
سر میں درد، تپکن کے ساتھ، کن پٹی میں بھاری پن، اندر سے بھیجا
باہر کو پٹپٹا پڑے، خاص مقام پر درد مثلاً پیشانی میں یا کن پٹی میں یا آنکھوں
میں یا اوپر کے جبرے میں، سرور دہننے سے یا جھکنے سے یا شور و غل سے
زیادہ ہو، آرام کرنے سے کم ہو، سرور چہرہ گرم، خاص کر اندر اور اوپر
گرم پسینہ نکلے۔

حادثہ آشوب چشم، آنکھوں میں جلن اور درد ہو، بھوول پر بھاری پن
آفتاب کے درشن سے گھبرائے، پوپٹوں کا درد شدید اور سرخی مائل۔
کانوں میں سخت درد دم اور بھاری پن کے ساتھ
ناک سے خون جاری ہونا، سونگھنے کی طاقت تیز ہو
چہرہ سوجا ہوا، سرخ اور گرم، اٹھنے پر چہرے سرخی زردی میں بدل
جائے، بائیں طرف چہرہ کا درد۔

ہونٹ خشک، سوجے ہوئے، منہ اور زبان خشک، پیاس زیادہ، دانت
کو ٹنڈی ہوا سے تکلیف، حلق میں بنجار کے ساتھ دم۔

پانی کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ کڑوا معلوم ہو، بھوک نہ ہو، شدید
پیاس جو سبھ ذائقے، ٹنڈے پانی کی خواہش، قتل اور تے۔

معدہ میں کھانے کے بعد سخت درد، دم جگر، حوالہ بگر میں بھاری
پن، کوڑی کے پاس سرد پتھر رکھا ہوا محسوس ہو (کا لچکیم)، پیٹ میں
جلن، پیڑو چھونے اور دبانے کو برداشت نہ کر سکے۔

پاخانہ پانی جیسا تپلا، بعض دفعہ سبز رنگ کا، درد اور نفخ کے ساتھ
قبض، بعض اوقات پچیش میں کم پاخانہ مروڑ کے ساتھ، متعدد کے ساتھ
ایسا محسوس ہو کہ گویا گرم پانی خالص ہوتا ہے۔

پیشاب کم ہونا، سرخ ہونا، گردہ میں اینٹھن، مثانہ کی گردن میں جلن
اور مروڑ۔

مردوں کے فوطوں میں درد، پیشاب کرتے وقت درد ہو، عورتوں میں
خصیۃ الرحم کا دم اور حیض کثرت سے اور زیادہ دنوں تک آئے یا پھر
دُر کی وجہ سے حیض بند ہو جاتے۔

نورخہ کا دم، ذات الجنب کا پہلا درجہ، خشک کھانسی یا خشک
سانس، چھینکے میں زور سے آواز نکلے، کھانسی کے دورے میں سچہ اپنا
گلا پکڑے (کیونکہ درد ہوتا ہے)، ذات الصدر (منویا) یا ذات الجنب
مع بنجار کے زیادہ پیاس، خشک کھانسی اور گھبراہٹ کے ساتھ پیچڑی
میں گرمی، سینہ میں چھین، دل دھڑکنا اور گھبراہٹ۔

نسیں کا نہ آنا، نہایت بے چینی، یا پھر نیند ہے مگر سونے کے

ڈراؤنے خواب نظر آئیں، بے چینی، کبھی سردی، کبھی گرمی لگنا، پرانی اور رنج۔

سنگار میں نبض تیز اور بھری ہوئی، کبھی سردی کبھی گرمی، گرم شکم جلد، درد، جلن اور جھنجھناہٹ کے ساتھ جلد کی خشکی اور کھوکھلاہٹ زیادتی، شام کے وقت یا رات کو درد ناقابل برداشت، گرم کمر میں، بستر سے اٹھنے پر تسکین والے پہلو کوٹ لینے پر کمی، دن میں، کھلی ہوا میں، آرام کرنے سے (بستر میں نہیں) پسینہ کے بعد۔

معاون :- ایٹک ایسڈ، بیلا ڈونا، بربرس وگل، سلفر مصلح :- آرنیکا (آنکھوں میں چوٹوں یا خراشوں کی صورت میں) طاقت :- ۳ سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

AGNUS CASTUS

ایگنس کاسٹس

خصوصی علامات

۱۔ دماغ غیر حاضر، سوچنے کی اہلیت میں کمی

۲۔ قبل از وقت بڑھاپا

۳۔ مکمل نامردی

۴۔ لیکوریا (سیلان الرحم) جس میں رطوبت غیر محسوس طور پر ڈھیلے

دوا جانے اعضائے متعلقہ سے نکلا کرے۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر آلات تناسل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مردوں اور عورتوں پر اس کا اثر یکساں ہے، مگر مردوں میں زیادہ وضاحت سے ہوتا ہے، کثرت جماع کی وجہ سے مریض قبل از وقت بوڑھا نظر آئے سوڑاک کئی بار ہو چکنے کی وجہ سے نامردی کا عارضہ ہو، موچ آجانے جوڑ اتر جانے کے لئے بھی موثر دوا ہے، جسم کے تمام حصوں میں کانٹے والی کھیل ہو، بالخصوص آنکھوں میں تو یہ دوا موثر و مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

مالغویا، موت کا خوف، نگین کے ہمراہ جلد مر جانے کا خیال ہو، خالی الذہن، جلد بھول جائے، آرام سے پست ہوں، مریض سے کستوری یا ہیرنگ پھیل کی بو آتی ہے، طبیعت گری گری اور اداس ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل ہوئی، آنکھوں میں خارش، روشنی ناقابل برداشت تلی میں سو جن اور دکن، پافانے نرم ہوں اور بدقت خارج ہوں اند کی طرف لوٹ جاتے محسوس ہوں، گہرا اشتقاق مقعد، ابکائیوں کے ہمراہ ایسا محسوس ہو کہ انتہاں نیچے کو دبائی جا رہی ہیں۔ آنٹوں کے پچلے حصہ کو کچڑا نا چاہے۔

مردوں میں پیشاب کی نالی سے زرد رطوبت خارج ہو، ایسا دگی بالکل نہ ہو، نامردی، عضو ٹھنڈا اور سکڑا ہوا، خواہش مفقود، سیلینیم،

کو نیم، سیبل سیرولانا)

ایستادگی محقوڑی سی منی خارج ہو جاتی ہو، قرعہ ہو، خفصے فوراً
ہوں، سوچے ہوئے سخت ہوں اور درد کریں۔

عورتوں میں حیض مقدار میں کم، جماع سے سخت نفرت ہو، انعام
نہانی سکڑی ہوئی اور سیلان الرحم ہو، چھاتیوں میں دودھ نہ ہو، غمگین
رہتی ہو، بانجھ ہو، زور لگانے پر شفاف سیلان الرحم جاری ہو۔
معاون :- آلات تناسل کی کمزوری یا نامردی میں انگلیس کا سٹس کے
بعد کیلیڈیم اور سیلینیم بہتر کام کرتے ہیں۔

طاقت :- ۲ x سے ۱۲ x تک اور ۲۰ طاقت۔

ALOE

ایلو

خصوصی علامات

- ۱۔ لیٹی کے سے بلغم کے ٹکڑے حلق یا مہرز سے گریں یا ان میں پیدا ہو
جائیں۔
- ۲۔ دست جس کے لئے کھانے اور پینے کے فوراً بعد پانچاند کو بھان
پڑے (کروٹن ٹمک)
- ۳۔ مہرز کی نالی پر بالکل اعتبار نہ ہو، صبح سویرے بستر سے اجابت
کے لئے بھاگنا پڑے (سورینم، ریو میکس، سلفر)

- ۴۔ درد شکم پانخانہ سے پہلے اور اس کے دوران ۔
 ۵۔ درد شکم اور مروڑ کے دوروں سے قبل قبض کی شکایت ہو۔
 ۶۔ پانخانہ سے قبل مبرز میں بھاری پن محسوس ہو۔

عام استعمال

یہ دوا جسمانی طاقتوں کو بحال کرنے کے لئے، جبکہ کثرت استعمال ادویہ کی وجہ سے دوا اور مرض کی علامات میں صلی ہوں، نہایت اعلیٰ ہے اس سے بڑھ کر دوسری کوئی ایسی دوا نہیں جس میں جگر کی طرف خون لے جانے والی وریوں میں اجتماع خون کی اس قدر علامات ہوں اور اس قدر عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہوں، اسی لئے بواسیر کی بہترین ادویہ میں یہ دوا بھی شامل ہے۔ مبرز اور پانخانہ کے دیگر عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

پانخانہ زرد خون ملا ہوا یا شفاف توام کی طرح آؤں ملی ہوئی۔ بعض اوقات آؤں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نو قشری غیر محسوس طور پر مقعد سے نکل پڑتے ہیں۔ بعض اوقات پیشاب کرتے وقت یا ریا ج خاسج کرتے وقت خود سنجود پانخانہ ہو جاتا ہے، بواسیر میں انگوڑ کے گچے کی طرح سے مسے نکل آئیں اور ان کو سرد پانی سے آرام ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ مقعد کے اوپر کسی بھاری چیز کا بوجھ ہے اور اگر مقعد کو سکونہ اجائے تو گر پڑے۔
 سیاح کے ساتھ پانخانہ ہو جانار (آلینڈر، میوٹیک ایسڈ)
 پیٹ میں پانخانہ کے قبل بہت گرگڑا مہٹ ہونا اور پیڑ اور مقعد

میں بوجہ معلوم ہونا، انگور کے گچھوں کی طرح کا نیچے نکل آنا، سرد پانی سے آرام ہونا (میوہ لگک ایسڈ میں گرم پانی سے آرام ملتا ہے)

ایلو اور میوہ لگک ایسڈ دونوں میں بوا سیر ہوتی ہے۔ ایلو میں کھینک زیادہ ہوتی ہے لیکن میوہ لگک ایسڈ میں دکن زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ بستر سے اُتر چھوٹنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایلو میں بوا سیر کے مستے انگور کے گچھوں کی طرح باہر نکل آتے ہیں اور ان کو سرد پانی سے آرام ہوتا ہے۔ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ مبرز کی کمزوری قبض میں بھی معلوم ہوتی ہے اور بستہ پاخانہ بھی خود بخود نکل جاتا ہے۔ پاخانہ کی خشکیت یہ ہے کہ علی الصبح قریب پانچ بجے کے حاجت کی وجہ سے جاگ پڑے اور مشکل تمام جلدی سے پاخانہ جاسکے۔ ایسی حالت میں سلفر، مٹوجا اور برائیونیا کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

کروٹن لگک میں بھی صبح کو دست آتے ہیں، بلکہ زرد پتلا پانی کا ایسا بلا درد کے اور کثیر مقدار میں ایک دم زور سے پاخانہ ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے نہایت کمزوری ہو۔ سلفر کے دست میں آؤں والا پاخانہ پتلا بلا درد کے یا غیر منہضم غذا پاخانہ میں خارج ہو اور مریض اٹھ کر صبح کو پاخانہ جلنے کے لئے بھاگے۔ مٹوجا میں زرد پاخانہ زبردستی نکل پڑے، اس کے ساتھ ریاح بھی خارج ہوں۔ برائیونیا میں سیاہ اور گندا سٹری ہوئے پنیر کی طرح بدبو دار پاخانہ ہو اور کچھ دور چلنے کے بعد پاخانہ زور کرے یعنی سوکر اٹھنے کے فوراً بعد نہیں آتا ہے بلکہ کچھ دیر کے بعد۔ لیکن ایلوز میں ایک عجیب حالت معلوم ہوتی ہے کہ گویا مقعد میں شدید کمزوری ہے خاص کر مبرز میں اور مریض محسوس کرتا ہے کہ باوجود

ایلیئم سیدیا

ALLIUM CEPA

خصوصی علامات

- ۱۔ زکام، مقلد میں زیادہ پانی کا سا اور ناک سے تیز سوزش پیدا کرنے والی رطوبت۔
- ۲۔ نزلہ دہی جگرے کے درم سے کھانسی، ایسا محسوس ہو کہ کھانسی لگے کو پھاڑ ڈالے گی۔
- ۳۔ پاؤں میں رگڑ سے پھوٹے کا سادرد ہو۔

عام استعمال

ناک یا آنکھ سے پانی کی سی خراش پیدا کرنے والی رطوبتوں کے اخراج ہوں تو یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

زکام جس کے ساتھ درد سر ہو خاص کر پیشانی میں، گرم کمرہ میں اور شام کو زیادہ، چہرہ میں دود کی لکیر کے مانند درد ہو۔
آنکھ یا ناک پر سرنخی اور جلن، آنسو بہیں، روشنی کی طرف دیکھنے سے تکلیف ہو، چھینکیں آئیں، خاص کر گرم کمرہ میں آنے سے ناک سے بہت پانی ہے، ناک کی جڑ پر کوئی چیز اٹکی ہوئی معلوم ہو، زور کا

کا بہتہ ہوا نہ کام، درد سر، کھانسی، آواز بجاری۔

معدہ میں ریاح کی گڑ گڑا ہٹ، بدبودار ریاح خارج ہونے سے پہلے
نہایت بدبودار۔

آواز بجاری، ٹھنڈی ہوا کی سانس لینے میں بہت کھکھک کرنے والی
کھانسی آئے، حلق میں خراشش، ایسا معلوم ہو کہ حلق چھل گیا ہے۔ سانس
لینے میں تکلیف۔

زیادتی :- شام کو، گرم کمرے میں
کھلی ہوئی اور ٹھنڈے کمرے میں

معادن :- فاسفورس، پلسا ٹیلا، سارسا پرٹلا، حقو جا
مصلح :- آرنیکا، کمیومیلا، کانیا، نکس دامیکا، حقو جا، وریٹر
طاقت :- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

AMBRA GRISEA

ایمبرا گریسیا

خصوصی علامات

۱۔ دوسروں کی موجودگی میں تک کہ نرس کی موجودگی میں پانخانہ نہ
کر سکے۔

۲۔ سیلان الرحم (سیکھدیا) گاڑھا، سبزی مائل سفید آؤں کا سا۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر نازک مزاج اور بیمار صورتِ اشخاص پر ہوتا ہے، جن کو ٹھنڈا آسانی سے لگ جاتی ہو۔ یعنی ایسے بچوں یا جوان لڑکیوں پر جو کہ عصبی طبیعت کے ہوں اور کمزور ہوں اور جن کو جلدی طیش آ جاتا ہو یا ان عمر رسیدہ مردوں پر جن کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں اور جن کو چکراتے ہوں، سخت قبض ہو اور جو کہ ہر کام جلد بازی سے کرتے ہوں اور ان کے خیالات میں وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا ہو۔ کھانسی میں بھی یہ دوا مفید ہے جو کہ عصبی اور تشنجی قسم کی ہو، کھانسی کے ساتھ گلا بھی بیٹھ گیا ہو۔ دیگر اشخاص کی موجودگی میں یا گفتگو کرنے اور پڑھنے سے کھانسی کا زور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھاتے رکی ہوئی ہے۔

یہ دوا اس وقت بھی منظر ہوا کرتی ہے جبکہ خفیف سی بات پر مثلاً لمبا سفر کرنے یا سخت پاخانہ کے آنے سے خون حیض جلدی ہو جاتا ہو، حیض قبل از وقت آتے ہوں اور دورانِ وقفہ کے لیکچور یا (سیلان الرحم) بزرگ نیلیوں آیا کرتا ہو۔ اندام نہانی میں وکمن اور سوجن ہو اور ساتھ ہی غارش بھی ہوتی ہو۔

عمومی علامات

دوسری طور پر مریض مردم بیزار ہوتا ہے، تنہا رہنا چاہتا ہے۔ گناہنے سے روٹا آئے، مایوسی، زندگی سے نفرت، شرمیلا ہونا ہے چن ہے اور

وہی تباہی ہے۔
 سر جھکاتے، سر میں کمزوری، دماغ کے اوپر کے نصف حصہ میں پھانسنے
 والا درد ہو، گھانا سننے کے وقت دماغ کی طرف دوران خون ہو، سنا کی کم فہم
 صبح کو کیسی ہے۔

ڈکاریں آئیں، اس کے ساتھ تشنجی کھانسی، سینہ میں جلن، آدھی رات کے
 بعد پیٹ اور پیڑ پیول جائے، پیٹ میں ٹھنڈک معلوم ہو، اعصابی تشنجی
 کھانسی، اس کے ساتھ آواز بجاری اور ڈکاریں جو کہ صبح کو چلنے پر آئیں، دوسرے
 کے ساتھ تکلیف زیادہ ہو۔ تشنجی جھونکنے والی کھانسی، دھڑکن موسینہ
 کے بوجھ کے، ایسا معلوم ہو کہ سینہ میں کچھ اڑا ہے، اپنی نبض خود معلوم ہوتی
 ہو، کھل ہوا میں دل دھڑکے۔

مثانہ اور متعدد میں ساتھ ساتھ درد اور جلن، پیشاب میں ایسا معلوم
 ہو کہ چند قطرے پیشاب کے رک گئے ہیں، پیشاب کرنے کے وقت
 پیشاب کی نالی میں جلن اور کھجلی، پیشاب کی دھار بھی گندی معلوم ہو۔
 عورتوں کو کثرتِ مجامعت، مراق، عورتوں کے پیشاب اور پاخانہ
 کے مقام کے درمیان سوجن، دکھن اور کھجلی، حیض بہت جلد، کثیر المقدار
 نیلیوں، رات کو سیلان الرحم زیادہ ہو۔ ایام حیض کے درمیان ذرا سی کچھ بات
 ہونے پر بھی خون جاری ہو جاتے۔

نورطوں میں سخت کھجلی ہو، گواہ پر سے سن ہوں لیکن اندر جان ہو
 بہت زور سے ایسا دگی ہو۔

اتقہ، پیر، انگلیوں اور ٹانگوں میں تشنج ہو، تفکر کی وجہ سے نیند نہ
 آئے، اٹھ کر بیٹھنا پڑے، متوحش خواب دیکھے، جلد میں کھجلی اور دکھن

خاص کراعضائے تناسل میں ۔

زیادتی بہ گرم اشیا کے پینے سے ، گرم کمرہ میں ، موسیقی سے ، لیٹنے سے ، پڑھنے سے یا باوانہ بلند بولنے سے ، دیگر اشتیخاص کی موجودگی میں جاگنے سے ۔

کسی بہ کھانا کھانے کے بعد ، ٹھنڈی ہوا میں ، ٹھنڈی خود آگ سے ، ٹھنڈی اشیا پر پینے سے ، بستر پر اڑ کر کھڑے ہونے سے ۔
مصلح : بکیمفر ، کافیہ ، نکس و امیکا ، پلسا ٹیلا ، شافنی سگریا ۔

AMMONIUM CARB.

ایمونیم کارب

خصوصی علامات

- ۱۔ نکسیر جب صبح کو منہ ہاتھ دھوتا ہو (آرنیکا ، میگنیشیا کارب) ،
- ۲۔ نکسیر کھانا کھانے کے بعد
- ۳۔ ناک کا بند ہو جانا خمر خانات کے وقت ، منہ کے راستہ سانس لینا پڑے ۔
- ۴۔ ذوق تیریا میں بچے سو نہ سکیں کیونکہ بندش کے باعث ناک کے ذریعہ سانس نہ آئے ۔

۵۔ زمین کے آغاز پر جینیفہ کی سی علامات (لبورسٹا ، ورمیٹر) ،

۶۔ حین کے دوران تھکاوٹ محسوس ہو

عام استعمال

یہ مضبوط اور گھٹیلے بدن والی عورتوں کی خاص دوا ہے۔ بشرطیکہ وہ جلدی ٹھک جاتی ہوں، جلدی زکام قبول کر لیتی ہوں، اور ایام مہواری سے قبل ان میں ہیضہ کے مشابہ علامات پائی جائیں۔ اور عام طور پر بیٹھنے کی عادی ہوں۔ چلتی پھرتی کم ہوں اور ان کا دل کمزور ہو اور عام امونیا سونگھنے کی عادی ہوں۔ جنہیں ایام مہواری قبل از وقت اور زیادہ مقدار میں آتے ہوں۔ اس دوا کا اثر جھلی اور آلات تنفس پر خاص طور پر ہوتا ہے۔

موٹے آدمی جن کے دل کمزور ہوں، سانس تنگی سے آتے اور گلے کی بندش محسوس کریں صبح معنوں میں اس دوا کے مریض ہوتے ہیں، ایسے افراد کو ٹھنڈی ہوا میں جلتے ہی زکام لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو انیونیوں کی طرح پانی سے ڈر لگتا ہے اور اس کو ہاتھ لگانے سے بھی کانپتے ہیں اور اس کی شکل سے ہی دودھ بھاگتے ہیں۔ خون میں پیشاب کے ذرہ کا سرایت کر جانا، تمام اعضاء میں بھاری پن۔ اس کا مریض گندی عادتوں والا اور گندہ رہنے والا ہوتا ہے، جسم کے کسی عضو میں سوجن، غودوں کی سوجن اور تیزابی مواد کا اخراج بھی اس دوا کے زیثر آتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بد مزاج، چڑچڑا، زرد منہ اور بہت جلد بھول جانے والا ہوتا ہے۔ اس میں ناسد مادوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ خاص کر طوفانی موسم میں یہ علامات زیادہ واضح ہوتی ہیں۔

داغ میں درم ہو، جسم سرد اور شہق کمزور ہو، ماتھے میں دھڑکن ہو
 آنکھوں کے لئے روشنی ناقابل برداشت ہو، جلن ہو، زیادہ دیر
 تک نظر جھانک نہ دیکھ سکے۔

نزلہ جس میں ناک بند ہو اور مرض دم گھٹنے کے باعث بیدار ہو
 جائے۔ سوزش نزلہ جس کے ہمراہ حلق میں جلن ہو، منہ دھوئے وقت تک
 بھوٹے۔

چہرہ پر پھینسیاں ہوں، جن میں دھکن اور جلن محسوس ہو، منہ خشک
 دانتوں میں درد ہو، زبان پر آبلے ہوں، ذائقہ کڑوا ہو، ہونٹ نیکیوں ہوں
 خشک کھانسی، سینہ میں جلن، شدید اختلاج قلب ہو، دم گھٹ
 کر آئے اور حرکت سے غشی لاحق ہو۔

پیٹ میں درد اور گر گر آہٹ، متعین خارش ہو، بواسیر اپنے
 دوسرے کے وقت نہایت تکلیف دہ ہو، بواسیر کے متے باہر نکلتے رہتے
 ہوں، پیشاب کی بار بار حاجت ہو،
 جلد پر شدید خارش، جلن دار آبلے، بالخصوص اعضاء تشل اور
 دھڑکے قریب۔

زیادتی :- سرد و مطلوب موسم میں، تماشیاہ کھانے سے ۳ بجے سے
 ۴ بجے صبح تک، ایام حیض میں اور نہانے سے۔
 کبھی :- شام کے وقت، معدہ کے بل لیٹنے سے، دامن کرڈ
 پر لیٹنے سے، ماذنہ کرڈ لیٹنے سے، بیرونی دباؤ سے، گرم
 کمرے میں، خشک ہوا میں۔
 مخالف :- یکے سے

مصلح :- آرنیکا، کیمفر
طاقت :- چھوٹی ہی طاقتیں زیادہ تر مستعمل و مفید ہیں۔

انٹی مونیم ٹارٹ. : ANTIMONIUM TART.

خصوصی علامات

- ۱۔ جب مریض کھانا نہ تو جھپٹے کی نالیوں میں بلغم کی بہت بڑی مقدار جمع معلوم ہوتی ہے۔
- ۲۔ چہرہ، ٹھنڈا، نیلا، پیلا، ٹھنڈے پسینے میں تر (ٹوئیکم)
- ۳۔ سیب کھانے کی غیر معمولی خواہش۔
- ۴۔ تپ کے بعد غنودگی اور تقاہت۔
- ۵۔ دم گھٹنے، غنودگی اور بے ہوشی کے ساتھ سجدہ نمید یا نیند کی نہ لکنے والی خواہش۔

عام استعمال

اس کا استعمال آلات تنفس کے امراض میں اکسیرا بہت ہوتا ہے۔ بلغم کا چھاتی میں خوراک اور کثرت سے خارج ہونا اس کی مخصوص علامات ہیں۔ غنودگی، کمزوری اور پسینہ آنا ایسی علامات ہیں کہ جہاں پر یہ دوائی استعمال کی جائے وہ کم و بیش ضرور موجود ہونی

چاہئیں، شاربیوں کی اور تقریباً افراد کے متواتر اندھام، مہینہ، درگوں میں
سردی محسوس ہونا، تمام بدن کا پتہ، سخت کمزوری، غشی اور دروگر
کے لئے بہت مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض میں ہریان کی کیفیت ہو، اپنے آپ ہی باتیں کرے،
اکٹا ہونے کا خوف، ذرا ذرا سی بات سے خائف ہو، شام کے وقت
کچھ زیادہ ہی خوشی طاری ہو، طبیعت سست، خائف اور بے قرار
بڑھ جائے بغیر کسی کو اپنا آپ چھوئے نہ دے۔

زبان سفید ہو، جس پر موٹا میل ہو، کنا سے سرخ، بعض دفعہ بھڑکی
بیچ میں سرخ اور خشک۔

چہرہ سرد اور نیلیوں، زرد، چہرہ پر سرد پسینہ، ٹھوڑی اور نیچے کا
جھڑا متواتر کا پتہ ہوا۔

ذہنی چیز آسانی سے خلق سے نہ اتر سکے، بجز واسنی کر ڈٹ لیٹنے
سے کسی دوسرے پہلو لیٹنے پر تے ہو جائے۔ مثل، ابکا آ اور تے
خاص کر کھانا کھانے کے بعد، تے آنے کے بعد غشی ہو، ٹھنڈے
پانی کی زیادہ پیاس۔

سینہ میں بغم آواز نہ دے، کھنکھانے سے بہت کم نکلے سینہ
میں جلن جو خلق تک پہنچے، پانی تھوڑا اور بار بار پئے، تیشہ بنی فوٹج
ریاح کی زیادتی، پیٹ میں دباؤ، خاص کر آگے جھکنے سے، مہینہ،
ضیق النفس (سانس کی تکلیف)، جلد جلد سانس لے، سانس لینے

میں تکلیف، ایسا معلوم ہو کہ دم گھٹ جائے گا۔ اٹھ کر بیٹھنا پڑے
دم بدم کھانسی اور سانس کے لئے منہ پھیلاتے، پھیپھڑوں، ہوا کی نالیوں
میں بلغم خوب بھرا ہوا، کھانے سے کھانسی نہ زیادہ ہو اور سینہ اور حلق میں
درد ہو، پھیپھڑوں کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہو، دھڑکن اور سینہ میں
گرمی، نبض تیز اور کمزور۔

گھر میں سخت درد، خفیف حرکت کرنے سے (ملنے سے) بھی متلی
ہو اور سر دپسینہ آئے، نشست گاہ کی ٹہری میں بوجھ ہو اور معلوم ہو
کہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔

چمپک ہو، مواد بھرے ہوئے دانے نکلیں اور ان کے اچھے
ہونے پر سرخ اور نیلیوں نشان بن جائیں۔

ہر تکلیف میں سید غفلت اور غنودگی کی کیفیت ہو، بہت
نمیز معلوم ہو۔

بہار میں جس میں پیاس بھی زیادہ ہو اور پسینہ بھی زیادہ ہو
اور مریض پر غفلت طاری ہے۔

زیادتی در شام کے وقت، رات کو لیٹنے سے، گرمی سے، مرطوب
فصل سے موسم سے۔ تمام کھٹی چیزوں اور دودھ سے۔

کبھی :- سیدھا بیٹھنے سے، دیاج اور بلغم کے اخراج سے۔
کھل ہوا میں دامن کروٹ لیٹنے سے۔

معاون :- فاسفورس

مصلح :- ایسا فوٹیڈا، کوکولس انڈیکا، چائنا، کونیم، رشاکس،
ایپیکاک، لارڈ سیلکس، مرکپورسین، اوسیم، پلسٹیل، سپیا۔

طاقت :- ۲ سے ۳ طاقت تک ۔
(نوٹ :- چھوٹی طاقتیں تکالیف کو بڑھاتی ہیں)

ANTIMONIUM CRUD.

اینٹی مونیم کرڈ

خصوصی علامات

- ۱۔ بچوں اور نوجوان افراد میں موٹا ہونے کا میلان ۔
- ۲۔ بچے چڑچڑے، چھپو اٹھانا اپنی طرف دیکھنا جانا برداشت نہ کر سکیں ۔
- ۳۔ ہجید ٹھگینی ۔
- ۴۔ ہضم کی تکالیف زیادہ کھانے سے ۔
- ۵۔ زبان پر موٹی دودھ کی سی سفید میل کی تہ (یہ نشان اس دوا کا نہایت قیمتی ہے ۔
- ۶۔ بلغمی رطوبت مفرد سے تیز سوزش پیدا کرتی ہوتی رہتی ہے ۔
- ۷۔ بائیں بواسیر ہو ۔
- ۸۔ پاؤں کے تلووں میں بڑے بڑے گٹے جو چلتے وقت بہت درد کریں ۔
- ۹۔ سوجن کی گسی برداشت نہ ہو سکے ۔
- ۱۰۔ موسم گرما میں تھکا ہوا اور کمزور ہوس کرے ۔

عام استعمال

معدہ اور آنتوں کے امراض کے لئے مفید ہے (خاص طور پر بچوں میں)۔
 ترسہ کی کھانسی مع کالی کھانسی کے ابتدائے مرحلے میں مستعمل ہے، جبکہ ساتھ زبان
 پر سفید میل بھی ہو۔ بد مزہ اور بسیار خوراک سے ہونے والی تھک کے لئے
 خاص دوا ہے۔ بچوں کے خنثاق، اسہال، آنتوں کے کٹیر اور دودھ
 اٹکنے کے عوارض میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کرم خوردہ و آنتوں کے درد
 میں بھی نافع ہے۔ پرانے آتشک میں جو بڑبیوں تک سرایت کر چکا ہو
 یہ خاص دوا ہے۔ خشکی سے منہ کے کنارے یا نتھنے پھٹے ہوئے ہوں اور
 دکھیں یا ناکھن کٹے پھٹے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھیں تو یہ دوا مفید
 ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض زور رنج ہو، پاگل پن کی طرف مائل نظر آئے، زندگی سے
 نفرت ہو، جی چاہے کہ اپنا سر پھوڑ کر بھیجا نکال ڈالے یا ڈوب مرے۔
 بچہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ کوئی اس کو چھوتے یا اس کی طرف دیکھے اس
 سے بات کرنے پر چنیے (سلیشیا) یا اگر چھپا جائے تو چلائے (سائنا، سٹانی
 سیگ یا اکیو میلا نکس و امیکا)

سر میں الجھن، متوالا پن، چکر اور اس کے ساتھ قتل ہو، نہانے سے
 درد ہر ہو جائے، سر میں اجتماع خون سے نکسیر ہے، معدہ کے بگاڑ سے
 درد ہر۔

آنکھ کے پوٹے سرخ، سوجے ہوئے، آشوبِ حشیم، ان میں بھلائی
کا سادہ ہو۔ کورس میں کیچڑ ہو۔
کان میں بھجننا بہت، کم سنائی ہے، ایسا معلوم ہو کہ کان پر کسی نے
پٹی باندھ دی ہے۔

نقنوں کا کٹا پٹا اور پھچلا ہوا ہونا، سانس لینے میں ناک سرد معلوم
ہو، دردِ سر کے بعد ناک سے خون بہنا، نقنوں میں پیڑی جمی ہوئی ہو۔
منہ کے گوشے چٹھے ہوئے اور دکھن، سرے ہوئے دانتوں میں درد،
دانتوں میں کیڑے لگ جائیں، دانتوں اور مسوڑھوں سے خون نکلے، دانت
کا درد، مٹنڈی سانس لینے سے زیادہ ہو، منہ خشک، زبان پر سفید دھبے
میل جھاموا، ذائقہ کڑوا۔

پیٹ پھولا ہوا اور بھرا ہوا معلوم ہو، خاص کر کھانا کھانے کے بعد
ڈکار میں کھانے کا ذائقہ معلوم ہو، زیادہ کھانے کی وجہ سے بگاڑ۔ غمِ معدہ
میں مروڑ کا درد اور پیٹ میں کاٹنے والا درد، سخت متلی اور صفراوی تہ
ہو، معدہ خالی ہو، ایسی زبردست متلی ہو کہ کسی چیمیر سے نہ سکے، پیٹ
میں ہاج جمع ہوں جن کی وجہ سے گڑ گڑا بہت ہو۔

پانخانہ سخت ہو اور دقت سے خارج ہوا پھر تپلا پانخانہ پانی کا سا
اس کے ساتھ پیٹ میں درد، پانخانہ میں زرد آؤں نکلے، ایسا معلوم ہو کہ
بہت پانخانہ ہو گا مگر صحتِ ریاح خارج ہو اور آخر میں سخت پانخانہ ہو
پیشاب اکثر بکثرت ہو، پیشاب میں جلن، کھانسنے میں بے اختیار
پیشاب خطا ہو جاتے۔

لرزہ کے ساتھ بخار جس میں پاپس نہ ہو، لرزہ کے بعد پسینہ ہو اور

پینے کے بعد سجاد ہوا اور کسی حالت میں پیاس نہ ہو۔

منہ کے کنارے یا انگلیوں کے ناخن کٹے بیٹھے۔

بواسیر جس سے متواتر رطوبت خارج ہوا کرتی ہے۔

زیادتی :- شام کو، کھانے کے بعد، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، آگ

یا دھوپ کی گرمی سے، زیادہ بہرہ یو یا گرمی سے۔

کسی بہ آرام سے، کھل ہوا میں، مرطوب گرمی سے یا گرم پانی کے

ساتھ نہانے سے۔

معاون :- سکویلا۔

مصلح :- کلکیریا، ہیرپرف، مرکبویس۔

طانت :- ۳ طانت سے ۳۰ طانت تک اور اوپر

BAPTISIA

بپٹیشیا

خصوصی علامات

۱۔ تمام رطوبات اور اخراج متعفن ہوں۔

۲۔ مریض صندرتہ متی اشیاء نکل سکے (بریشا کارب)۔

۳۔ خلق کا پین بغیر درد کے، گلے کے غدودوں کا متورم ہونا۔

۴۔ مریض جس وضع سے بھی لیٹے اور جس کرٹ بھی دراز ہو وہ تھکی

ہوئی محسوس ہوا اور مرد کے (پائرو جینیم اور آرنیکا سے مقابلہ کریں)

عام استعمال

اس دوا کا جسمانی کمزوری، مسلسل ہلکے سہاروں، خون کی زہریلی کیفیت، میریا کے زہر اور صدمے زیادہ تقابلیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جسم کے تمام حصص پر دوا کا ناقابلِ برداشت ہو، جس جانب مریض لیٹے وہ درد کرتے ہیں۔ تمام اخلاجات نہایت بدبودار ہوتے ہیں مثلاً سانس، پانخانہ، پیشاب، پسینہ وغیرہ، دائیں جانب زیادہ مآؤف ہوتا ہے۔

انفلوئنزا، سچوں کی مزمن سمیت جیکہ پانخانے اور طوکار بدبودار کرتے ہوں تو یہ دوا استعمال ہے۔ ہلکی طاقت میں یہ دوا تپ محرقہ کے جراثیم کو قتل کرتی ہے اور مریض کے جسم میں ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اگر ٹائیفائیڈ وکسین کا ٹیکہ لگوانے پر ٹیکہ کے بد اثرات ظاہر ہوتے ہوں تو اس دوا کو زہون چاہیے۔ تپ محرقہ کے مریض کے اچھا ہونے پر بھی یہ دوا کچھ دیر دیتے رہنا چاہیے تاکہ جراثیم پوسے طور پر ختم ہو جائیں اور دوسروں تک نہ پھیلنے پائیں۔

عورتوں میں پر سوت کے سہار کے لئے بھی بپ عیشہ ایک لاجواب

دوا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کے خیالات میں الجھن ہوتی ہے، غفلت اور سرسام، خاص کر رات کو کسی چیز پر خیال نہ جم سکے۔

سر سبت بجادی معلوم ہو، مینا مینا درو ہو، تشکن کا درو ہو ایسا

معلوم ہو کہ سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی نے بکیر دیا اور وہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

چہرہ گرم جلتا ہوا اور تھمایا ہوا۔

زبان، ایسا محسوس ہو کہ کھرچ دی گئی ہے، اس کے اوپر پھوڑا، خشک میل ہو، خاص کر بیچ میں، خفاق جس میں کہ زخم سیاہی مائل ہو اور سانس میں بدل ہو۔

پانخانہ نہایت بدبو دار اور کمزور کر نیوالا، اسہال، پانخانہ سیاہ اور تپلا، پیش میں پانخانہ، یا تو بالکل خون یا آؤں ملا ہوا۔ پانخانہ کے قبل تو بیخ کا درد ہو اور درمیان اور بعد میں مروڑ ہو۔

پھیپھڑوں میں بغم کا انجماد اور تنگی نفس (ضیق النفس)، بستر پر اٹھ کر بیٹھنے سے آرام نہ ہو، بلکہ تازہ ہوا کی غرض سے کھڑکی کے قریب جانا پڑے۔ آلات تنفس میں اس حد تک کمزوری کہ جی بھر کے سانس نہ لے سکے، سینہ میں رکاوٹ، دھننے پھیپھڑے میں درد اور ایسا معلوم ہو کہ سینہ بھر میں دل ہی دل ہے۔

جوڑوں میں جکڑن، ایسا معلوم ہو کہ موچ آگتی ہے، ایسا معلوم ہو کہ ہاتھ لمبے ہو گئے ہیں، پنڈلیوں میں کھنچاؤ کا درد، عضو کمزور ہو جائیں اور کانپیں۔

جسم کو دن بھر سردی محسوس ہوتی ہے، سارے جسم میں دھکن ہو، بنجارہ کی حالت میں تمام جسم گرم اور خشک، اس کے بعد پسینہ، بدبو دار مگر زیادہ نہ ہو، ٹائیفائیڈ بنجارہ، اس کے ساتھ سرسامی غفلت ہو کہ سر کے ٹکڑے اور اعضاء بکرتے محسوس ہوں جن کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔

زیادتی :- حرکت سے، مرطوب گرمی سے، مکرہ کے اندر، شور و غل سے
دائیں جانب جھکنے سے۔

کسی :- آرام سے، کھلی ہوا میں۔

معاون :- فائٹولیکا، سیگونیبریا، نیز اور رن خون میں اس کے بعد کروٹن،

ہیامیلس، نائٹرک ایسڈ، پائروجن اور ٹیری بنتھنا مفید ہوتے ہیں۔

مخالف :- ایس، آرنیکا، برائی او نیا، جیلیسی میم، ہائیوس پیامس، کال

کارب، لیکے کس، مرکبوریس، میورامک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ،

نکس دامیکا، اوپیم اور رساکس۔

طاقت :- مد ٹنچر سے ۱۲ طاقت تک۔

اس دواکے چھوٹی طاقتیں ہی مفید و موثر ہوتی ہیں۔ خصوصاً ٹائیفاؤڈ

میں ۳ طاقت سے اونچی طاقت استعمال کرنا حاصل ہے۔

BRYONIA

برائیونیا

خصوصی علامات

- ۱۔ گھٹیاوی یا بائی کے مزاج والے افراد جن کو صفر کے دوسرے ہوتے رہتے ہو
- ۲۔ درد، جن میں زیادتی حرکت سے، اندر سانس لینے سے، کھانسنے
- سے اور کسی بالکل چپ چاپ پڑے رہنے سے اور دھواں والی جانب
- لیٹنے سے ہوا ٹیلا، پسٹیللا

۲۔ بے حد خشکی تمام جسم کی بلغمی جھلیوں میں۔

۳۔ کھانسی خشک، سخت اور طویل۔

۵۔ پیاس شدید۔

۶۔ حیف کے دنوں میں شرمگاہ کی بجائے نحسیر کی صورت میں ناک سے خون

آئے (ناسفورس)

۷۔ غصہ سے پیدا شدہ تکالیف۔

۸۔ غصہ کے بعد جاڑا محسوس ہو۔

۹۔ شکایت و تکالیف موسم گرما میں سردی لگ جانے سے یا گرم ہوجانے سے

۱۰۔ تکلیف کا بڑھ جانا کسی حرکت سے اور سکون بالکل آرام سے چاہے

وہ دائمی ہو یا جسمانی۔

۱۱۔ بے حد پیاس، زیادہ مقدار میں پانی پیتے لیکن لمبے وقفہ کے بعد۔

۱۲۔ درد سر کٹڑوں کو استری کرنے سے یا ایسا ہی کوئی تمیش والا کام کرنے

سے (سیپا)

۱۳۔ قبض آنتوں میں سستی اور کاہلی یا پاخانہ کی بالکل رغبت نہ ہو، پاخانہ

بڑا، سخت، سیاہ، خشک، جیسے جلا ہوا۔

۱۴۔ دست، موسم کی شدید گرمی سے۔

۱۵۔ پستان بھاری ہوں، پستانوں کو سہارا دینا پڑے (فائٹولیکا)

۱۶۔ کھانسی، ابکائی اور تھکے کے ساتھ (کالی کارب)

۱۷۔ کھانسی، گرم کمرہ میں داخل ہونے پر۔

عام استعمال

امراض شش میں ایکونائٹ کے بعد اس کا درجہ ہے، کھانسی، ہوا کی نالیوں کی کھانسی، پلورمونیا، تپ محرقہ، پستانوں کے ورم، تپ مفصلی، خناق کاذب، ورم پردہ لمبے دماغ، قبض، خون کی حیض کی بجائے نحسیر پھوٹنا، جیش نمونیا، ذات الحبیب صادق، خسرہ، وجع المفاصل، انفلوئنزا، ورم، سرخہ بنجار، نفوز باخترہ، نمرلی بنجاروں، سوزش باریطون اور آنتوں کی سوزش وغیرہ میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بہت زیادہ غصیل ہوتا ہے، ہر بات پر غصہ آئے، سرسام کے باعث رات کو اپنے کام کاج کے بارے میں بڑ بڑاتے، بستر پر سے اٹھ اٹھ کر بھاگنا چاہے، کسی چیز کی خواہش کرنا مگر جیب دی جاتے تب نہ لینا، کوئی بھی تکلیف ہو، اس میں صبح کو بیدار ہونے کے کچھ دیر بعد اوجھڑا دھر چلنے پھرنے پر زیادتی ہو جاتی ہے (نکس و امیکا، نیٹرم میور، پاڈونائلم، تھوہا) سر چکراتے، متلی، غش اٹھنے پر، سر میں بھاری پن، بیٹھنے سے اٹھنے پر چکر، مجبوراً چپ بیٹھ جاتے، درد کی وجہ سے سر میٹا پڑے، درد حرکت سے بھگنے سے، آنکھیں کھولنے سے زیادہ ہوا دبانے سے کم ہو، درد سر صبح کو چلنے سے چاڑتا ہوا اور کن پٹی سے لے کر گال کی ہڈی اور نیچے کے جڑتے تک، درد سر پیشانی سے لے کر گدی تک۔

آنکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے (ایسونا) دانتی آنکھ میں عموماً تکلیف

مہولی قاعدے کے خلاف برائیاں میں گرمی سے آنکھ کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔
 نکیر پہنا، بعض دفعہ حیض کی بجائے ناک سے خون جاری ہو۔
 چہرہ زرد یا سرخ، گرم اور سوجا ہوا۔

ہونٹ خشک، سوکھے ہوتے، چٹخے ہوتے، منہ، حلق اور زبان میں
 خشکی، منہ میں آبلے پڑنا، زبان پر سفید یا زرد میل، زبان کھڑکی چٹختی ہوتی،
 جھوری، سیاہی مائل، دانت کا درد، منہ میں گرم چیز لینے سے زیادہ ہو،
 (مرکوبہ) پسا ٹیلا، کلکیر یا ٹھنڈے پانی سے آرام (پسا ٹیلا) معلوم ہو
 کہ دانت لمبے ہو گئے ہیں۔

جھوک زیادہ، کئی مرتبہ کھانا کھاتے، ذائقہ معلوم ہو، تمام کھانا پینا
 کڑوا معلوم ہو، ذائقہ خراب، پانی زیادہ مقدار میں اور زیادہ دیر میں پیا جائے
 کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد بعد اس کے فم معدہ میں (کوٹری کے پاس)
 اور پھرتے ہو جاتے۔ حرکت کرنے سے درد زیادہ ہو، پت اور پانی کی
 تہ ہو، حوالی جگر میں درد، جلن، دم اور کھن۔ جگر میں کونچن جو کہ دبانے،
 کھانسنے، سانس لینے سے زیادہ ہو۔

قبض ہے، پاخانہ خشک اور بہت سخت، موسم گرم یا میں اسہال
 آئیں۔

پیشاب سرخ، بھورا اور کم مقدار میں، سفید مادہ نیچے بیٹھ جاتے۔ پیشاب
 کرتے وقت پیشاب کی نالی میں سوجن۔

عورتوں میں حیض جلد اور مقدار میں زیادہ، یا پھر حیض کا رک جانا،
 جس کے ساتھ شدید درد ہر ہو۔ عورت کے پستان پتھر کی مانند
 سخت ہوں۔

بلغم کے باعث سینہ میں گرد گڑا ہٹ، کھل ہوا میں کھانے پینے کے بعد کھانسی زیادہ ہوتے ہو جاتے (ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوا سسپا ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوا) کا سٹیکم، کیوریم، رات کو بستر پر کھانسی کی وجہ سے مجبوراً سیدھا کھڑا ہونا پڑے، سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑے، سینہ کو پکڑنا پڑے (نیٹروم سلف) کھانسی مع سینہ کی چھین کے، لبیدار، سرخی مائل بلغم نکلے، سینہ کی کوچن کی وجہ سے جلد جلد گھبراہٹ کے ساتھ مشکل سے سانس ل جاتے۔ ذرا سی بھی حرکت سے زیادہ ہو، کھانتے وقت انسان اپنے سینہ کی سیج کی ہڈی کو پکڑے، سینہ میں کوچن کی وجہ سے درد کے خوف سے سینہ کو پھیلا نہ سکے۔

کمر میں جکڑن درد سر کے ساتھ، شانوں کی دونوں ہڈیوں کے بیچوں بیچ حبس۔

ہاتھ اور پیروں پر چھپدار سرخی، وجع المفاصل والی سوچن، بازو کے اوپر کے حصہ میں کوچن، پیر میں سوچن، گھٹنے میں درد اور جکڑن۔
 نہار، لرزہ کے ساتھ، پیاس زیادہ مقدار میں ٹھنڈے پانی کے لئے خواہش اور اس سے آرام ملے، کھانسی خشک مع سینہ کی کوچن کے، لرزہ بعض اوقات صرف بائیں جانب، بعض دفعہ ہونٹ، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے سرے پر سردی لگے، تپ مع پیاس اور کوچن کے۔
 اعضاء میں درد حرکت سے زیادہ ہو، اندرونی گرمی گھبراہٹیں جل رہی ہوں اور ان میں خون مثل پگھلائے ہوئے سیسہ کے دوڑ رہا ہے۔ گرمی سے زیادہ کھلی ہوا سے آرام، بالکل خاموشی بلا حرکت کے پڑے رہنے کو

جی چاہے۔

چہرہ درد، جلد زرد، یرقان، جوڑوں کا زہر باد۔

زیادتی :- حرکت سے، مشقت سے، چھوٹنے سے، گرمی سے، گرم

کھانا کھانے سے، رات کو، اخراج کو بند ہو جانے سے۔

کمی :- لیٹنے سے، خاص کر درد والے پہلو کی طرف دبانے سے، آرام

سے، ٹھنڈک سے، ٹھنڈی چیزوں سے، دبانے سے، پسینہ سے۔

معاون :- الیومنا، رسٹا کس، کالی کارب اور نیٹیم میوہ۔

مخالف :- کلکیریا

مصلح :- اکیونائٹ، الیومنا، کیفرا، ایفیم ٹارٹ، جیلیڈ و نیچم، کمیوہ

کلیمیس، کانیا، اگنیشیا، نکس و امیکا، میورامک ایسڈ، پلسٹیل

رسٹا کس۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک

BERBERIS VULGARIS

بربریس ولگرس

خصوصی علامات

۱۔ گردوں کے مقام میں جلندار اور بھوٹے کا سادرد

۲۔ پتہ میں پتھری کے باعث درد

۳۔ بائیں گرنے سے سوئیاں چھیننے کے سے درد گرنے کی نالی میں سے

ہوتے ہوتے مشانہ اور شانہ کی نالی تک جائیں (ٹوبیکم) دابنہ گرد
میں (لائیکوپوڈیم)

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر گردوں اور مشانہ کے عوارض میں مستعمل و مفید ہے۔
علاوہ بریں پتہ، جگر اور بلغمی جھٹی پر بھی اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔

عمومی علامات

حوالہ گروہ میں چیم اور چٹن، بزور دبانے سے درد زیادہ ہو، کیونکہ گرد
کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ یہ چاٹنے والا درد پیٹ میں ہو کر پیشاب کی
نالی میں ہوتا ہوا پیڑوں کے اندر مشانہ تک آتا ہے۔ ایک خاص قسم کی جکڑ
چیم، جھنجھنی کمر میں معلوم ہوتی ہے۔ پیشاب زرد اور گدلا اور بعض
اوقات سفید تلچھٹ نیچے بیٹھ جاتے جو کہ بعد میں سرخ ہو جاتے، مقعد اور
مبرز میں جلن، دکھن، پاخانہ کی بار بار حاجت معلوم ہو۔ یہ حالت اکثر
بواسیر میں ہوا کرتی ہے۔

بواسیر میں سلیشیا، سلفر، اگنیشیا، کلکیر یا اور کلکیر یا فاس کا مقابلہ
کرنا چاہیے۔

ایک خاص علامت بریں کی یہ ہے کہ جلد کے اوپر بلبلے اٹھتے معلوم
ہوتے ہیں۔ جگر سے بیکر گروہ تک پسلی کے نیچے نیچے درد ہوتا ہے
جس سے کہ پتھری کا احتمال ہوتا ہے۔

زیادتی :- حرکت سے، کھڑے ہونے سے

معادن :- گلابے گلابے لائیکو پوٹیم کی ایک خوراک اس کے اثر کو تیز کر دیتی ہے ۔

مصلح :- بیلاڈونا، کمیوٹلا، کیمفر ۔

طاقت :- مدد ٹنکچر سے ۳۰ طاقت تک ۔

BARYTA CARB

برٹیا کارب

خصوصی علامات

- ۱۔ حافظہ کمزور ۔
- ۲۔ بچے جسمانی اور دماغی ہر طور سے کمزور ہوں ۔
- ۳۔ دیرینہ خنازیری مزاج خصوصاً جبکہ مریض فریہ ہو ۔
- ۴۔ بوڑھے افراد کی تکالیف ۔
- ۵۔ غددوں خصوصاً گردن اور گلہ لویں کے ورم اور سختی یا کھینے کا آغانہ
- ۶۔ ایڑیوں میں متعفن پسینہ، پاؤں کے پسینہ کے رک جانے سے بعد ۔

عام استعمال

یہ دوا بچوں اور بوڑھوں کے لئے مخصوص ہے ۔ ایسے بچے جو اپنی اصل عمر سے بہت بڑے معلوم ہوں اور ایسا معلوم ہو کہ ان کی نشرو نما مکمل رہ گئی ہے یا پھر ایسے بوڑھے افراد جو کچھ زیادہ ہی

عمر رسیدہ معلوم ہوں اور تقابہت، غفلت اور بے خبری کے عالم میں پڑے رہتے ہوں ان کے لئے یہ دوا سودمند ہوتی ہے۔

عمومی علامات

بچوں کے جسم لاغر، چہرہ پر جھریاں، بونے دکھائی دیں، حافظہ کمزور ہو، توجہ نہ دے سکیں اور احمق معلوم ہوں، جلد کھینا یا چلنا نہ سیکھیں تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

غددوں کے عوارض جبکہ غدد بڑھے ہوئے اور متورم ہوں، گردن اور کنج ران کے غدد میں پیپ ٹیٹے کا اندیشہ ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے اور کمزورین کے باعث اگر کان میں بھی ورم ہو گیا ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ بوڑھے افراد انتہائی پتہ مردہ انتہائی پسند ہوں، حافظہ کمزور ہو، غافل پڑے ہیں، دماغ سے خون گرنے کے بعد فالج ہو جائے، نبض کمزور ہو، قوت گویائی ناکل ہو گئی ہو، خصیتیں سخت ہو گئے ہوں اور قوت مردی پیش از وقت جاتی ہے تو یہ دوا نافع ہوتا ہے

نیا دتی :- سوچنے سے، نہانے سے، درد والی کرورٹ لیٹنے سے
کبھی : کھل ہوا میں چلنے سے
معاون : ڈاکا مارا، سلفر

مخالف : کلکیریا

مصلح :- اینٹی مونیم ٹارٹ، بیلادونا، کیمفر، ڈاکا مارا، مرکبوسین، زنگ
طاقت : ۳ طاقت سے ۳ طاقت تک اور اوپر

خصوصی علامات

۱۔ دم کشی

عام استعمال

خاص طور پر دمہ کے لئے مستعمل و مفید ہے۔ علاوہ یہی دق اور سل کی کھانسی اور سانس کی تنگی کے لئے بھی تافع ہے۔

عمومی علامات

دمہ کا عارضہ ہو، یا عام کھانسی سے دم گھٹتا ہو۔ دق یا سل کی کھانسی سے دم کشی کی کیفیت ہو یا سانس کی نالیوں کی اندرنی مہلیوں کی سوزش سے ہونے والی کھانسی ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ خاص طور پر دمہ کے لئے یہ دوا اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ موٹے اور تندرست تنومند افراد پہ اس دوا کا اثر نہایت واضح ہوتا ہے۔

طاقت :- اس دوا کی چھوٹی طاقتیں مثلاً $2 \times$ مد ٹیکچر یا $3 \times$ وغیرہ حملہ کے دوران اور اونچی طاقتیں مثلاً $3 \times$ طاقت اس کے بعد مناسب وقتوں سے دینا شاق ہے۔

BORAX

بوریکس

خصوصی علامات

- ۱۔ قریب قریب تمام تر کایف میں نیچے کی جانب حرکت سے خوف ہوتا ہے۔
- ۲۔ پریشانی زبید اترتے وقت یا پہاڑی سے نیچے اترتے وقت۔
- ۳۔ بے صدا اعصابی
- ۴۔ نوجوان مستورات میں ناک سوراخ ہے۔
- ۵۔ منہ آنے کا عارضہ

عام استعمال

آنکھوں کی سوزش، منہ سے زیادہ لعاب کا اخراج، متلی، تھکے، قویلیج، اسہال، غشی، پیشاب میں البیومین کا اخراج، میٹانہ کے اندر انہیٹن اور مرگی ایسے امراض ہیں جن میں یہ دوا مفید پائی گئی ہے۔ خاص طور پر منہ کی اندرونی جھٹکی کی سوزش میں نافع ہے۔

عمومی علامات

منہ میں سفید آلیے ہوں، منہ میں بہت گرمی اور خشکی ہوتی ہے، دودھ پیتے وقت کچھ روتا ہے اور پستان کو چھوٹ دیتا ہے، اسہال زبردی

مال اور آل نیز آؤں ملے آتے ہوں۔

مستورات میں بانجھ پن ہو، فم لحم و اندام نہانی میں آبلے ہوں اور جگر
چھنی ہوتی ہو، سیلان الرحم جس میں انڈے کی سفیدی کی مانند طوبست
کا اخراج ہو، حیض وقت اور تکلیف سے آتا ہو۔

زیادتی :- نیچے کی جانب حرکت کرنے سے، شولہ سے، تمباکو نوشی
سے، موسم گرما میں، حیض کے بعد

کسی :- دبانے سے، شام کو، ٹھنڈے موسم میں

مصلح :- کمیو ملا، کافیا

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک

BELLADONNA

بیلادونا

خصوصی علامات

- ۱۔ احساسات اور حرکات میں تیزی ہو۔
- ۲۔ درد عموماً چھوٹے چھوٹے دوروں کی صورت میں، جو چہرہ اور آنکھوں میں
سرخی پیدا کریں۔
- ۳۔ خون کا زیادہ دہان سر اور چہرہ کی طرف
- ۴۔ درد سردی، چہرہ پر سرخی، دماغ اور گردن کی شریانوں میں تپکن
کے ساتھ (مل ٹوٹیں)

عام استعمال

منفرد امراض میں کام آنے والی دوا ہے۔ دماغ اور اس کے پردوں کی سوزش، دماغی شران کی سوزش خواہ کسی سبب سے ہو، نظامِ عصبی کے متور، تشنجی درد، نڈیانی درد، دیوانگی اور پاگل پن، مرگی اور بیوتی بنجار، تشنج، سر کے عصبی درد، اجتماعِ خون، آنکھوں کی سوزش، خراش نشانہ، شب کو پیشاب نکل جانا اور سوزش، سرخباد و موی، بنجارہ پلگ جن میں آکسیجن بکثرت خارج ہوتی ہو، ایجنٹا اثر نہ کرتا ہو اور آرسنک کی ضرورت نہ ہو تو بیلٹونا کام آتا ہے، گرنے کی وجہ سے نظامِ عصبی کو چوٹ آجائے، دماغی بنجاروں، چیچک، تپِ محرقہ اور بیوت کا بنجارہ خراشِ حلق، دمِ بوزمین، رحم سے جریانِ خون، وجعِ المفاصل کھانسی، پھوڑوں کو پیپ پڑنے سے پہلے اچھا کرنے کے لئے، خفہ کی سوزش، اختناقِ الرحم، غذا کی نالی کی سوزش، شدید دردِ گردہ سوزشِ پستان، رحم کا پستان، قولنج اور بچوں کے اسہال، سکتہ دماغی وغیرہ میں متعل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض تندرستی کی حالت میں خوش مزاج اور زندہ دل ہوتے ہیں اور بیماری کے دوران نہایت غصیلے اور اکثر نڈیانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔

کھٹے، تھوکنے، مارنے اور چیزوں کو توڑ پھوڑ دینے کی رغبت
 ہنسی کے دورے اور دانت پیسے، تھار واروں کو کاٹنا اور مارتا
 چاہے (سٹرا مونیم) جھاک جلنے کی کوشش کرے (مہلی بوبس)
 توہمات، خیال کرے کہ وہ جن، بھوت، خوف ناک شکلیں اور
 مختلف کیڑے (سٹرا مونیم) سیاہ جانور، کتے اور بھیڑیے وغیرہ دیکھتا
 سر میں بھاری پن کے ساتھ پیشانی میں درد جو تھوڑی دیر تک کم ہوا
 اور زیادہ شدت سے آئے، درد کے ساتھ ۳ بجے سہ پہر کو آنے
 والے اعصابی درد سر۔

آنکھوں کا آشوب، آنکھیں نہایت سرخ، سخت درد کے ساتھ۔
 آنکھوں میں جلن، خشکی اور بعد میں خود بخود آنسو بہنا، صبح کو
 چوڑے کیڑے سے بند ہو جاتی ہیں۔

کانوں کے اندر اور باہر روم، کوچن اور ہیرا پن، مواد آنا
 صبح و شام نکسیر بہنا، ناک کا سرخ ہو جانا۔
 چہرہ تنمیا ہوا، سرخ یا بالکل زرد، اوپہ کا ہونٹ سوجا ہوا۔ نہو
 پیدوانہ لگنا، اس پر پیٹری جم جائے، سخت درد ہو۔

دانت میں درد، جو کان سے دانت تک ہوتا ہو۔ منہ خشک
 بغیر پیاس کے، مگر زبان تر، زبان گرم، کنا سے سرخ اور درمیان میں
 سفید، حلق میں جلن، غدد میں درد اور خشکی
 کھانا بذائقہ محسوس ہو، انٹرٹولیوں میں دھکن، پیٹ میں درد
 کا درد، ناف کے گرد درد، گویا گولہ بن رہا ہے، سیدھی بڑی آنت
 کا پھول جانا۔

پاخانہ پستل سبز آؤں اور درد کے ساتھ، بعض اوقات آؤں اور خون والی پیچش، بعض اوقات درد یا سفید کھڑیا کے مانند مع زیادہ پیشاب اور پسینہ۔

پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتا، مثلاً میں انیٹن، پیشاب کم بالکل بند، قطرہ قطرہ ہوتا، خود بخود سوتے میں ہو جانا، زرد صفات سرخ تمچھٹ نیچے پیٹھ جائے۔

ورم فوط، نوٹے سخت اور اوپر کو جڑھے ہوتے، ورم خصیۃ الرحم سخت بوجھ، اعضائے تناسل کی طرف گویا نکل پڑے گا، احتلام ہو جانا، شہوت نداشت، حیض جلد اور کثرت سے، اندام نہانی کی سرخی اور خشکی، سفید رنگ کی رطوبت مستورات کی اندام نہانی سے خارج ہو۔

نہرہ اور ہوا کی نالی میں ورم، کھانسی کال، سانس دقت سے آئے۔

شند کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جکڑتی بنجارہ لوزہ کے ساتھ، پیاس نہ ہو، لیٹنے سے چہرہ درد اور اٹھنے پر سرخ۔ پاؤں برف کی مانند سرد، گرم نہ ہو سکیں۔ یا پھر بنجارہ سخت پیاس کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کی خواہش، پسینہ صرف سر پر۔

جلد چمک دار سرخ، نہر باد، جلد اتنی گرم کہ ہاتھ کو چلتی ہوئی معلوم ہو۔

زیادتی :- سر پہر کو، تین چار بجے اچھونے سے حرکت سے

شور و غل سے، ہوا کے تیز جھونکے سے، چکدار چیز کی طرف
دیکھنے سے، آدھی رات کو، پانی پینے سے، کپڑا اتارنے سے، گرمی
میں، لیٹنے سے، بستر کے لمس سے۔
کسی :- آرام سے، سیدھے بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے، گرم
کمرہ میں۔

معاون :- کلکیر یا اورٹیو بیکو لینیم اکثر شفا کی تکمیل کی راہ میں مد
دیتے ہیں۔

مصلح :- کانیا، ہیپر سلف، ہائیو سیامس، اوپیم، پلساٹیل
مخالف :- ڈرکامارا

طاقت :- درمیں کچر سے ۳۰ تک نیز ۲۰۰ طاقت تک
متحمل ہے۔

PODOPHYLLUM

پادوفالیم

نصوصی علامات

- ۱۔ ہیضہ، درد شکم اور معدہ کی تکلیف کے بغیر
- ۲۔ بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں سرگرم ہو اور بچہ سر کو ادھر ادھر
گھماتا ہے۔ (بیلڈرڈنا)
- ۳۔ درست جو صبح سویرے ہوں۔

۴۔ بچوں کو دست آئیں جیب ان کو نہٹلایا جا رہا ہو۔

۵۔ بچوں کو دست گندے پانی کے سے جو پوتڑے کے آدے یا دھو جائیں
(بزرگ ایٹ)

۶۔ پاخانہ، پانی کا سا اور متعفن۔

۷۔ رحم کا اپنی جگہ سے گرنا، بوجھ اٹھانے یا نہ دے سکانے سے۔

۸۔ مریض مسلسل جگہ کے مقام کو ہلاتا اور ہاتھ سے ملتا ہے۔

۹۔ بخار کا دورہ، بچے صبح جاڑے اور گرمی کے دوران بھید
باتونی پن کے ساتھ۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر جگر، امعاء، بارہ انگشتی آنت، صفراوی نرا جوں،
حاملہ عورتوں، دانت نکلنے والے بچوں، رحم کے عوارض اور مہیضہ پر ہوتا
ہے علاوہ بریں بوا سیر ہو، بڑھان ہو، ویدیں پھولی ہوئی ہوں تو بھی یہ دوا
بھید نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بہت مضطرب ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ موت
آنے والی ہے۔

سر جھکاتا ہے، صبح کے وقت در در سر ہوتا ہے، چہرہ ممتایا رہتا
ہے، دانت نکلنے کے زمانہ میں بچہ اپنا سر ادھر ادھر مارتا ہے، مریکیہ
میں گھساٹے (ایس، بیلا ڈونا) سر جھکافے کرتیکیہ سے اٹھالے

(سٹر موٹیم)

منہ سے رال بہے، سانس بدبودار، زبان پر سفید میل، ذائقہ گندہ،
 حلق میں درد، دانہ جانب سے شروع ہو (یہ یکے کے عکس ہے)
 اور لائیکو پوٹیم کے مشابہ ہے۔ رات کو دانت کٹکٹے، گلے میں
 بگم کھڑکھڑائے۔

ڈکار کے ساتھ غذا منہ کو آئے، جھوک زیادہ مگر تھوڑا کھانا
 کھانے سے طبیعت بھر جائے اور اس کے بعد متلی، تے اور پیاس ہو
 معدہ یا پیٹ میں جلن اور تپکن، کھٹی ڈکاریں آنا اور اس کے بعد
 تے۔ پیڑ اور سیدھی آنت میں درد جو ۳ بجے صبح کے وقت ہو اس
 کے بعد دست آئے۔ ڈکاریں گرم اور خشک، جگر کے اطراف میں
 بوجھ اور درد۔

دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں میں اسہال، جگر کی خرابی کے ساتھ
 اسہال، مزمن اسہال جو صبح کو زیادہ ہوں۔ سبز پانی کا سادھاار کی
 طرح نکلنے والا اسہال، بعض دفعہ کھڑیا مٹی کی طرح نہایت بدبودار
 دست پیاس کے ساتھ، تے کم ابکائیاں زیادہ۔

بنجارہ لہزہ کے ساتھ پیاس کے بغیر، بہت باتیں کرے، مگر الفاظ
 جھول جائے یا پھر بنجارہ پیاس کے ساتھ، شدید درد سر، پسینہ کی کثرت،
 پسینہ میں نیند آئے، بنجارہ کی شدت میں مریض بے ہوشی کی نیند سو جائے۔
 زیادتی پر علی الصبح، گرمی کے موسم میں، دانت نکلنے کے زمانہ میں
 کبھی :- شام کے وقت، بیرونی گرمی سے، دباؤ سے۔
 معاون :- سلفر، ایکساک، ہکس و امیکا اور کلکیریا۔

مصلح :- کالوسنتھ، لیکک ایڈ، لیٹنڈا، نکس و امیکا۔
 طاقت :- مد ٹینچر سے ۶ طاقت تک بچوں کے دستوں میں ۲۰۰
 اور ۱۰۰۰ بہترین ثابت ہوتی ہے۔

PETROLEUM

پٹرولیم

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض دوران نیند خیال کرے کہ کوئی دوسرا آدمی اسی کے بستر
 میں اس کے ساتھ لیٹا ہے (ویلیریانہ)۔
- ۲۔ چمکہ خاص کر گدی میں۔
- ۳۔ چمکہ سحری سفر میں ہونے والے چمکہ جیسا۔
- ۴۔ درد سر گدی میں سبب جیسے بھاری پن کے ساتھ۔
- ۵۔ درد شکم، جب معدہ خالی ہو، سکون ہو مسلسل کھانے سے
 (اناکارڈیم، پیلیڈونیم، سپیا)
- ۶۔ دست، ہمیشہ دن کے وقت۔
- ۷۔ ہاتھوں کی انگلیوں کی نوکیں کھردری، ہر موسم سرما میں۔

عام استعمال

یہ دوا ایگنیر یا اور پمپسیوں میں کام آتی ہے، خاص کر کانوں، ایشیت

سر اور ہاتھوں پر یہ پھنسیاں نیادہ ہوا کرتی ہیں۔ مقام ماؤف پھل کر
کچا اور آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے گاڑھا لیس دار
مواد نکلتا ہے۔ شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ علاوہ بریں بالوں
کی جڑیں سوچ جاتیں اور متورم ہو کر سخت ہو جاتیں، سمندری سفر کی باری
ایام حمل کی مستی اور تھے، بغل اور پاؤں کے بدبودار پسینہ میں بھی مستعمل
اور نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چلنے میں راستہ بھول
جاتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے کہ بستر میں کوئی دوسرا بھی اس کے
ساتھ لیٹا ہے۔ یا یہ کہ موت قریب ہے، فوراً فریسی بات پر غصہ آتا ہے۔
سر میں ٹھنڈی ہوا بری معلوم ہوتی ہے، گدی ایسی بھاری ہو جیسے
سیہ، اٹھنے پر ایسا چپکے آئے جیسا کہ جہانزہ پر چڑھنے سے ہوتا ہے،
چاند پر تہ دانے جو کہ کان پر اور اس کے چھپے زیادہ ہوں۔
آنکھوں کی پلکیں گرہ پڑی ہوں، نگاہ دھندلی، ہتھکوں میں زخم، نتھنے چٹخنے
ہوتے اور حلبیں، ناک کی نوک پر کھجلی، ناک سے مواد نکلے۔
پاخانہ جانے کے فوراً بعد صوبک لگے، معدہ خالی ہونے پر پیٹ میں
درد ہو، اور کھانے سے آرام ہو، اسہال جو کہ صحتِ بدن میں زیادہ ہوں۔
بند گو بھی کھانے سے اسہال ہوں۔

ہمیشہ جاڑے کے موسم میں انگلیوں کے سرے کھڑے اور چٹخنے
ہوتے ہوں، جلد خشک اور بہت کھردری، موٹی سبز پٹری جس میں

جلن، کھجلی اور سرخی ہو۔

اس دور کے جلد کے علامات گریفا ٹیسس سے ملتے جلتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ پٹرولیم کی بیماریاں عموماً جاڑے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات کسی دوسری دوا میں نہیں ہوتی۔ جاڑے کے موسم میں لہفہ کی کھال ادھڑنے کے لئے یا لبوائی کے لئے پٹرولیم نہایت مفید ہے۔ زیادتی :- نمی سے قبل، طوفان کے درمیان، گاڑی پر چڑھنے سے جاڑے کے موسم میں۔

کسمی :- گرم ہوا سے۔

معاون :- سیپیا۔

مصلح :- نکس و امیکا۔

طاقت :- عموماً ۳۰ طاقت متعل ہے۔ البتہ پرانی ترکیب میں ۲۰۰ طاقت بھی استعمال ہوتی ہے۔

PLATINA

پلاٹینا

خصوصی علامات

- ۱- اعضائے تناسل حد سے زیادہ ذکی الحس، اعضاء پر کپڑے کا چھونا بھی برداشت نہ ہو۔
- ۲- جنسی نشوونما حد سے زیادہ۔

۳۔ حیض سیاہ لونٹھنے دار ہو۔

۴۔ قبض جس میں پاخانہ چکنی مٹی کی طرح مبرزا اور مقعد سے چپک جائے
(البیونا)

عام استعمال

رحمی فساد سے پیدا ہونے والے ذہنی اختلال نیز مروانہ اور زمانہ
جنسی اعضاء کی بڑھی ہوئی حس سے پیدا شدہ عوارض میں یہ دوا عام طور پر
استعمال ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بے حد مغرور ہوتا ہے۔ ہر چیز اور ہر شخص کو
اپنے مقابلہ میں ناچیز اور حقیر سمجھے، چیزیں معمولی قدر سے چھوٹی نظر آتی
(غزوہ کی علامت لائیکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے) چیزیں زیادہ ذہنی
معلوم ہوں، بھوت پرست وغیرہ کا وہم، مکان کے اندر جانے پر عورت
کو چیزیں عجیب طرح کی معلوم ہوں، مریضہ کبھی بہت ننگین اور بعض
وقت سننے اور چمکنے۔

حیض جلد، بکثرت خون ٹوٹے کا سا، لونٹھے اور اس کے ساتھ درد
اور رحم پر بوجھ معلوم ہو۔ کروکس میں بھی سیاہ خون کے لونٹھے استعاط
حل کی وجہ سے یا بلا استعاط حل کے نکلتے ہی۔ لیکن اس میں ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ پیٹ میں کچھ چلتا ہے یا سچ پھڑکتا ہے، کیونکہ میں سیاہ لونٹھے
بکثرت نکلتے ہیں لیکن اس کے داخلی علامات مختلف ہوتے ہیں۔

مردوں میں سن بلوغت سے قبل جلق لگانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً لٹھکوں کی آنکھوں میں بزدلی کی جھلک ہو، آنکھیں دھنسی ہوتی اور زرد ہوں، عضو کھینچے ہوئے اور سستے ہوئے ہوں۔ پلاٹینا میں سخت قبض، ایسا ہوتا ہے کہ یا تو پاخانہ ہوتا ہی نہیں یا پھر پچنی مٹی کی طرح مبرز سے چمٹنے والا پاخانہ ہوتا ہے۔ یہ دوا درم رحم میں بھی کار آمد ہے۔

زیادتی :- بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، شام کے وقت۔ کمی :- چلنے سے۔

معاون :- سیلیٹیم۔

مصلح :- بیلا ڈونا، پلسا ٹیلا، کالمیکیم

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک استعمال ہوتی ہے۔

PULSATILLA

پلسا ٹیلا

خصوصی علامات

- ۱۔ مریضہ میں رو دینے کا بہت زیادہ میلان۔
- ۲۔ مستورات میں فریبی کا میلان، مقدار میں کم اور زیادہ دن تک رہنے والے حیض کے ساتھ (گمریفائٹس)۔
- ۳۔ تمام بطنی جھتلیوں سے رطوبتیں گارھی، ملائم اور زردی مائل سبز۔

(کالی سلف، نیئر سلف)

- ۴۔ علامات ہمیشہ تبدیل ہوتی رہیں، ایک ہی جیسے حالات میں۔
- ۵۔ درد جو جلد جلد مقام تبدیل کریں یعنی ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں پہنچ جائیں (کالی بائیکرام، لیک کیننم، منیکنم ایسیٹ)
- ۶۔ قریب قریب ہر تکلیف میں پائس نہاد۔
- ۷۔ دست صرف یا عموماً رات کے وقت، جن کی کیفیت میں رد و بدل ہوتا ہے۔

- ۸۔ حیض بہت دیر میں، کبھی رک جائے، کبھی بہنے لگے۔
- ۹۔ خون حیض دن کے وقت زیادہ ہے۔
- ۱۰۔ گوار، نجبیاں، مرغن گوشت یا غذاؤں کے استعمال سے ہوں۔

عام استعمال

عورتوں کے عوارض خاص کر حیض کی بے تا حد گیولی میں یہ دوا بہت زیادہ مستعمل ہے، بچوں کے مرض خسرہ کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ علاوہ بریں دیگر متعدد امراض میں حسب علامات مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض روچنے کی طرف مائل رہتا ہے، مایوس اور چٹہ چڑا پن میں مریض میں پایا جاتا ہے۔

بہر میں چکر خاص کر ٹھکنے سے، آنکھ اور پاٹھانے سے، کھانے

کے بعد یا بیٹھنے اٹھنے پر، آدھے سر کا درد، ایسا درد سر جس کو دبانے سے آرام ہو۔

آنکھوں کے پوٹے سوچے ہوتے، ان سے پانی بہے۔

کانوں میں کھجلی، سخت درد، ہر اپن، مواد بہنا (اس کے لئے عجیب دوا ہے) کانوں میں مکھیوں کی مٹھنا ہٹ۔

ناک سے نکسیر بہنا، خشک ناک، سبز یا دبو دار رطوبت نکلے۔

زبان پر لیس دار بغم اور سفید میل کی تہ جھی ہوئی۔ ندرتہ حلق کی جڑ میں جھی ہوئی (مرکبیرس) دانت کا درد جو ہر بار کھانے سے زیادہ ہوا خاص کر کوئی گرم چیز منہ میں ڈالنے پر، ٹھنڈے پانی سے افادہ ہو۔

زیادہ ثقیل اور مرغن چیزیں کھانے سے معدہ اور پیٹ کی خرابیاں ناف کے قریب شنجی درد۔ پاخانہ یا تو بمشکل کم مقدار میں آئے یا پستلا دست، رات کو آؤں اور خون پیمیش میں، سبز آؤں کے دست رات کو۔ بادی بوا سیر کھجلی، درد اور دکھن کے ساتھ۔

پیشاب کرنے میں تکلیف (کنیتھرکس)۔ مثانہ پر بوجھ، خود بخود قطرہ قطرہ پیشاب رات کو کھانسنے میں زور کرنے پر ہو جائے۔ پیشاب بعض دفعہ صاف اور بکثرت اور بعض دفعہ کم اور سرخ، اس کے نیچے سرخ رنگ کا تمچپٹ بیٹھ جائے۔

حشفہ کے اوپر کی کھال میں اور فوطہ میں کھجلی، فوطے سوچے ہوئے اور لگے ہوئے ہوں اور درد کریں، تناؤ کے ساتھ پیشاب کی نالی سے مواد نکلے اور پیشاب کرنے میں جلیں ہو۔ خواہش جماع زیادہ ہو۔ منق و فوطہ میں پانی آنا اور سوزا کی آد کال ٹس (فوطہ کا درم) (دروڈ و نیرون بھیٹس)۔

سپانجیا، آرم، بیلٹوونا) پیشاب میں خون آئے۔

حیض دیر کو مشکل سے کم مقدار میں یا بالکل غائب اور بیروں میں اینڈجن (کونیم، ڈوکامار، ناسفورس، سلفر) بہت جلد اور بہت کم مقدار میں (کونیم، نیٹرم میو، ناسفورس، سلیشیا، بہت جلد اور بہت زیادہ مقدار میں (کاسٹیکم، آئیوڈیم) حیض کارک جانا ٹنڈرکے۔ رحم سے بجائے حیض کے سفید پانی جاری ہو، بے قاعدہ ہو، کبھی ٹھیک وقت پر نہ ہو، خون کے سیاہ لوتھڑے بدبودار نکلیں۔ حیض کا درد نہایت تیز، سیلان الرحم گاڑی رطوبت مثل بالائی کے یا سفید گاڑھی رطوبت۔

حلق میں خشکی اور خراش، خشک کھانسی، خصوصاً رات کی قوت۔ لہزہ کے ساتھ بنجار کبھی پیاس کے ساتھ اور کبھی پیاس کے بغیر پسینہ صرف ایک جانب بائیں طرف یا دائیں طرف۔ چہرہ کا پسینہ رات کو زیادہ ہوتا ہے اور صبح جاگنے پر بند ہو جاتا ہے۔

خسرہ (چھوٹی چیچک) اور اس کے باعث دوسری نکالیف، نہ ہر بار زیادتی :- گرم بند کمرے میں، شام کو بائیں طرف، جدھر درد نہ ہو، دیرینہ مرغن اغذیہ سے، حرکت کے آغاز پر، گرمی سے اور گرم چیزیں لگانے سے۔

کمرے :- کھلی ہوا میں، درد کے عضو کی طرف لیٹنے سے، ٹنڈرکے کمرے میں، ٹنڈی چیز کھانے سے، ٹنڈی چیز لگانے سے۔ معاون :- کالی میو، لائیکو پوڈیم، سلیشیا، سلفیورک ایسڈ، کالی بائیکرام، سیپیا۔

مصلح :- کیموٹا، کانیا، اگنیشیا، نکس و امیکا، سیلیم۔

طاقت :- عموماً ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔ البتہ
 حسب ضرورت ۲۰۰ طاقت اور اس سے اونچی طاقتیں بھی استعمال
 ہوتی ہیں۔

PLUMBUM METALLICUM

پلمبم میٹلیکیم

خصوصی علامات

۱۔ بے حد اور بہت تیزی سے لاغری۔

۲۔ چہرہ پیلا، رنگ فق، راکھ کے رنگ کا، مردہ کا سا، رخسار اندھ
 دھنسے ہوئے۔

۳۔ مسوڑوں کے کناروں کے ساتھ نمایاں نیلی لکیر۔

۴۔ شکم میں شدید درد جو جہم کے تمام حصوں میں جاتے۔

۵۔ شدید درد قولنج، احساس جیسے کہ شکم کی دیواریں ایک دوسری سے
 ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کھینچ دی گئی ہیں۔

۶۔ قے، پاخانہ سخت، بڑا سیاہ، بکری کی منیگنی کی طرح
 (چیلیڈونیم)۔

۷۔ متھد میں تشنج درد۔

عام استعمال

الحاقی ریشہ جات کے اندر ذی اور ام، تولنج، اطراف شکم اور آنتوں میں سخت کھچاؤ ہو اور سخت قبض ہو، مریض کو ہر شے میٹھی معلوم ہو، مزمن ورم گردہ، خصبیوں میں تناؤ، ضعفِ باہ، عورتوں میں پستانوں کا ورم ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض قتل ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ خاموشی والا مایوسگیا، ہر بات دیر میں سمجھے، حافظہ کمزور، توہماتِ داغی کاموں سے نفرت، کبھی سر میں درد ہو اور کبھی پیٹ میں، ایسا محسوس ہو کہ ایک گولا گلے سے اٹھ کر داغ کی طرف جاتا ہے۔ آنکھیں زرد، پتلیاں سکڑی ہوئی۔

مسوڑھے سوجھے ہوئے زرد، مسوڑوں کے کناروں پر نیلی لکیر ہو، زبان کے کناروں پر سرخی اور زبان کانپتی ہو۔

پیٹ، نودہ صفاق اور معدہ میں سکڑن، پیٹ میں درد، جو کہ تمام جسم میں پھیلے۔ ایسا معلوم ہو کہ معدہ کی دیوار سے لے کر ریڑھ تک ایک رسی لگی ہوئی ہے، ایک آنت کا حصہ کسی دوسری آنت میں چلا جائے۔ ریاح رک جانے سے سخت درد ہو۔

قبض، پاخانہ سخت، مبرز میں انگیٹن ہو، مقعد میں انگیٹن، ایسا معلوم ہو کہ مقعد کا ورث کی وجہ سے اوپر کو کھینچتی ہے۔

پیشاب بار بار جس میں البیومین ہو، پیشاب کا وزن مخصوص کم ہو مرن
ورم گردہ، پیشاب قلیل المقدار۔

مردوں میں ضعف باہ، فطی اور کھینچے ہوئے، مستورات میں
فرج کا سخت درد اور پستانوں میں درد، سینہ میں کونچن اور جلن، متواتر
انتقال حمل۔

کسی ایک عضو کا فالج، عضلات میں درد، پیروں کی سوجن۔
زیادتی :- رات کے وقت اور حرکت کرنے سے۔
کمی :- مکنے سے، دباؤ ڈالنے سے اور جسمانی مشقت سے۔
مصلح :- پلاٹینیم، ایلیم، پیرولیم۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

THUJA

تھوجا

خصوصی علامات

- ۱۔ چتر، جب مریض آنکھیں بند کرے (مقرئین، لیگے بس)۔
- ۲۔ آنکھوں کے پوٹوں پر بڑے بڑے دانے مسوں یا آبلوں کی
طرح۔
- ۳۔ تبص، پاخانہ مقوڑا سا باہر نکل کر پھرانڈ کو چلا جائے (سینی کولا)
سلیشیا

- ۴۔ بواسیری متے متورم، درد شدید جب بیٹھا ہو۔
 ۵۔ دست، اگر اگر اسٹ کی آواز کے ساتھ جیسے مشک سے پانی خارج ہو۔
 ۶۔ بہا سے بڑے بیج کے سے، جلد سے اٹھے ہوئے (شانی سیگیا)،
 ۷۔ پیشاب کے اختتام پر شدید گھٹن (سار سا پر پلا)
 ۸۔ سینہ صرف ان حصص پر جو ڈھانپے نہ ہوں، یا تمام جسم پر سوائے
 سر کے (بریکس سلیشیا) جب سوتا ہو پینہ آئے اور جاگنے پر رک
 جائے (بریکس سمبکس)
 ۹۔ احساس جیسے جسم خصوصاً اعضاء شیشہ کے بنے ہیں اور جلد ٹوٹ
 جاتی ہے۔
 ۱۰۔ دبا ہوا سوزاک، جس کے باعث گھٹیا، وجع المفاصل ہو۔

عام استعمال

یہ سوزاک اور چمپک کی خاص دوا ہے، پرانے اور بے ہوئے سوزاک
 اور اس کے اثرات کے لئے عام طور پر مستعمل ہے۔ علامہ بری یہ دوا جلد
 خون، معدہ، آنتوں، گردوں اور دماغ پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت
 رکھتی ہے، اس کا خاص اثر جلد، آلات بول اور بالخصوص پیشاب کی
 نالی پر ہوتا ہے، جلد یا جھلیوں پر مستوں کا پیدا ہونا بھی اس دوا کا
 متقاضی ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض چاندنی میں بے چین ہو جاتا ہے،
 بیشتر علامات دائیں طرف ہوتی ہیں۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض مایوسی اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے، خیالات میں یکسوئی کا فقدان ہوتا ہے، بات چیت کے وقت مبشکل الفاظ سوچ پاتا ہے۔

سر میں اٹھ کر کھڑے ہونے پر ہچکچاہٹ محسوس ہوتا ہے، دماغ کا فالج، صبح کے وقت درد سر، بھاری پن صبح کو خاص کر جاگنے کے بعد، سر میں ایسا درد جیسے کسی نے کیل مٹوٹک دی ہو (انگنیتیا، اناکارڈیم)، آنکھوں میں بوجھ اور جلن، نگاہ دھندلی اور کمزور، کان میں سخت کوکھن اور جھین اور دھکنے والا درد، خشک زہام، ناک میں پیڑیاں

چہرہ پر گرم محسوس ہو، ہونٹوں میں انیمیشن، گال کی بڈیوں میں ایسا معلوم ہو کہ کوئی کھریچ کر سوراخ کر رہا ہے۔

منہ آجانا، گھڑی دال ہے، آواز آہستہ آہستہ نکلے، کھانا کھاتے ہوئے حلق میں خراش، ذائقہ میٹھا، صرف رات کو یا صبح کو پیاس ہو۔
کھانا کھانے کے بعد غذا منہ کو آٹے، پیٹ میں انیمیشن، کمر میں بوجھ، نفخ، دل کی گٹھلیوں میں دھم۔

تنبض جو کئی دن تک قائم رہے، پانچا نہ ذقت سے ہو۔ سہولت لمبا ستہ، خون میں لپٹا ہوا، مہر نہ سگڑی جائے اور درد کرے۔

پیشاب کرنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ ابھی کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں بہہ رہا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن۔
مردوں میں عضوتنا سل چھوٹا، سوزا کس سپادی اور حشفہ بہرہ مستہ،

ایستادگی دیر میں ہو، احتلام ہو۔

مستورات میں حیض قلیل، رحم کے سوراخ پر مسہ ہو، سیلان الرحم۔
کھانسی میں زرد بلغم نکلے، سینہ میں جھنجھٹا ہٹ اور درد، کوئی سرد
چیز پینے کے بعد بہت شدید دھڑکن جو کہ باہر نشان ہے۔

پیٹھ میں زہریلا پھوٹا، سردی کے ایام میں صبح کے وقت انگلیوں
میں درد اور درد ہو جائے، انگلیوں کے سروں میں سوجن۔

جلد پرستے۔ یہ دو خصوصاً ملائم اور ریشہ دار کھڑے ہوتے
شکل گو بھی کے پھول کے مستوں میں مستعمل ہے۔

زیادتی :- رات کو، بستر کی گرمی سے، تین بجے صبح اور ۳

بجے سرد ہر کو، سرد اور مرطوب ہوا سے اور نشہ آور چیزوں سے،
کسی :- ہانپنے سے، کھجلیانے سے۔

معاون :- آرسینکیم البم، میڈورینیم، نیٹرم سلف، سبانا، سلیشیا۔

مصلح :- کیمفر، کمیوٹا، کوکوس، کالمیکیم، مرکوریس، نکس و امیکا،

پلسٹیل، سلفر، سٹانی سکیما۔

طاقت :- مرٹسکچر سے ۳ طاقت تک نیز ۲۰ طاقت اور اوپر

TUBERCULINUM

ٹوبرکولینم

نصوصی علامات

- ۱۔ جب خاندان میں ذق کی ہسٹری ہو اور کسی مرض میں بہترین منتخب دوا سکون دینے یا مکمل طور پر شفا دینے سے قاصر ہے۔
- ۲۔ علامات ہمیشہ تبدیل ہوتی رہیں (پیشا نیلا)
- ۳۔ نزاکا بہت جلد جلد حاصل کرے بغیر جانے بوجھے اس امر کے کہ کہاں اور کس طرح سے ہوا۔
- ۴۔ لاغری جلد جلد اور نمایاں طور پر آئے۔
- ۵۔ چھوٹے چھوٹے بھوڑوں کی فصلیں جن سے سبز اور شفقن مواد خارج ہو (سیکیل کارا)

عام استعمال

مرض سل کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت زیادہ مستعمل و مفید ہے۔ نیز ایسے افراد کے لئے موزوں ہوتی ہے جو کہ لمبے، دبے ہوں، جن کی چھاتی چبھتی اور تنگ ہو، جن کے خاندان میں سل کا مادہ موجود ہو۔ علاوہ بری مرگی اور عصبی ضعف میں بھی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض تشک مزاج ہوتا ہے خصوصاً جاگنے پر، سیت بہت کتوں اور جانوروں سے خوف زدہ ہو، بد زبان ہو، بہت قسمیں کھائے۔
سر میں گہاورد خصوصاً عصبی نوعیت کا، سرسام۔
کان کے پردہ میں سوراخ ہو، کان متواتر بہتا ہے۔
معدہ مہو کے مائے ڈوبتا محسوس ہو، گوشت سے نفرت، ٹھنڈے دودھ کی رغبت۔

علی الصبح یکایک دست آتے (سلفی) یا پاخانے بزرگ سیاہ، براؤن بدبودار اور بہت زور کے ساتھ خارج ہوں، سیل بطنی ہو۔
پستانوں میں رسولیاں، حیض کثیر مقدار میں وقت سے پہلے آتے اور دیر تک آتا ہے۔ یا پھر عسر و غلٹ ہو، خون حیض کے جاری ہونے کے ساتھ در دیں تیز ہو جائیں۔

سخت خشک کھانسی نیند کے دوران ہوتی ہو، موٹی بغم باسانی حاج ہو، سانس چھوٹا ہو، تازہ ہوا کی بہتات کے باوجود دم گشتا ہو، غصہ ہوا کی خلش ہو۔

گروں اور حرام مغز کا شیلا حصہ تنا ہوا، کندھوں کے درمیانی مقام میں یا کمر کے اوپر کے حصہ میں ٹھنڈک ہو۔

جلد جسم پر پانی چھنیاں، خارش شدید ہو، دھڑ ہو، نیز خسرہ اور حنظل میں بھی مستعمل ہے۔

زیادتی، حرکت کرنے سے، راگ زنگ سے، طوفان سے پہلے

کھڑے ہونے سے، تھری سے، ہوا کے جھونکے سے، علی الصبح اور
نیند کے بعد۔

کھی۔ کھلی ہوا میں۔

معاون۔ کلکیر یا کلکیر یا آئیوڈائیڈ، کلکیر یا ٹاس، ہائیڈروکس یا سٹورس
پیشاب، خضاب۔

مصلح برتھس و امیک

طاقت۔ ۲۰۰ سے بہت ازیں تک

TABACUM

ٹوبیکم

خصوصی علامات

۱۔ جسم کی جلد پر ٹنڈا پسینہ۔

۲۔ چکر جس کے ساتھ مروہ کا سا پیلپن ہو۔

۳۔ چکر آنکھیں کھولنے پر۔

۴۔ تھیں، شدید ٹنڈے پسینہ کے ساتھ، جوں ہی حرکت کرنا شروع کرے۔

۵۔ بھری تھیں جس میں کچھ جہاز کے بالکل بالائی سمت پر یعنی کھلی، تازہ اور
ٹنڈی ہوا میں ہو۔

۶۔ فم معدہ میں کمزور، کلیجہ ڈوبنے کا شدید احساس۔

۷۔ بچہ اپنا پیٹ تنگ رکھنا چاہے۔

۸۔ دست متلی، تھکے، کمزوری اور ٹھنڈے پسینے کے ساتھ۔

عام استعمال

یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جبکہ ابکائیاں غضب کی آتی ہوں اور تھکے بھی ساتھ ہو، جسم سرد اور پسینے آتے ہوں، نبض رک رک کر چلتی ہو، دل کے مقام میں تکلیف محسوس ہوتی ہو۔
سمندری سفر کی بیماری (چکر، متلی اور تھکے) میں بھی یہ دوا مستعمل و

مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض اپنے کو بد قسمت تصور کرتا ہے، مایوسی، نسیان، طبیعت میں تنازعہ نہ ہو، آنکھیں کھولنے میں چکر معلوم ہو، صبح کو درد سر سخت متلی، یکایک درد سر جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں۔
نظر دھندل ہو، موتیا بند، چہرہ زرد، نیلگوں، چہرہ پر سرد پسینہ، حلق اور ناک کے درمیان راستہ میں دم، صبح کو کھانسی ہو، یکپہر دینے والوں کی کھانسی۔

متواتر متلی ہو، تمباکو کی بور سے زیادہ ہو، خفیف حرکت کرنے پر بھی تھکے ہو جائے۔ حمل کے زمانہ میں متلی اور تھکے، تھوک بہت آئے، کوڑھی کے پاں ایسا معلوم ہو کہ دھنسا جاتا ہے۔ دل کے قریب وزداعط کر بائیں بازو تک آئے۔ پیڑ و ٹھنڈا، پیڑ و کوڑھک نہ سکے، کیونکہ کھلا رکھنے سے متلی اور تھکے میں کمی ہوتی ہے۔

قبض، مقعد مفلوج، خروج مقعد، یکایک تپلا اسہال، متلی اور تپ
 ٹھنڈا پسینہ، درد گردہ، پیشاب کی اس نالی میں درد جو گردہ سے بائیں
 طرف آتی ہے۔

بائیں کرڈٹ لینے سے دھڑکن، نبض بے قاعدہ اور کمزور، سانس لینے
 میں تکلیف، کھانسی خشک، تکلیف وہ گھونٹ بھر پانی پینے کی ضرورت
 ہو سانس کی تکلیف اس کے ساتھ بائیں کرڈٹ لیٹنے میں بائیں بازو میں
 جھنجھٹا ہٹ ہو۔

ہاتھ پاؤں ہر طرف کی طرح سرد، اعضاء میں لغزش، سکتے کے بعد
 فالج، دل پھیل جانے کی وجہ سے نیند نہ آئے، سرد اور چیچیا پسینہ اور
 گھبراہٹ۔

زیادتی، آنکھیں کھولنے سے، شام کے وقت، انتہائی گرمی اور سردی سے
 کٹھی، کپڑا اتار ڈالنے سے، کھل تازہ ہوا میں

مخالف :- آگنیشیا

مصلح :- آر سینکیم البم، آگنیشیا، سیپیا، لائیو پوڈیم، بکس و امیکا،
 کلاڈیم، پلانٹیکو، فاسفورس، جلیس میم، اسپیک۔

TARANTULA

ٹیرنٹولا

خصوصی علامات

- ۱۔ بے چینی، کسی بھی وضع میں آرام سے نہ رہ سکے۔
- ۲۔ چلنے پھرنے کی بہت رغبت لیکن اس سے تکلیفات بڑھ جائیں،
(برعکس رشاکس، رٹا)
- ۳۔ ڈنبل، جس میں ماؤفہ حصص نیلگوں رنگ کے ہوں (لیکے کس)، اور
شدید جلندار درد (انتھراکسین، آرسینیکم ایلم)
- ۴۔ بسہری کا درد نزع کی سی کیفیت طاری کرے۔
- ۵۔ درد سر جس میں زیادتی شوم سے، چھونے سے اور تیز روشنی
سے ہو۔

عام استعمال

یہ دوا سمیتی امراض میں کام آتی ہے جبکہ نقاہت شدید ہو، متاثرہ
مقامات کا رنگ ارغوانی ہو اور ان میں جلن و ٹونک مارنے کا سادہ ہو۔
کارٹیکل میں بھی یہ دوا سودمند ہوتی ہے جبکہ ماؤفہ مقامات ارغوانی رنگ
کے ہوں، ان میں سڑاند پیدا ہوگئی ہو اور جلن وار ٹونک مارنے کا سادہ ہو۔
موت کے آخری لمحوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے یہ دوا بہت

خفاق وہائی کی یہ ایک اعلیٰ دوا ہے۔ آلات تناسل کے آس پاس کھلب کے لئے بھی نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بیحد اعصابی طبیعت والا ہوتا ہے، پیچیدہ فکری امور فراموشی تکلیف سے غصہ آجاتے، جس کے بعد بے حد غلگنی ہو۔

درد سر، شدید، جسے دماغ میں لاکھوں سوئیاں چمپوٹی جا رہی ہوں یا عصبی درد سر جس میں زیادتی شور سے، چھوٹے سے اور تیز روشنی سے ہو اور کمی سہلانے سے اور سر کو تکیہ پر رکھنے سے۔

ریڑھ کے ستون کو ذرا سا چھو دینے سے سینہ اور قلب کے مقام پر انیٹھن والے درد۔

صغروی تکلیف جن کے ساتھ تمام جسم یاد نہا بازو اور بائیں ٹانگ مائل ہو رہا یا بازو اور دائیں ٹانگ میں یہ علامت الگیس کی ہے، مسلسل حرکات ٹانگوں کی، بازوؤں کی، اوپری حصہ جسم کی، کسی بھی کام کے کرنے کی نا اہلیت کے ساتھ جھٹکے اور عضلات میں انیٹھن ہر حیض پر حلق، منہ اور زبان پر بے حد خشکی خصوصاً جب مریض سوئی ہوئی ہو (بکس موسکاٹا)

شہولہ استخراجی دیوانگی کی حد تک، رحم میں درد، فرج پر ناقابل بیان خارش۔

ذہنی، پھوٹے، بسہریاں

فاسد زخم، سرطان، اسکارسکل، فاسد پھوٹے۔

زیادہ تر علامات نوبتی ہوں۔

زیادتی :- حرکت سے، چھوٹنے سے، ماؤذ حصہ کو کسی کے ساتھ لگنے سے، شہ سے، موسم کی تبدیلی سے۔

کسی :- کھل ہوا میں، گانے سے، ماؤذ حصہ کو سہلانے سے۔

مصلح :- بووٹا، کاربوئیج، چلیڈونیم، کیو پریم ٹیلیکم، پٹاٹیل،

جلیسی میم، ماکس، میگنیشیا کرب۔

طاقت :- ۳۰ طاقت اور اونچی طاقتیں۔

TEREBINTHINA

ٹیری بنتھینا

خصوصی علامات

۱۔ پیشاب میں نمیشہ کے پتے ہوتے جوشاندہ کی سی بو۔

۲۔ زبان ہموار، چمکیلی اور سرخ۔

۳۔ پیٹ میں بے حد تناؤ۔

۴۔ دست بار بار، مقدار میں زیادہ، متعفن اور خون آمیز، جلن کے ساتھ۔

۵۔ پاخانہ کے بعد کمزوری اور غشی کی سی کیفیت۔

۶۔ پیشاب میں خون اچھی طرح ملا ہوا۔

۷۔ پیشاب بادل کے سے رنگ کا، دھوئیں کا سا، البیومن ملا، مقدار

میں زیادہ گہرے رنگ کا یا سیاہ، بے درد کا۔

۸۔ جریان خون آنتوں سے۔

۹۔ گردہ، مثانہ اور پیشاب کی نالی میں شدید جلن وارہ اور کھینچنے والے درد (بربرس، کینابس، کینتھرس)،

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر گردہ، مثانہ اور پیشاب کی نالی کے اورام میں جن کے ساتھ تقطیر بول ندالی یا پیشاب میں رکاوٹ موجود ہو یا جیب پیشاب خون آمیز آئے، اکثر مفید ہوتی ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور گہرے سرخ رنگ کا ہو، پیٹ میں نفع ہو، اعمار سے خون جاری ہو یا ان میں خراش پائی جائے تو بھی یہ دوا مستعمل ہے اور نافع ہوتی ہے۔

عمومی علامات

زبان چمک دار، سرخ اور کچن ہو، مثل آگ کے جلے اور دکھن ہو، پیٹ میں ہیئت سادہ، آنتوں میں زخم اور ان سے جریان خون ہو، رقیق متعفن خون آمیز اور سبزی مائل اسہال آئیں، کرم شکم اور ہریاخانہ کے بعد غشی لاحق ہو، کمزوری انتہائی درجہ کی نمایاں ہو، مقعد و مبرز میں جلن ہو، مزمن اسہال روکنے کے لاجواب دوا ہے۔

پیشاب کی نالی کا ورم، تقطیر بول، خون آمیز پیشاب رک رک کر آئے۔

دھم میں ورم اور سخت جلن ہو، کثرت حیض، ورم مثانہ

نبض کمزور، باریک اور بے قاعدہ ہو، تنفس کی تنگی، پھیپھڑوں
سے خون آئے، پھیپھڑے پھولے ہوئے محسوس ہوں۔
گردے متورم ہوں اور ان کے گرد دروازوں کا احساس ہو اور یہ
در کو بہت تک جاتے۔

جلد پر خارش، نیلا مٹ نموار ہو، لال بنجارہ۔
سر سامی بنجار میں نفع ہو، شدت کی گرمی اور پیاس محسوس ہو، ٹنڈا
لیں وارپینہ بکثرت آئے، مریض بے ہوش ہو، سر سام کی علامات
واضح ہوں۔

زیادتی :- چھوٹے سے، بائیں طرف لیٹنے سے، بیٹھنے سے، حرکت
سے، کھل ہوا میں چلنے سے، رات کے وقت، ایک سے تین بجے
صبح تک، مطلوب جگہ پہنچنے سے۔
کمی :- جھکنے سے، ریاح کے اخراج سے۔
مصلح :- فاسفورس

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

خصوصی علامات

- ۱- دمہ
۲- کالی کھانسی

عام استعمال

یہ دوا خاص طور پر سینہ کے بلغمی امراض بالخصوص دمہ اور کھالی کھانسی میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض چڑچڑا ہوتا ہے، سر گرم، بھاری زکام کے ساتھ آنسو بہیں، چھینکیں آئیں، سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے، زکام کے ساتھ کھانسی، حلق اور منہ خشک، قھوک نکلنے میں درد، سینہ میں خشک بلغم، آواز بھاری، دورہ کے ساتھ کھانسی۔

ضیق النفس (دمہ) سینہ میں رکاوٹ، دمہ کے دورہ ہوں، کالی کھانسی یہ دوا ایلم سیپا اور یوفریشیا کی درمیانی حالت کے لئے مستعمل و نافع ہے۔ کھانسی یا دمہ جو بہت تر ہو اس کو خشک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ دوا پساٹیل کی نسبت زیادہ مفید ہوتی ہے۔

پیشانی سے بلغم اگرچہ خشک ہو جاتا ہے لیکن نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اور تنفس زیادہ ہوتا ہے اس کے برعکس جسٹیشیا سے تنفس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

زیادتی :- گرم کمرہ میں، بند کمرہ میں، کسی پر کھل ہوا میں۔

طاقت :- مدر ٹیچکریا یا $3 \times$ یا $6 \times$ تک درجی حالتیں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتی ہیں۔

GELSEMIUM

جیلسی میم

خصوصی علامات

- ۱۔ دھوپ یا موسم گرما سے پیدا شدہ عام کمزوری۔
- ۲۔ کمزوری اور لرزہ کسی عضو کا یا پورے جسم کا۔
- ۳۔ چکر گدی سے شروع ہو (سلیشیا)
- ۴۔ عضلات میں ہم آہنگی اور توازن نہ ہو، توازن منتشر ہو جائے۔
- ۵۔ درمیر گردن کی پشت میں مدیرہ سے شروع ہو۔
- ۶۔ ٹھنڈک کمر میں تیزی سے لہر کی طرح کمر سے گدی تک نیچے اوپر آئے جاتے۔

عام استعمال

اسے لرنے والی دوا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ تمام عضلاتی نظام (ارگر اور پٹھے) ایسے کمزور ہو جائیں کہ قابو میں نہ رہیں اور اعضاء حسب مرض کام کرنے سے جواب دے جائیں مثلاً چلنے کی کوشش پر ٹانگیں، لہقہ، زبان سب کانپیں اور کانپنے کی یہ کیفیت کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے۔ علاوہ بریں حسب علامات مختلف قسم کے سنجاروں، انفلوئنزا، فم رحم کی سختی، پرستوتی تشنج، دقت حیض، کس ایک عضو کا فالج، جوڑوں کے درد، زمانہ حمل یا زچگی کے عوارض، بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ کی تکالیف وغیرہ میں بھی نافع ہے۔ خمرہ میں ابھاروں کو باہر نکالنے میں بھی مدد ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض الجھن کا شکار ہوتا ہے، خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ مریض نہایت غصیللا ہوتا ہے۔ اول حسی و تیزی اور بعد میں پست ہمتی ہوتی ہے۔

سر میں جکڑ جس کے ساتھ نشہ والوں کی سی لڑکھڑاہٹ ہو، چہرہ میں گرمی ہو اور رگیں خون سے بھر جائیں۔ کھانے کے بعد گدی میں میٹھا میٹھا درد ہو، سر ہلانے اور جھکانے سے درد زیادہ ہو، درد سہر، چکر، غشی اور گردن کے درد کے ساتھ ہو۔

پوپٹوں میں ایسی گرانی معلوم ہو کہ جس سے آنکھیں جھکی رہیں، آنکھیں کھولنے میں دقت ہو، دھندلا پن، پتیلیاں پھیلی ہوئی، روشنی سے نفرت ہو

ہونٹ خشک گرم اور زبان پر سفید مائل بہ زردی میل جا ہوا، سانس سے بدبو آتی ہو، منہ میں ایسی جلیں جو بڑھ کر حلق اور پیٹ تک جاتی ہو ایسا معلوم ہو کہ حلق کے اندر کچھ اٹکاؤ ہے، حلق بھرا ہوا معلوم ہو۔
کھنکھارہ کاری آئیں (ناٹھرک ایسٹا) معدہ خالی معلوم ہو اور چپکائے پانخانہ نرم بھی مشکل سے خارج ہو، ایسا معلوم ہو کہ مبرز سکڑ گیا ہے دفعۃً خوف، رنج، خراب چیز سے درست آنے لگیں (یہ حالت انگیشیا، اوپیم اور پلپاٹیل میں بھی ہوتی ہے)، پانخانہ زرد صفراوی یا سفید، مبرز کا معنوج ہو جانا۔

مردوں میں بلا ایستادگی خود بخود منی خارج ہو جائے جس سے نہایت سستی اور کمزوری معلوم ہو۔

مستورات میں رحم کی گرانی، حبس، حیض تشنج کے ساتھ، ایام حیض میں رحم میں سخت درد ہو، پھر سختی آجائے۔

حلق میں ایسا تشنج ہو کہ جس سے دم گھٹنے کا اندیشہ، حلق میں خراش ایسی معلوم ہو کہ زخم پڑ گئے ہیں۔ سینہ کے نیچے کے حصہ میں رکاوٹ معلوم ہو، حوالی دل میں کوسخین ہو، ایسا معلوم ہو کہ اگر چلنا پھرنا بند ہو جائے گا تو دل کی حرکت بند ہو کر موت ہو جائے گی۔ ڈیجیٹلس میں خفیف حرکت کرنے سے دل میں کمزوری معلوم ہوتی ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے مگر جلیسی میم میں حرکت کرنے سے راحت ہوتی ہے۔
بخار لرزہ کے ساتھ پیاس کے بغیر، سردی پر سے لے کر حرام مغز پر ہوتی ہوئی اوپر کو چڑھے اور گردن تک جاتے۔ بخار بغیر پیاس کے جلیں نہایت زیادہ ہو، سینہ مع پیاس کے، ایسینہ آنے سے آرام ہو۔

زیادتی :- تر موسم میں ، بادل کی گرج سے قبل ، دفعتاً جذبات سے
خواب چیر سے ، تباکو پینے سے ، اپنی بیماری کے خیال سے ، اپنے
نقصان کے ذکر سے ۔

کسمی :- ٹھنڈی کھل ہوا میں ۔

معاون :- بپ ٹیشیا ، اپیکاک ۔

مصلح :- چائنا ، کافیا ، نیٹرم میور ۔

طاقت :- مدرٹشکچر سے ۳۰ طاقت تک ہی عام طور پر مستقل ہے ۔

CHINA

چائنا

خصوصی علامات

۱۔ مریض مرفہ دل ، لا پروا ، کم سخن (ناسفورک ایسٹ)

۲۔ تکلیفات ، طو بات زندگی کے ضائع ہو جانے سے ، خصوصاً خون
کے اخراج سے ، یا زیادہ وقت تک دودھ پلانے سے یا زیادہ

پیمپ بہہ جانے سے (چائنا سلف)

۳۔ درد سر ، جیسے کھوپڑی پھٹ جائے گی ۔

۴۔ درد سر ، سیلان خون یا کثرت جماع کے بعد ۔

۵۔ بے حد کمزوری ، ذکی الحس چھونے سے ، درد سے ، ہوا کے
جھونکوں سے ۔

۶۔ سیلانِ خون بہت مدت کا یا بہت عرصہ تک جاری رہے۔
۷۔ لڑتی بھاری جو حرارت کے وقت نہ ہو۔

عام استعمال

یہ دوا خون اور رطوبات کے زائل ہونے سے لاحق ہونے والی کمزوری کے علاوہ مکی خون، جریانِ خون، جگر اور تھل کے عوارض، یرقان، بنیر درد کے اسہال، مختلف قسم کے بخاروں، تپِ دق، بچوں میں باض کے عوارض و فتور وغیرہ میں حسب علامات مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم ہمت اور ہر قسم کی مشقت سے عاری ہوتا ہے، داغ اور سر کمزور، سر میں بھاری پن، چکر، سر اٹھانے پر تنکین کا درد، سر جو ہر اسے یا ذرا سا بھی چھونے سے زیادہ ہو مگر زیادہ زور سے دبانے سے کم ہو۔

پڑھتے وقت الفاظ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے نظر آتے، سر میں گرمی اور جلن، کان میں گڑگڑاہٹ، سننا ہٹ، بھیننا ہٹ، کوٹھن بہا پن، زکام، بخیرینہا، چہرہ زرد، کمزور، آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑے ہوتے، چہرہ کا درد، چھونے سے زیادہ ہو۔

دانت کا درد چھونے سے زیادہ ہو، دبانے سے آرام ہو، زبان پر موٹا گند میل، ہونٹ خشک۔

ریاح کی وجہ سے کل معدہ میں ابھار، نفخ، کھانے کے بعد معدہ پھولا ہوا۔

جگر میں دم اور درد۔ لہذا کمزور و دودھ سے مدد خراب ہو جائے
کھانے کے بعد کڑوی ٹوکار۔

دست غیر مضبوط پانی جیسے سفید، زرد یا سیاہی مائل، نہایت
کمزور کرنے والا نرم پاخانہ جسے مشکل سے خارج ہو، پیشاب گندہ کم
مقدار میں، پیشاب کی نالی میں کونچن۔

چلنے میں اعضائے تناسل میں بھاری پن، جلق کی وجہ سے احتلام
حیض کثیر المقدار (زیادہ) سیاہ لونقڑے، استقلا حمل کے بعد اور رخن
کمزور کرنیوالا، قبل حیض سفید رطوبت خارج ہو۔

کھانسی گویا گھلے میں دھواں بھرا ہوا ہے، سینے بولنے یا پینے
سے زیادہ ہو، پھیپھڑے سے خون آنا، لیٹنے سے سینہ میں بوجھ معلوم
دائیں گھٹنے کا گرم دم، پیر کا دم، ایک ہاتھ سرد اور دوسرا گرم،

ایک پیر گرم اور دوسرا ٹنڈا (لائیکو پوڈیم، چلیڈونیم اور ڈیجیٹلس)
بخار لرزہ کے ساتھ اور پیاس کے بغیر، لرزہ آتے ہی پیاس بند ہو جائے

کل جسم میں سردی، پانی پینے سے زیادہ ہو، سردی اور لرزہ کھلی ہوا میں،

ہر بجے شام کو، کمرہ میں آنے سے غائب ہو جائے۔ پیاس لرزہ سے پہلے

یا بعد مگر دوران لرزہ نہ ہو، بخار بغیر پیاس کے، کل جسم گرم ہو، درد سر

کپڑا کھولنے کی خواہش، لیکن کپڑا ہٹانے سے سردی لگے، عرصہ تک قائم

رہنے والا بخار، بخار جس میں نیند آجائے، پسینہ کے ساتھ، پسینہ بکڑ

کمزور کر دینے والا، کھلی ہوا میں چلنے سے بھی پسینہ آئے۔

زیادتی :- پینے سے، حرکت سے، عضو کو پھیلانے سے، ذرا

مچھونے سے، ہوا کے جھونکے سے، ہر دوسرا دن، رطوبت زندگی

سے ضائع ہو جانے سے، رات کو کھانے کے بعد، جھکنے سے۔
کھی :- دوسرا ہو جانے سے، زور سے دینے سے، کھلی ہوا میں
گرمی میں۔

معاویہ :- نیوم ٹیٹیکیم، کلکیر یا فاس
مخالف :- ڈیسی فیس، کریازوٹ، سیلینیٹیم، لیڈیم۔
مصلح :- آرسینکیم البم، آرنیکا، ہیلادونا، کاربوڈیج، اپیکاک
مرکبوریس، پلسا ٹیلا، سپیا، سلفر۔
طاقت :- در ٹیچر سے ۳۰ طاقت تک نیز ۲۰ طاقت بھی متعلق ہے۔

CHININUM SULPH.

چینی نم سلف

نصوصی علامات

- ۱۔ سردی سے لرزہ اور اس کے دوران کسی رگوں کا درد کرنا اور پھول جانا۔
- ۲۔ لرزہ گرم کمرہ میں بھی کم نہ ہو۔
- ۳۔ خون کے سرخ ذرات میں کمی۔
- ۴۔ پیشاب کا نہ زیادہ مقدار میں آنا اور البومین کا اخراج۔

عام استعمال

یہ دوا ملیریا کے قے ہوئے مائے کو ابھارنے کے لئے بہت کارگر

ہے علاوہ بریس و جمع المفصل، گٹھیا اور مزمن درم گروہ میں بھی مستعمل ہے اس کا زیادہ تر استعمال طبر یا بنجار کے لئے ہوتا ہے۔

عمومی علامات

پیشانی پر مینوں کے اوپر اور کن پٹیوں پر درد جو کہ دوپہر کے وقت بڑھے، اس کی ابتداء طبر یا بنجار سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی سر چکرانا، دوکن جو کہ بائیں جانب شدید صورت میں ہو، مریض کو چکرا میں، کھڑا نہ ہو سکے کانوں میں زور کی آوازوں کا آنا، کانوں کا بھنا اور سننے کی قوت میں کمی۔

آنکھوں کے نیچے نعوں کا درد شروع ہو کر ارد گرد پھیل جائے، درد باقاعدہ دوروں کی صورت میں آئے، دباؤ سے تسکین ہو۔

بیڑھ کے مہروں کا شدید طور پر درد کرتا، دبانے سے درد میں زیادتی، یہ درد گزرن اور سر کی طرف رخ کرتا ہے۔

پیشاب خون آمیز، گاڑھا، مٹی کے رنگ کا اور اس کے نیچے پرغنی تلچھٹ کا جمع ہو جانا، پیشاب زیادہ مقدار میں آئے اور اس کے ساتھ البیومن کا اخراج۔

جلد پر خارش، سرخ پھسیاں، چھپاکی، یرقان، آبلے، پھوٹے اور ہر قسم کی سوزش درد کرنے والی، جھریوں والی جلد۔

بنجار سردی اور لرزہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کئی دگوں کا درد کرنا اور پھول جانا، گرم گروہ میں بھی کانپے جانا، بے چینی، پسینہ آنا اور ساتھ کا نپٹا، اعضا میں شدید لرزہ، نبض کمزور، درجہ حرارت بیکہ زیادہ

بعض حالتوں میں نارمل سے بھی کم ہو۔

طاقت :- عام طور پر ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور بعض اوقات اس سے اونچی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں۔

CHELIDONIUM

چیلیدونیم

نصوصی علامات

۱۔ مسلسل درد دانے نیچے شانہ کے زادیہ کے نیچے (کالی کارب،

مکیو بیس)۔

۲۔ نہایت گرم اشیا پر پینے کی خواہش۔ نفسی چیزوں کی خواہش

۳۔ آنکھوں کے گوشوں کا نوبتی اعصابی درد جس میں آنسو پڑنے کی طرح بہیں (رشاکس)۔

۴۔ قبض، پاخانہ سخت گول سدوں کی صورت میں۔

۵۔ جلد کا رنگ سیٹی مائل زرد، جلد بے آب۔

عام استعمال

یہ دائمی طرف کی دوا ہے، جگر کی خرابی میں عام استعمال ہوتی ہے۔ خاص کر صفراوی امراض یرقان، پتہ کی پتھری، تواریخ، صفراوی پتھری، دیر جگر، ورم جگر، جگر کی خرابی سے پیدا ہونے والے نسوں اور پٹوں

کے یا دیگر درد نیز کالی کھانسی، دورہ والی کھانسی، صفراوی نمونہ، بچوں کی کھانسی اور بانکائیٹس وغیرہ عوارض اس کے زیر اثر آتے ہیں۔ اس دوا کے درد بلیوینیا سے مشابہ ہوتا ہے البتہ پاخانہ بلیوینیا میں سخت اور ہورا ہوتا ہے اور چیلڈرینیم میں مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے۔

عمومی علامات

دورانِ سر جو بستر سے اٹھنے، بیٹھنے، آنکھ بند کرنے سے زیادہ ہو اور سر پھٹنے کو ایسا معلوم ہو کہ وہ آگے کی طرف گر پڑے گا، ایسے دورانِ سر میں عموماً یرقان اور صفراوی تے بھی موجود ہوتے ہیں، سر کے دائیں جانب درد، دائیں رخسار، کان، آنکھ اور جگر میں ناخوشگوار احساس اور درد ہو، گردن اکڑی ہوئی۔

دردِ شکم، زبان چوڑی اور میل آلود ہو، نواقض کڑوا اور طبیعت میں متلی ہو، بعض دفعہ تے بھی ہو جاتے، درد پیٹھ اور شانہ کی ہڈی تک جلتے، کھانے سے عارضی فائدہ ہو، یرقان، آنسو کا فعل سست ہو، جگر کا بڑھ جانا، صفراوی پتھری، زرد واسہال، صفراوی تے۔

بلیوینیا، کھانسی شدت سے ہو، سینہ میں بغم کھڑکھڑائے، کالی کھانسی، کثیر بغم آئے، لیکن اس کا اخراج مشکل سے ہو، کھانسی کے ہمراہ مقامِ جگر میں کسیدے والا درد ہو، سانس کی تنگی۔

گردوں میں سوزش ہو، پیشاب کف دار، کثیر المقدار اور زردی مائل گدلا۔

جگر کی خرابی کے باعث گھٹنوں میں مفصلی درد، گولہوں اور انوں میں درد، ایڑیاں سخت اور مفلوج ہوں، عضلات میں سختی۔

زیادتی: دائیں جانب حرکت سے، تبدیلی موسم سے، صبح سویرے کھڑی، شام کے وقت، گرم اشیا پر پینے سے، خصوصاً دودھ پینے کی بہت خواہش ہو۔

معاون: لائیو پوڈیم، برائیونیا۔

مصلحہ: کیہو ملا

طاقت: چھوٹی طاقتیں زیادہ تر مستعمل ہیں۔

CHIONANTHUS

چونانٹھس

خصوصی علامات

- ۱۔ ماتھے پر آنکھوں سے اوپر درد۔
- ۲۔ ناک کی جڑ پر دباؤ کا احساس۔
- ۳۔ یتھان جس کے ساتھ ایام ماہواری بھی بند ہو جائیں۔
- ۴۔ دوروں کی صورت میں آنے والا درد معدہ و شکم۔

عام استعمال

یہ جگر کے لئے ایک خاص دوا ہے، صفراوی امراض میں عام طور پر

مستقل ہے۔ دردِ سر، دردِ شقیقہ، دیگر اعصابی درد، قبض، یرقان،
تلی کا بڑھ جانا، پتہ کی پتھری، ذیابیطس شکر، وغیرہ عوارض اس کے
زیر اثر آتے ہیں۔

عمومی علامات

سرمجاری، بے چینی، ماتھے پر آنکھوں سے اوپر شدید اعصابی درد
جو کہ خاص طور پر ناک کی جڑ کے اوپر ہوا رکن ٹیوں تک پہنچتا ہو،
درد بھگنے پر یا حرکت سے بڑھتا ہے۔ آنکھ کا سفید حصہ زرد ہو جائے
یرقان۔

منہ میں خشکی کا احساس جو کہ پانی پینے سے بھی دور نہ ہو، علاوہ بڑی
لعاب دہن کی کثرت کے باوجود منہ کی خشکی کا قائم رہنا۔

ناف کے مقام پر درد اور مجاری پن، معدہ پر بندش کا احساس گویا
کہ دسی سے بانڈھ دیا گیا ہے اور اسے کبھی ڈھیلہ کیا جاتا ہے اور کبھی
کس دیا جاتا ہے۔ پیٹ درد کرنے والا، پھولا ہوا، ساتھ یرقان اور
قبض، جگر کی بندش اور خون میں صفرا کی ملاوٹ، پاخانہ کا رنگ سفید
بعض دفعہ تپلا، زرد، چکنے والا پاخانہ۔ زبان پر میل کی بھاری تہ،
محبوک کی کمی، صفراوی قولنج، جگر کے مقام پر درد۔

پیشاب گاڑھا اور بھاری مقدار میں، بار بار پیشاب کرنے کی
حاجت، پیشاب میں صفرا اور شکر، پیشاب کا رنگ سیاہی مائل۔
جلد نرم دار اور زرد، یرقانی۔

طاقت ۱۔ درجہ ۲ طاقت تک عام طور پر مستقل ہے۔

DIOSCOREA

ڈاٹسکوسیا

تخصوصی علامات

۱۔ درد تو لہج جو آگے کی طرف بھجنے سے اور لیٹنے سے بڑھ جاتے۔

عام استعمال

درد تو لہج میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ احتلام اور
لبہری میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ چیزوں کے نام غلط سہل
لیتا ہے۔

سر کی دونوں کن پٹیوں میں تیز کاٹنے والے درد، دبانے سے اس
میں آفاقہ ہو مگر بعد میں پھرتیزی اختیار کر جاتے۔ سر میں آوازوں کا آنا۔
معدہ سے بدبو دار گیس کے ڈکاروں کا آنا، معدہ کا درد، معدہ میں
نیچے کی طرف دباؤ کا احساس، پچھاتی کے درمیان درد، جو کہ بازوؤں
تک پہنچتا ہو، کھٹی اور کڑوی ڈکاروں کا آنا اور ساتھ ہی کھکی، فم معدہ میں
شدید درد جو کہ کھڑا ہونے سے آفاقہ پائے۔

پریت میں درد جو اچانک ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ پیٹ سے چل کر جسم کے دوسرے اعضا میں نمودار ہوا اور
 ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے پنجے تک جاتا ہو، پیٹ میں گرد گرد پیٹ
 پیٹ سے ہوا کا اخراج، مروڑ اور معدہ دامعاری میں وقفہ وقفہ سے
 آنے والا درد، تو لہج جس میں چلنے سے افاتہ ہو۔ درد پیٹ سے چل کر
 کمر چھاتی اور بازوؤں تک پہنچتا ہے، جو کہ آگے بھگنے اور لیٹنے
 سے شدت اختیار کرتا ہے۔ پتہ کا درد، جگر کے مقام پر شدید درد
 جو کہ پستانوں تک پہنچتا ہو۔ پتہ سے درد شروع ہو کر چھاتی تک
 پہنچتا ہو، کمر اور بازوؤں تک جاتا ہو، گرد و دل کا درد جو کہ ٹانگوں اور
 بازوؤں تک جاتا ہو۔

لبواسیر جس کے ساتھ جگر میں بھی شدید درد ہو، لبواسیر کے متے جو
 انگوڑے گچھوں کی طرح ہوں اور پاخانہ کے بعد مقعد سے باہر نکل آئیں
 اور ساتھ ہی مقعد میں درد ہو، اسہال جو کہ صبح کے وقت شدت اختیار
 کریں، اسہال زرد جن کے بعد شدید کمزوری لاحق ہو، گرم سیخ اور گرم
 پاخانہ کا اخراج۔

دل میں درد، چھاتی کے پچھلی طرف درد جو کمر تک پہنچتا ہو اور
 بازوؤں تک جاتا ہو، سانس کی تنگی سے آئے، دل کمزور ہو، خاص طور
 پر دل پر ہوا کے زور کے باعث اور ساتھ چھاتی میں درد۔

مردانہ اعضاء تناسل ڈھیلے، مقعد اور گرد و دل سے درد شروع ہو کر
 خصیوں تک بھائے، نلوں اور خصیوں پر تیز بوزار پسینہ، منی کا حالت
 خواب میں خارج ہو جانا، گھٹنوں میں شدید درد۔

مستورات میں رحم کے اندر درد، رحم سے درد شروع ہو کر دوسرے

اعضائیں جائیں، خوابوں کا آنا۔

تمام چھاتی پر گھٹن اور دباؤ کا احساس، خاص طور پر بھکنے کی صورت میں اور سانس لیتے وقت ایسا محسوس ہو کہ سینہ پھوٹتا نہیں، سانس چھوٹا چھوٹا آتا ہے۔

کمر کے اندر درد اور لٹکھڑانا، جو کہ بھکنے سے زیادہ شدت اختیار کرے، نشتوں اور پٹھوں کا درد جو کہ راتوں تک پہنچتا ہو اور دائیں طرف شدت سے ہو اور آرام کی صورت میں تکلیف پاتا ہو۔
ناخن بھرے، ماتھے کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں میں تشنج زیادتی :- شام کو، رات کے وقت، ایٹنے سے، آگے کی طرف بھکنے سے۔

کسی :- سیدھا کھڑا ہونے سے، کھلی ہوا میں پھرنے سے، دباؤ سے۔

مصلح :- کیموٹا، کیمفر،

طاقت :- مدرٹنکچر یا ۳x زیادہ تر متعل ہے۔

DROSER

ڈروسرا

خصوصی علامات

- ۱۔ کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے کے بعد، آدھی رات کے بعد ہو۔
- ۲۔ کال کھانسی
- ۳۔ حنجرہ کی سل جو کال کھانسی کے بعد ہوتی ہو۔
- ۴۔ نوجوانوں کی سل میں شب کی کھانسی کے ہمراہ خونی یا سیال بلغم آتی ہو۔

عام استعمال

ڈروسرا کال کھانسی کی مخصوص ترین دوا ہے۔ اس کے باسے میں
 "نیمین اپنے" میٹر یا میڈیکا پیوڈا میں رقم طرازہ میں :
 "اس دوا کی ۳۰ طاقت کی صرف ایک ہی خوراک دہائی کال
 کھانسی کے لئے شفا کے عمل کی ضمانت ہوتی ہے۔ سات یا آٹھ
 روز میں مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پہلی خوراک کے فوراً
 بعد دوسری خوراک ہرگز نہ دیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ
 پہلی خوراک کے عمل میں رخنہ پڑے گا بلکہ دوسری خوراک
 الٹی مضر بھی ثابت ہوگی۔"
 کال کھانسی کے علاوہ یہ دوا خسروہ، براؤن کائی ٹس، رسانس کی نالی کی

اندرونی مہتیوں کی سوزش) سے پیدا شدہ کھانسی، تشنہ کی کھانسی، حنجرہ کی نل، سل ریوی وغیرہ میں بھی مفید و مستعمل ہے۔
 سل کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا درنچک کی صورت میں چارہ سے ہمیں نظر
 ایک چوبیس گھنٹوں میں دینا مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بے خیال کا شکار ہوتا ہے، جب کتاب پڑھتا ہے
 تو کسیوں سے ایک مضمون کی طرف راغب نہیں رہتا، کبھی ایک کبھی
 دوسرا دیکھتا جائے، حیران اور احمق نظر آتا ہے۔ حافظہ خراب ہوتا ہے۔
 کھل ہوا میں چلنے سے سر پکڑائے، آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونا
 دشوار ہوا جیسے پیچھے کی جانب گر پڑے گا۔
 آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں یا سکڑی ہوئی ہوں، بائیں آنکھ کے ٹیٹے
 کے نیچے جلن اور جھپکن ہو۔

چہرہ گرم اور سرخ، پھولا ہوا اور نفق، چہرہ گرم اور ماتھور ہو۔
 منہ چھوٹا گول، زبان کے درمیان بلا درد سوجن ہو، زبان کے نیچے کھجلی
 ہوتی ہو۔ بائیں رخسار میں ایسا محسوس ہو جیسے سرخ مرچ کھا لی ہوئی ہو،
 شوک پانی کی طرح بہت زیادہ۔

حلق میں خراش اور کھردرا پن، تالو اور حلق میں خشکی کا احساس ہو
 جس کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جائے۔

جی متلائے، تیزابی اشیا سے نفرت اور تعصان ہو، مریض غذاؤں
 سے جی خراب ہو، آدھی رات سے لے کر صبح تک تکلیف زیادہ ہوتی رہے

خدا کے بعد پیٹ درد کرتا ہو۔

پاخانے نرم، سیال، سفید مٹیالے پانی کی طرح بغیر بو کے، پیشاب بغیر بو کے ہو، پاخانہ کے بعد بھی لگاتار پاخانے کی حاجت ہے۔

پیشاب کے لئے بار بار زور لگانا پڑے، پیشاب تھوڑی مقدار میں آئے، متواتر ایک ایک قطرہ ہو کر یا بار بار زیادہ مقدار میں پیشاب آتا ہو۔

تشنگی کھانسی خشک کالی کھانسی کی طرح، دوسے ایک دوسرے کے بعد بہت جلدی جلدی آتے ہوں، مشکل سے سانس لے سکے۔ دم گھٹتا ہو، کھانسی بہت کمزوری اور گہری، اودھی رات کو زیادہ ہو، زرد بلغم خارج ہو، نکسیر پھوٹے اور منہ سے خون آئے، جی منٹلائے، آواز بھاری اور گہری ہو، گلا بیٹھ گیا ہو، سپوزشس حنجرہ، تالو اور حلقوم میں کھردراہٹ اور پھیل جانے کا احساس ہو۔ حنجرہ میں کوئی شے رینگتی ہوئی محسوس ہو جس کے باعث کھانسی شریع ہو جائے۔ معلوم ہو کہ حلق میں کوئی نرم شے رکھی ہے، کھانسی شب کو ہو۔ شام کو فوراً لیٹنے پر، دو بجے صبح کو مریض جاگ پڑے، کھانسی کے ہمراہ سیال یا خون بلغم آتی ہو حنجرہ کی سل کے ہمراہ کمزوری بہت ہو۔ حلق خشک ہو۔ آواز بھاری ہو، زرد لگا کر بات کر سکے۔ جب بات کرے تو دم کشی کی شکایت ہو جب کوئی نقطہ نکلے تو حلق سکڑ جاتا ہو، سینہ کے عضلات میں چپکن ہو جسے دبائے سے آرام آتا ہو۔

کولہے اور جگہ سے کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہو، پاؤں کے جوڑ سخت ہوں۔

تمام باز و مفلوج اور بستر سخت معلوم ہو۔

جلد میں کھلبلی اور چھین کی سی شکایت ہو جسے کھلبلی سے اٹنے سے یا سہلانے سے آرام محسوس ہو۔ خسرہ کی طرح کے ابھار نکل آئیں ابھار کے ساتھ درد ہو اور ڈنکائے کی تکلیف ہوتی ہو۔

مریض کو متواتر جمائیاں آتی ہوں، نیند سے بار بار چونک پڑتا ہو، بخوابی ہو۔

بخار میں جسم کے اندر کپکپی ہو، چہرہ کی گرمی کے ہمراہ کپکپی، ہاتھ سرد ہوں اور پیاس نہ ہو، بستر میں بھی سرخی محسوس ہوتی ہو۔

زیادتی :- آدھی رات کے بعد لیٹنے پر، بستر میں گرم ہونے پر، پانی پینے سے، گانے سے اور سننے سے۔

کمی :- جھکنے سے، سر کو ہاتھوں پر رکھنے سے، چھونے سے،

معاون :- نکس و امیکا، کلکیر یا کارب، نیفالیئم، وریٹھرا البم،

پلسا ٹیلا۔

مصلح :- کیمفر

طاقت :- بالعموم $1 \times$ یا $2 \times$ سادہ کھانسی میں مستعمل ہے اور کالی

کھانسی میں ۳۰ طاقت کی صرف ایک خوراک۔

خصوصی علامات

- ۱- پیشاب کی تراوش کا بند ہو جانا، ٹنڈے پانی میں نشگے پاؤں گھومنے سے۔
- ۲- پیشاب اندر خود نکل جائے، پیشاب پر قابو نہ ہو۔
- ۳- موسم درجہ حرارت کی یکدم تبدیلی سے لاحق ہونے والی یا شدت اختیار کرنے والی تکالیف۔

عام استعمال

موسم کی تبدیلی سے جسم کو لاحق ہونے والے عوارض، چھپکائی اور نار فامی، اسہال، نزلہ، موسم خزاں کے عوارض، دواؤں مزین عضلاتی بالائی کے درد، قولنج، بولڑیوں کی کھانسی، پارہ کی وجہ سے نفوٹ کثرت آنا، کثرت شہوت، پیسیہ پڑوں کے منفلون ہو جانے کا خوف، گردوں کے درد جو سرخ بننا، ملیریا یا کسی اور شدید مرض کے بعد ہو گئے ہوں، مریض کو سردی لگ جاتی ہو، سردی لگ جانے کی وجہ سے مزین پیشیں وغیرہ عوارض اس دوا کے ذریعہ آتے ہیں۔

عمومی علامات

زہنی طور پر مریض جھگڑالو ہوتا ہے اور غصہ کے بغیر بھی دوسروں کو لعنت علامت کرتا رہتا ہے۔

سر میں پراگندگی ہو، گردن کے سر سے اوپر کی جانب پھیلی طرف درد ہو، درد سر، سر کے پچھلے حصہ میں کپکپی اور دکھن ہو، سرد موسم میں کھوپری میں داد ہو، سر گنجا ہو، موٹے زرد پھلکے اتریں، کھجلائے پر خون خارج ہو۔

سردی ہر دفعہ جب آنکھوں میں لگ جاتے تو آنکھوں میں ٹھہر جاتے، گاڑھی زرد رطوبت خارج ہوتی ہو، پیوٹے دندانہ دار اور بنجار میں پانی کی مانند رطوبت خارج ہو، کھل ہوا میں شدت ہو، پتیلیں بہت پھیلی ہوئی ہوں۔

کانوں میں درد ہو، کانوں میں شور و غل، چیمبن اور سوزش ہو، کان کے اندر سے رطوبت نکلتی ہو۔

مکھیر بھو پتی ہو، گرم اور عاف خون خارج ہوا تاک کے اوپر بوجھ عسوس ہو۔ منہ سے لیس دار قندک مابون کی طرح آتا ہو، زبان خشک اور کھردری ہو، حلق میں کھردرین اور خواشش ہو، حلق میں بلغم بہت ہو، سردی کے باعث دم بوزمین۔

منہ کا فائقہ کڑوا، سفید لیس دار رطوبت کی تہ ہو، سردی لگنے سے قویج ہو، ناف کے قریب کاٹنے والے درد ہوتے ہوں۔
پاخانے سفید، پیلے، سبزی مائل، میالے پانی کی طرح، شب کو

زیادہ، ترموسم میں ان کی کیفیت میں رد و بدل ہوتا ہے، دست سفید، پیلے، سبز کھٹی بو والے آتے ہوں۔

سردی لگنے کی وجہ سے پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کتے وقت درد، پیشاب کے نیچے گاڑھی تھچھٹ کا جم جانا، ننگے پاؤں سردی میں چلنے سے پیشاب کا بار بار آنا یا بند ہو جانا۔

سردی کی وجہ سے حسیں یا درودھ آنا بند ہو جائے، وقت حیض کے ساتھ تمام بدن پر ابھار نکل آتیں، پستان دکھتے ہوں۔

سردی لگنے کی وجہ سے سانس وقت سے آتا ہوا اور بھگم جمع ہو جاتے۔

گردن اکڑی ہوئی، سردی لگ جانے سے کمر میں یا رانوں میں یا پنڈلیوں کی ہڈیوں میں درد، ہاتھوں پر مسے ہوں، شدید جلدی ابھار کے بعد مفاصلی علامات نمودار ہوں۔

جلد گرم اور خشک ہو، نبل، گردن یا جبکہ سہ میں گرہیں پڑ گئی ہوں۔ کھلی ہمیشہ سرد و ترموسم میں زیادہ ہو، پھنسیاں، آبلہ دارا جھانچھپاکی مٹے۔

زیادتی :- شب کو سونے سے، سرد ہوا سے، تراور سرد موسم میں، موسم وقتاً سرد ہو جانے سے، لیٹنے سے اور پھراٹھ کھڑے ہونے سے۔ کبھی :- نشست سے اٹھنے پر، حرکت سے، گرم خشک موسم میں چلنے پھرنے سے، گرم ہوا سے۔

معادف :- براؤٹا کارب۔

مصلح :- کمیفر، اپیکاک، کیوریم، مرکوریس۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ۔

DIGITALIS

ڈیجیٹلس

خصوصی علامات

- ۱۔ احساس جیسے ذرا سی حرکت نہ کئے پھر قلب کی دھڑکن بند ہو جائے گی (کوکین)
- ۲۔ نبض بھری ہوئی، بے قاعدہ بہت مدھم اور کمزور، ہر تیسری یا چوتھی یا ساتویں ضرب جھپٹاؤں سے ۔
- ۳۔ جسم کی جلد نیلی ۔

عام استعمال

اس دوا کا خاص اثر پہلے دورانِ خونِ پیادہ بعد ازاں دوسرے اعضا پر ہوتا ہے ۔ دل کے عوارض میں خاص طور پر مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

فردنی طور پر مرینس جی نہ کر مند اور شورش کا مارا ہوتا ہے غصہ کر
شام کے وقت لا پرواہی بات چیت کرنے کو توجہ دیتا ہے ۔
سر میں جھکڑ اور کسکپی ، کن پٹی اور پیشانی میں کوئی ننہل کر چکنے

سے ملتے کے بائیں طرف ٹھیس ہو، بائیں کن پٹی میں چمک ہو، دہانے
 ابرو میں جلن کے ساتھ درد، نگاہ دھندلی جیسے آگے کوئی پردہ ہے۔
 آنکھوں کے ڈبیلوں میں ٹھیس ہو، بہت زیادہ آنسو بہتے ہوں تیز
 روشنی سے اور زیادہ ہوں، پپوٹے آپس میں چمٹ جائیں اور کیچڑ
 بہت نکلے، چیزیں سبز یا زرد نظر آئیں۔

چہرہ زرد، ہونٹ اور پپوٹے پلے، منہ میں خشکی، میٹھی اور بدبودار
 مال، رال ایسی نکلے کہ زبان اور مسوڑھوں کو پھیل دے، زبان نیگول،
 ذائقہ کڑوا، جھوک بالکل نثار۔

متلی، تپنے کرنے کو طبیعت چاہے، بار بار ابکان، صبح کو بھگتی تپے
 آئے، غذا تپے میں نکل جائے، معدہ میں بہت کمزوری محسوس ہو، پیٹ
 میں گرانی، جلن اور مروڑ۔

پاخانہ سفید، کھڑیا یا رکھ کے مانند، تپنے دست آؤں ملے،
 پانی کا دست، یرقان کے عارضہ میں دست آئیں۔

پیشاب رک جائے، پیشاب کی تکلیف ہو، شاذ کی گردن پر
 درم ہو۔

کھانسی میں خون آئے، پھیپھڑوں سے بغم خون ملا ہوا نکلے،
 چلنے میں سانس بھروسے، ذرا سی حرکت سے دل دھڑکنے لگے، ایسا معلوم
 ہو کہ دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ دل کی حرکت زیادہ ہو جائے۔ دل کے
 اطراف میں کوچن۔

خصیوں کا درم، خواہش جماع بہت زیادہ اور استادگی اور
 احتلام ہو۔

رات کو دابنا لٹا تھ مع انگلیوں کے سوچ جائے اور تین گھنٹہ سوچن
ہے، گھٹنے میں پانی اترا آئے، نیچے کے دھڑ میں بہت کمزوری معلوم ہو
پیر کی سوچن رات کو کم ہو جائے۔

رات کو نیند خراب، خوابوں کی وجہ سے اچٹ جائے، یہ خواب
دیکھے کہ ادنیٰ سے پانی میں گر ٹپا ہے اور چونک کر جاگ پڑے۔
نہض سست اور بے قاعدہ، اندر سردی اور ارد گرمی یا اور پری
اندر گرمی، پسینہ بکثرت آئے اور آرام نہ ملے۔

زیادتی :- درد سر بڑھ جائے، لیٹنے سے، گرم کمرہ میں بیٹھنے سے،
خاص کر سید سے بیٹھنے سے، کھانے سے گانے سے۔
کسی :- خالی معدہ ہونے سے، کھلی ہوا میں۔

معاون :- سیلا ڈونا، براڈیونیا، کیو ملا، لائیو پوریم، نکس و امیکا،
اپیم، فاسفورس، پساٹیل، سیپیا، سلفر اور وریٹرم ایسم۔
مصلح :- ایس، کلکیریا، کیفیر، نکس و امیکا، اپیم۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳ طاقت تک۔

(نوٹ :- ڈوکی ٹیلیس کے بعد کونین یا چائیا اس کا کوئی مرکب ہرگز نہ
دینا چاہیے، بچہ مضر ثابت ہو سکتا ہے۔)

خصوصی علامات

- ۱۔ بے چینی حد سے زیادہ
- ۲۔ بچہ نوک الحسی کھلی ہوا سے
- ۳۔ درد سر، بیہوشی، شراب کے استعمال سے
- ۴۔ زبان خشک جس کی نوک سرخ مثلث سے مشابہ ہو۔
- ۵۔ دست محرقہ کے آغاز کے ساتھ، از خود سخت کمزوری کے ساتھ۔
- ۶۔ زہر باد بائیں سے دائیں کو آبلے کا سا۔

عام استعمال

یہ دوا وجع المفاصل کے مزاج والوں کے لئے زیادہ موزوں ہے،
 تڑپ جانے کی وجہ سے خالص گرمی کے بعد تڑپ جانے سے لاحق ہونے
 والی تبکالیف کے لئے مستعمل ہے نیز تبکالیف جو کہ مورچ سے یا
 کسی ایک عضو کو زور دینے کی وجہ سے مثلاً کسی چیز کو زیادہ دیر
 اٹھانے سے یا زیادہ زور آزمائی سے پیٹھ ٹپٹھ جانے کے لئے بھی نافع ہے۔
 مدارہ بریں ٹائیفائیڈ اور دیگر بخاروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض بیدار ہے چہن ہو تا ہے، مگر اندر پہلو بدلتا ہے،
شام کو متغیر ہونا، رات کی طرف میلان، طبیعت خاص کر شام کو تنہائی
کی خواہش۔

کھڑے ہونے پر یا چلتے ہوئے سر میں چکر لٹنے پسندیدہ ہو، چلنے
میں تھکھرائے جو فالج کا نتیجہ ہو۔ تپ سیپ بھرے ہوئے دانے سر پر جس پر
پیشی پڑی ہوتی ہو۔ بال گرتے جائیں۔ بدبودار کھلی رات کو ہو۔
آنکھ میں جلن، کھجلی، درد اور سرخی، پانی بہنا، بعض دفعہ پوپٹ
جاری یا مفلوج ہو جائیں جس کے باعث کھل نہ سکیں (جلسی میم،
یو پیٹوریم)

چہرہ پسند ہر باد کے چھالے جن میں جلن اور درد ہو۔
دانتوں اور مسوڑھوں میں درد، ٹھنڈا مٹھ گانے سے آرام ہو پانی
پینے کے باوجود منہ خشک، زبان سرخ اور چٹنی ہوئی، زبان کی نوک مثلث
کی شکل میں سرخ ہو، جبڑوں میں تشنج، ہر بار چلانے پر جیڑا آواز سے
پاخانہ پتلی سرخ آؤں والا پانی کا سا، کبھی آؤں خون آمیز ہو، ممبر
میں کھجلی اور جلن (بادی بوا سیر)
خون ملا پیشاب قطرہ قطرہ ہو، برف کے مانند سفید تلچٹ نیچے
بیٹھ جائے۔

بارش میں بیگ جانے سے رحم کے نعل میں بگاڑ، کونڈا وزن وغیرہ
اٹھانے سے استقامت مل اور خروج رحم ہو۔

خشک کھانسی شام سے آدھی رات تک اور صبح جاگنے پر زیادہ
گردن اور پیٹھ کی جھکڑن، چلنے سے کم ہو، منہ چلانے میں دونوں شانہ
کے بیچ میں درد ہو۔

عضلاتی بائی کے درد، عرق النسا، بائیں جانب (کالوسنتھ) درد بائیں
بازو میں، قلبی تکلیفات کے ساتھ۔

حاد بیماریاں محرکہ کی صورت اختیار کر لیں۔

دست محرکہ کے آغاز کے ساتھ از خود سخت کمزور ہونے کے ساتھ،
دورانِ پافانہ ٹانگوں کے پچھلے حصہ میں اور پر سے نیچے تک پھارنے
والے درد۔

فالج ماؤفہ حصص میں سن ہونے کے ساتھ، مرطوب جگہ پر لیٹے
بہنے کے بعد، بجلی جانے سے، وضع حمل، کثرتِ جماع، نوبتی بخار
تپِ محرکہ کے بعد، اعضار کا فالج، پیوٹوں کا فالج۔

زہر باد بائیں سے دائیں کو، آبلے، زرد آبلے، بے حد متورم، جلن
خارش، ڈنک لگنے کے سے درد۔

زیادتی :- طوفان سے قبل، سرد موسم میں، رات کو، خاص کر
آدھی رات کو، سرد چیزوں سے۔

کسمی :- گرمی سے، گرم خشک موسم میں، دھک لینے سے، گرم چیز
سے، دست آنے سے، پہلو بدلنے سے، ماؤفہ عضو کو جانے سے
معاون :- برائیوینا

مصلح :- بیلادونا، برائیوینا، کیمفر، سلفر، کانیا

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک نیز ۲۰ طاقت بھی مستقل ہے

خصوصی علامات

- ۱۔ آنکھیں جلیں، درد کریں اور تھکی ہوئی محسوس ہوں، گرم مثل انگاروں کے۔
- ۲۔ کانچے نکلے فوراً پانخانہ کرنے پر۔
- ۳۔ شانہ پر پیشاب کرنے کے بعد بھی بوجھ قائم ہے۔

عام استعمال

یہ دوا آنکھوں کے عوارض نظر کی کمزوری وغیرہ کے علاوہ ہڈیوں، جوڑوں، رحم، مثانہ اور مقعد کے بعض عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

سر میں کسی چیز کے چبھ جانے کی طرح درد ہو، شراب خوری کے بعد درد اٹھے، ہڈیوں میں دھکن ہو۔
 نظر کا زیادہ استعمال کرنے سے بصارت کمزور ہو جائے، پڑھنے سے آنکھوں میں تھکن ہو، ڈھیلے درد کریں۔ آنکھیں بو جھیل اور جلن واد۔
 معدہ میں توہنج کا سادرد ہو، سپرں میں گرم شکم جس کے سافد ترنج اورتے ہو، مقعد پر اس دوا کا خاص اثر ہوتا ہے۔ ناقابلِ جراحی ماسود جو مقعد کے اندر ہوں، اس دوا کے استعمال سے اچھے ہو جاتے ہیں،

پاخانہ مشکل سے خارج ہو، بعد وضع حمل پاخانہ کرنے پر کاسٹک بکس،
قبض ہو یا آؤں آمیز اسہال آئیں، جھکنے سے خروج مقعد ہو۔
رحم سے جریان خون جس کے ساتھ علامات سر اور باڈی گولہ کے
دوسے ہوں۔

زیادتی :- لیٹنے سے، ٹھنڈک اور تر موسم میں
معاون :- کلکی یا فاس -
مصلح :- کیمفندر

طاقت :- پہل طاقت سے ۶ طاقت تک نیز ۳۰ طاقت مستقل ہے۔

RHODODENDRON

روڈوڈینڈرون

خصوصی علامات

- ۱۔ اعصاب ازاد جو آندھی اور طوفان سے خوف زدہ ہو جاتیں۔
- ۲۔ وائٹ کا درد جس میں زیادتی موسم کی تبدیلی سے، آندھی گرج سے
یا ہوا وار موسم میں ہو۔
- ۳۔ مختلف اعضاء میں پھاٹنے والے، کھینچنے والے ابلی کے درد جن میں
زیادتی آرام کے وقت، مہرطوب ٹھنڈے موسم میں اور ہوا وار موسم
میں ہو اور سٹاکس

عام استعمال

وجع المفاصل کی قسم کے درد خصوصاً عصبی مزاج افراد میں ہوں تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ نقرس بھی نافع ہے، وجع المفاصل اور سوزاک کے باعث ورم خصیہ اور سوزش خصیہ میں جبکہ خبیث کچلے جانے کا احساس ہو، یہ دوا کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایسے مفصلی دردوں میں خاص طور پر مفید ثابت ہوتا ہے جو آرام کرنے اور طوفان کی آمد سے پہلے شدت اختیار کر لیتے ہیں لیکن طوفان کے بعد انہیں سکون ہو جاتا ہے۔

عمومی علامات

سر میں شدید درد بالخصوص بائیں کنچی میں، درد بدحواس کرے آنکھوں میں یا کانوں میں عضلاتی کمزوری، آنکھ کے ڈھیلے میں درد ہو۔ کانوں میں گھنٹی سی سبکتی ہو، کانوں میں آواز کم سنائی دے۔

چہرہ میں عصبی درد ہو، دانت کے عصب مارف ہوں اور شدید درد ہو، مرطوب موسم میں دانت کا درد۔

صبح دشام خشک کھانسی، چھاتی میں ہلکا درد ورم و سوزش خصیہ، اینٹیٹھن جو رات کو پیڑزک اور نیچے ران تک پہنچ جائے۔

تمام جوڑ متروک ہوں، نقرسی اور مفصلی درد ہو۔
زیادتی :- طوفان یا آندھی سے پہلے، مرطوب موسم میں رات

اور صبح کے وقت -

کسمی :- طوفان کے بعد، گرمی پہنچانے یا کچھ کھانے سے
طاقت :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک نیز ۲۰ طاقت تک
مستعمل ہے -

RATANHIA

رینٹھیا

خصوصی علامات

- ۱- حمل کے ابتدائی مہینوں میں دانت کا شدید درد جو لیٹنے سے
بڑھ جاتے -
- ۲- تبض جس میں اجابت کے لئے بہت ہی زور لگانا پڑے اور
مقعد میں جلن ہو - (سلفر) -
- ۳- مقعد میں شقاق ہوں یعنی مقعد کٹی پٹی -
- ۴- مقعد میں تکلیف جیسے ریاں کا نیچے کے کھڑے پڑے ہوں -

عام استعمال

خاص طور پر بواسیر میں حسب علامات مستعمل ہے۔ علاوہ بری نہ کوڑ
ایل دیگر تکالیف میں بھی کارآمد ہے -

عمومی علامات

ہا کے ابتدائی ایام میں دانت میں شدید درد ہو، دانت لمبا معلوم ہوا لیٹنے سے درد زیادہ ہو، مریضہ اٹھ کر چلنے پھرنے پر مجبور ہو جائے تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

تبعض جس میں پاخانہ بہت سخت آتا ہوا اور کونقنا بہت پڑتا ہو بواسیر سے باہر نکل آتے ہوں اور مقعد میں جلن اور درد بہت دیر تک رہے (سلفر) انتریاں ہے جس ہر جاتی ہوں پاخانہ آنے کے بعد ایسے درد ہوں گویا شیشے کے ٹکڑے مقعد و مبرز میں چبھ رہے ہیں۔ پاخانہ جانے کے گھنٹوں بعد تک جلن و کونقن بنی رہتی ہو اور درد بھی پیچانہ چھوٹے تو یہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔

مقعد کے چبھ جانے کے لئے بھی یہ ایک مفید دوا ہے جب کہ مبرز نرکا لمس ہو، و دودھ پلانے والی عورتوں کی بھٹنی بھٹ جائے تو اس کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوا ہے (گریفائیٹس، سیپیا) شدید ہچکی میں بھی یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

اس دوا درد ٹینکڑ کی سریم کئی ایک امراض مقعد میں خارجی طور پر لگانا مفید ہوتا ہے۔

زیادتی :- کھل ہوا میں چلنے سے رات کے وقت طاقت ۳ طاقت سے ۲ طاقت تک عام طور پر متعل ہے۔

RANUNCULUS BULB

رینن کولس بلب

خصوصی علامات

- ۱۔ شراب نوشی کے نتائج بد
- ۲۔ سینہ کی دیواروں میں اعصابی، مغز استخاں کے یا بال کے سوزیاں
چھبنے کے سے، تیز اور گول گٹنے کے سے درد۔
- ۳۔ پلیوریسی یا نمونیا گرم سرد ہو جانے کی وجہ سے (ایکونائٹ)
آرنیکا
- ۴۔ سینہ کی پلیوریوں کے درمیان گوشت میں بال کے درد، سینہ
میں پھوٹے کا سارو، چوٹ کا سارو، جس کی زیادتی چھوٹے
حرکت سے یا جسم کو موٹنے سے ہو (براٹونیا)

عام استعمال

سینہ اور سپیریوں کے درد میں عام طور پر مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

اس دوا کا اثر گوشت کے ریشہ جات، جلد اور سینہ کی دیواروں
پر ہوتا ہے۔ شراب نوشی سے پیدا شدہ خرابیوں کو دور کرتا ہے۔
دن میں آنکھوں سے مکھائی نہ مٹے، آنکھوں کے سامنے دھواں سا

معلوم ہوا، دانہ آنکھ پر درد، روشنی برداشت نہ ہو سکے، آنسو بہیں
 مختلف قسم کے درد اور دکھن، سینہ کی بیچ کی ہڈی و جنسی ہول
 محسوس ہو، پسلیوں کے بیچ کے گوشت میں درد، سینہ میں شانوں
 کے بیچ میں کوسچن، سانس لینے میں، حرکت کرنے سے زیادہ ہو،
 سینہ میں بائ کا درد۔

جلد میں کھجلی، جلن، دانے، نیگیوں آبلے، ہتھیلیوں میں کھجلی۔
 زیادتی :- حرکت سے، چھوٹنے سے، مرطوب اور طوفانی موسم
 سے، کھل ہوا میں، شام کے وقت۔

کسی :- آرام کرنے سے

مصالح :- اناکارڈیم، براڈینیا، کیفیر، کلیمٹیس، کروٹن برگ، پیٹیل،
 رشکس۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

RUMEX

ریو میکس

خصوصی علامات

- ۱۔ کھل ہوا سے بے حد ذکی احساس
- ۲۔ خشک مسلسل اور تنکائیے دانے سانس جس میں زیادتی ہوا یا مکان
 کی تبدیلی سے ہو۔

۳۔ خشک مسلسل اور تھکا دینے والی کھانسی جس میں زیادتی ٹھنڈی ہوا میں ذرا سانس لینے سے ہو۔ مریض اپنے سر کو بستر میں چھپا لیتا ہے، تاکہ ہوا کو گرم کر سکے۔

۴۔ جلد کے مختلف حصص میں خارش، جب کپڑے اتارتا ہو جسم تنگ کرتا ہو یا ٹھنڈی ہوا لگے۔

عام استعمال

یہ دوا سلی مزاج و امون کو موزوں تر ہوا کرتی ہے جن کو ٹھنڈی ہوا موافق نہ آتی ہو۔ حلق میں خارش سے پیدا شدہ کھانسی نیز ایسی کھانسی جو حلق کو ذرا سا چھوڑنے سے آتے نیز ہوا کی خفیف ٹھنڈک بھی کھانسی پیدا کرنے کا موجب ہو تو یہ دوا کارآمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

زبان کے کنارے دیکھیں، زبان پر میلی، نرم معدہ پر کوئی سخت چیز کھی ہوئی محسوس ہو۔ ہچکیاں، متلی، گوشت کھانے سے بہت ڈکائی اور کھجلی۔

کھانسی، ناک اور ہوا کی نالی سے بلغم نکلے، ٹھنڈی سانس اندہ جانے سے کھانسی زیادہ ہو، تپلا بلغم کثرت سے نکلے۔

پانچانہ جھورا، تپلا، صبح کا اسہال، بستر پر سے پانچانہ کے لئے جھاگ پڑے۔

بلد پر بہت زیادہ کھجلی، خامس کر نیچے کے دھڑ میں جو کہ پڑا آسانے

سے زیادہ ہو۔
 زیادتی :- شام کے وقت، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے، کپڑے
 اتارنے سے۔

کھی :- گرم ماحول میں، بستر میں منہ سر ڈھانپنے سے۔
 مصلح :- بلیا ڈونا، کیمفر، کونیم، فاسفورس، ہیوسمس، لیکے کس۔
 طاقت :- ۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

RHEUM

ریوٹم

نخصوصی علامات

- ۱۔ بچہ کے تمام جسم سے کھٹی بو جو نہلانے کے بعد بھی قائم ہے۔
- ۲۔ دردِ شکم، ہر کھٹے دست کے ساتھ۔

عام استعمال

یہ دوا بچوں کے امراض میں خاص طور پر کام آتی ہے جبکہ وہ دانت
 نکال رہے ہوں، بچوں کو دست آتے ہوں ساتھ ہی سرور اور دردِ شکم
 کی شکایات لاحق ہوں تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

بچہ کو کھٹی بو والے پانخانے آئیں، سچے بے صبر اور پر جوش ہوا کئی چیزوں کے لئے ضد کرے اور روتے، چہرے پر پسینہ، دال کی زیادتی، پیٹ میں توہنجی درد، ریاچ سینہ کی طرف بڑھیں، مختلف چیزوں کی خواہش کرے مگر پھر کھانے نہ جاسکیں۔ پانخانہ کے قبل توہنجی درد، پانخانہ کے بعد پیٹرو میں کلٹنے کا سادرد۔

زیادتی :- کھانا کھانے کے بعد، حرکت کرنے سے، کپڑا اتارنے سے، رات کے وقت، صبح سونے کے بعد، کپڑا اتارنے سے، سردی سے، پانخانے سے پہلے، دوران میں اور بعد میں۔

کسی :- کپڑے پٹینے سے، گرمی سے۔

معاویہ :- میگنیشیا کارب، اپیکاک۔

مصالح :- کیملفر، کیموٹا، کالٹن سونا، رشاکس، نکس و امیکا، پساٹیل۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

ZINGIBER

زنجبیر

خصوصی علامات

- ۱۔ معدہ کے عارضی اگر وہ تریبوز کھانے سے یا خراب پانی پینے سے ہوں
تیزابیت، ریلج کی زیادتی ۔
- ۲۔ دمہ جس میں بے چینی نہ ہو اور جس میں زیادتی صبح کے وقت ہو۔ خلق کے
پچھلے حصہ میں خواشیں ۔

عام استعمال

یہ دوا اضمہ بڑھانے کے لئے، مردمی کمزوری اور امراض تنفس میں مفید ہے۔

عمومی علامات

نصف سر کا درد، سر میں الجھن اور خالی پن معلوم ہو، جنوں پر درد ۔
ناک خشک، ناقابل برواشت کھجلی ہو، سرخ مہاسے ناک پر ہوں ۔
کھانے کا ذائقہ دیر تک محسوس ہوتا ہے ۔ معدہ میں تیزابیت ۔ قوی
اسہال، گندا اور خراب پانی پینے سے اسہال، اس کے ساتھ نفخ اور کانٹے والا
درد، مزمن اسہال، مبرز سرخ اور سوچی ہوئی، بواسیر گرم، دکھیں اور در کریں ۔
بار بار پیشاب کی حاجت، پیشاب کے سوراخ میں جلن اور نیش زنی
کاسا اور، پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ پیشاب خارج ہو، ٹائیفاؤسما

کے بعد پیشاب بالکل بند ہو جائے ۔

خلق کے نیچے دھن، سانس لینے میں تکلیف، دماغ میں گھبراہٹ نہ ہو، صبح کو زیادتی، خلق میں خراش، کھانسی، صبح کو ہنغم نکلے ۔
مردوں میں پیار کی عمارت، خواہش نفسانی زیادہ، ایسا دل درد کے ساتھ، احتلام ۔

جوڑوں میں کمزوری، پیٹھ میں درد، ہتھیلی اور تلووں میں تشنگی۔
زیادتی :- چھوٹے سے، لیٹنے سے، حرکت سے، شام کو، رات کو، ٹنڈے مرطوب موسم میں، رگڑی سے، تہ بوز اور خربوش سے، غیر پانی سے ۔

کمی :- کیڑے آٹانے سے ۔
مصلح :- نیکس و امیکا ۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک ۔

زکرم مٹلیکیم

ZINCUM METALLICUM

خصوصی علامات

۱۔ قوت حیات کی کمی، دماغی یا اعصابی طاقت نہ ہو ۔

۲۔ پاؤں یا ٹانگوں میں رعشہ اور کانپنے کا مسلسل اور شدید احساس، ان کے مسلسل حرکت دے ۔

- ۳۔ حیف کا ادراہ شروع ہوتے ہی مریضہ اپنی نکیفوں میں کمی محسوس کئے۔
 ۴۔ سچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنہ درجہ چہرہ میں پلایا پن یا سفیدی کے ساتھ، گرمی نڈر۔
 ۵۔ کتے کی سی جھوک۔
 ۶۔ ریڑھ کی تھام لمبائی میں جلن جس میں بیٹھنے سے زیادتی ہو۔

عام استعمال

سچوں کے عوارض میں یہ دوا بالخصوص مفید ہے۔ نیز دماغی اور جسمانی کمزوری اور تشددگی میں بھی یہ دوا نافع ہے۔

عمومی علامات

حافظہ کمزور، بات چیت اور کام کا ج کوجی نہ چاہے، مستورات کے عوارض میں بقیاری اور گھبراہٹ۔

بائیں جانب سر گرنے کا احساس ہو، گدی میں درد اور کھوٹری میں بوجھ کا احساس ہو۔ پیشانی سرد ہو لیکن سر کا پینڈا گرم ہو۔

ناخونہ، موتیا بند، ضعف بصر، پوٹے گریں۔

ہونٹ زرد، منہ کے گوشے چھٹے ہوئے، چہرے کی ہڈیوں میں درد۔
 جھوک شدید لیکن کھانے سے تسکین نہ ہو، معدہ میں درد، نفخ، ریاحی
 ترش، پیٹ میں گڑبگڑ، جگر میں دکھن، جھکی، متلی اور صفراوی تے،
 پیشاب پیچھے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے آئے، ہسٹیریا کے ہاٹ
 پیشاب میں رکاوٹ، کسی قسم کی حرکت جسم سے پیشاب خارج ہو سخت

پاخانہ تھوڑا تھوڑا خارج ہو، بچوں کا مہیضہ، اسہال کی بندش سے سراسیمہ
و مانع عوارض ۔

نخعیہ متورم، اوپر کو کھینچے ہوئے، انتشار، احتلام، موٹے زہار گر
جائیں، نخعیۃ الرحم میں درد، حیض دیر سے آئے یا کم ہو۔ پستان متورم،
حرام مغز کی سوزش اور پاؤں کی بیتیاری ۔
سینہ میں کھچاؤٹ اور درد، کوڑی کے نیچے جلن درد اور شیریں اشیا
کھانے سے کھانسی میں زیادتی ۔

زیادتی :- حیض کے دوران، چھوٹے سے، شراب پینے سے، شام
کو یا صبح کے کھانے کے بعد ۔

کسی :- کھانا کھانے کے وقت اور طوبت کے اخراج سے ۔
معاون :- کلکیر یا فاس ۔

مخالف :- کیو میلدا، نکس دامیکا ۔

مصلح :- کیفر، ہیرسلف، انگیشیا ۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر

خصوصی علامات

- ۱۔ غدد مذی کے بٹھ جانے سے پیشاب کے اخراج میں رکاوٹ۔
- ۲۔ خواتین میں پستانوں کی نشوونما بہت کم رہ جائے خصیتہ الرحم بڑھے ہوئے ہوں اور چھوٹے سے درد کریں۔

عام استعمال

خواتین اور مردوں کے جنسی اعضاء کے غددوں کے عوارض کے علاوہ یہ دوا ضعفِ باہ اور عام جسمانی کمزوری میں بھی مفید ہے۔ قوتِ نشوونما میں مدد دیتی ہے اور جسمانی ساختوں کی تعمیر میں مدد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سرمہن بھرا محسوس ہوا، چکر درد سر کے ساتھ، کمزور مریضوں کو دوسر ہو، دردِ ناک کے کمرے کے بیچ تک۔
مردوں میں مذی کے غدد کی تکالیفِ مذی کا خالص ہونا، خصیوں کے بیٹھے سکڑ جاتیں اور قوتِ مردانگی کم ہو جائے۔ مباشرت میں درد ہوا اور اخراج جلد ہو۔

مستورات میں بیضیتہ الرحم میں درد، پستان سکڑے ہوئے، خواہش

جام بالکل غائب۔

پیشاب کرنے کی حاجت رات کو متواتر ہے، پیشاب بستر پر
خطا ہو جائے۔ مزمن سوزاک، پیشاب کرنے میں تکلیف ہو۔
ایکایاں آئیں، کھٹے ڈکار، سینہ میں جلن، دودھ پینے کی خواہش
بغیر بکثرت، نزلہ کے ساتھ، مزمن کھانسی۔

مصلح :- سلیشیا، پلسٹیل

طاقت :- مدرشکچرا سے ۲۰ قطرے تک ایک خوراک ہے،
علامہ بریں ۲ طاقت بھی متعل ہے۔

SARSAPARILLA

سار سا پرلا

خصوصی علامات

- ۱۔ پیشاب کے خاتمہ پر شدید اور قریب قریب ناقابل برداشت درد۔
- ۲۔ پیشاب خون آمیز، چھوٹی چھوٹی کنکریاں یا پتھری نکلنے مثانہ میں پتھر۔
- ۳۔ پیشاب مقدار میں کم، چھپا، جس میں چھوٹے چھوٹے تار ہوں، جس
میں ریت ہو، مقدار میں زیادہ، بغیر احساس کے نکل جائے۔
- ۴۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے جب مریض بیٹھا ہو۔
- ۵۔ خواتین میں پستانوں کی گھنٹیاں اندر دھنس جائیں۔

عام استعمال

درد گردہ اور سنگِ ثمانہ اور پیشاب کے مختلف عوارض میں اکثر استعمال ہے۔ علاوہ بریں خون کی خرابی سے پیدا شدہ جلدی امراض میں بھی بیحد مفید ہوتی ہے۔ نیز گھنٹھیا اور آتشک میں بھی استعمال ہے۔

عمومی علامات

مرد و یا بچوں کے پردوں میں دردوں کے لئے جبکہ ان کا باعث پارہ کا استعمال ہو یا آتشکی و سوزا کی مادہ ہو۔

آتشک میں پارہ کا بیجا استعمال کرنے کے باعث تمام جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں۔

خارش کی مانند خراش دار خشک پھنسیاں جو کہ موسم بہار میں عموماً اور کھلی ہوا میں لہنے سے نکل آیا کرتی ہیں اور پھر پیڑیاں سی بن جاتی ہیں سوزاک مرطوب ٹھنڈے موسم سے یا پارہ کے استعمال سے دب گیا ہوا اور اس کے بعد وجع المفاصل کا عارضہ ہو گیا ہو۔

پھوڑے پھنسیوں و ایگز یا اور ٹیکہ کے بعد کچھ پھنسیوں کے لئے یہ ایک بیش قیمت دوا ہے۔

زیادتی :- رات کو، مرطوبیت سے، پیشاب کرنے کے بعد، جگہ لیتے ذہنت، موسم بہار میں، حیض کے قبل۔

معاون :- ایلمیم سیپا، مرکبویس، سیپا۔
مخالف :- ایک ایٹ۔

طاقت :- یہی طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SYZYGIUM JAMB.

سانز بحیم

خصوصی علامات

۱۔ پیشاب میں شکر کا اخراج

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر آنے کے عارضہ میں ہی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

پیشاب میں شکر کے اخراج کو کم کرنے اور اس اخراج کو روکنے کے لئے یہ دوا ایک متنازع ترین دوا ہے۔

جسم کے بالائی حصہ پر گرمی دانے نکلتا، چھوٹے چھوٹے سرخ دانے جن میں بے انتہا کھجلی ہو۔

بیحد پیاس اور ساتھ ہی کمزوری، پیشاب مقدار میں زیادہ خالص ہو۔ جس کا وزن مخصوص زیادہ ہو۔

جلد پر پلک نہ زخم یا ذیابیطس کے باعث ہونیوالے زخموں

طاقت :- یہ دوا جامن کی گٹھن کے مغز سے تیار ہوتی ہے مگر اس مغز کا
 سفوف ہی دس گرین فی خوراک کے حساب سے دن میں تین مرتبہ استعمال کیا
 جائے تو بھید مفید ہوتا ہے ۔
 درنیکچر کی صورت میں بھی مستعمل ہے ۔

CICUTA

سائیکیوٹا

خصوصی علامات

- ۱۔ تشنجی دورے، خوفناک بوضعی اور انیٹھن کے ساتھ۔
- ۲۔ عفوئی (زچگی) کے تشنجی دورے، سانس رک جائے اور مردہ معلوم
 ہو، جسم کا اوپری حصہ زیادہ تر مائوف ہو جائے، وضع حمل کے بعد
 دورے جاری رہیں۔
- ۳۔ مٹی اور ناتقابل مضمرا شیار رک بھید خواہش۔

عام استعمال

بچوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں تشنجی دروں، گردن توڑے نماز
 رگ اور رپسوت کے تشنج کے لئے یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مستورات میں مرگی اور ریشہ کے تشبہی دورے، دانت نکلنے کے زمانہ میں یا پیٹ کے کیڑوں کے باعث بچوں میں تشبہی دورے۔
پڑھتے وقت سرخ متحرک محسوس ہوں یا نظروں سے نمائے ہوتے ہوتے محسوس ہوں۔

بچہ دانت نکلنے کے زمانہ میں دانتوں کو یا مسوڑھوں کو پیسے، جبرکے جھینچ جائیں۔

جسم کے مختلف حصوں میں جھکے پیدا ہوں، سرگرم۔

دماغ یا ریڑھ کی چوٹوں کے پلانے اثرات بد کے باعث تکالیف خصوصاً تشبہی گوشت کے اندر پھانس لگ جانے سے کڑا زہی دورے۔

سائیکو لک مادہ کے باعث آبلے یا کوتہ جن پر زہر کھڑ بن جایا کر اعضاء کے دب جانے سے ذہنی تکالیف۔

زیادتی :- تمباکو کے دھوئیں سے (اگنیشیا) چھوٹے سے، ہوا کے جھونکے سے، چوٹ سے۔

مصلح :- آرنیکا، کانیا، اریسم، کیوریم ایسی ٹیکم۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

خصوصی علامات

۱۔ کتوں کی سی جھوک، پیٹ بھر کھانے کے بعد جی جلد جھوک لگ جاتے

عام استعمال

یہ دوا سچوں کے امعار کی خراش میں مفید پڑتی ہے، نیز پیٹ کے کیرے اور اس کے ساتھ دیگر عوارض، چڑچڑاہٹ، جھوک کی زیادتی، دانت پینا، تشنچ، چلانا، رونا، ماتحتوں اور پیروں میں زردی کے جھکے لگنا وغیرہ۔

عمومی علامات

بچہ نہایت خدی ہو، اور یہ چاہے کہ کوئی اسے گود میں لے کر گھومتا ہے (کمپوٹا)

سر پر گرانی، سن ہو جانے کے ساتھ، درد سر جھکنے سے کم ہو۔
پتلیاں پھیل ہوئی، اشیاء زرد نظر آتی ہوں، امعار کی خراش کے باعث جھوگا پن۔

مریض مسلسل ناک کو کھجلائے، چہرہ زرد۔
دانت میں درد جو کہ ٹھنڈے پانی سے یا ہوا لگنے سے زیادہ ہو۔

پیاس زیادہ، پورا کھانا کھانے کے بعد۔ بھی مصبک لگی ہوتی ہو۔ میٹھا کھانے کی رغبت، تھے میں بلغم اور کیڑے نکلیں، بچہ ماں کا دودھ نہ پئے۔ پیٹ میں ناف کے پاس چپکی لینے کا سادرو، بچوں کا پیٹ چھوڑا ہوا اور سخت ہو، ہچکیاں آئیں، ایسا محسوس ہو کہ پیٹ میں کوئی کاٹتا ہے۔ سفید پانی کا سادست جس میں کیڑے نکلیں، مہرز میں کھلی۔ پشیاہ رات کو خود بخود بستر میں ہو جائے، مقوئی دیر رکھے رہنے سے پشیاہ دودھیا ہو جائے۔

خشک کھانسی، کالی کھانسی، ضیق النفس، صبح اور شام کو تکلیف زیادہ بخار لرزہ کے ساتھ اور پیاس کے بغیر اور کبھی پیاس کے ساتھ جس میں پسینہ زیادہ ترہ چہرہ اور سر میں آئے۔ زیادتی :- صبح و شام، چھونے سے، کھانے کے بعد، کھلی ہوا میں چلنے دبانے سے گرم موسم میں، دھوپ سے۔

کبھی :- حرکت سے، پیٹ کے بل لیٹنے سے۔
مصلح :- کیمفر، کیپسی کم، چائنا، مرکبوریس۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳ طاقت تک عام استعمال ہوتی ہے نیز ۳۰ سے ۲۰۰ تک بھی متعمل ہیں۔ ٹاکٹرنیش ۲۰۰ طاقت کو گرم اعداد کے لئے زیادہ مفید خیال کرتے ہیں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ ڈنقیر یا، مریض گرم غذا زیادہ آسانی سے نگل سکے۔
- ۲۔ دردِ سر بہت زیادہ سوچنے سے۔
- ۳۔ خشکیِ تالو اور حلق میں۔

عام استعمال

بنجار کا ہی اور انفلوئنزا میں جبکہ کھل ہوا میں جانے سے بکثرت چھینکیں آئیں اور آنکھوں سے پانی جاری ہو، یہ دوا بہت مفید ہے، نیز حلق کے درد اور لوزتین متورم ہوں، مستورات کی غشی جو اس دھم سے پیدا ہو کہ وہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے یا حاملہ ہے۔ علاوہ ازیں اعصابی عوارض میں جو کہ گرم شکم کے باعث پیدا ہوں۔ یہ دوا اکثر اچھے نتائج پیدا کرتی ہے۔

عمومی علامات

بچوں میں کیروں کی تکلیفات (سائٹا، سلیشیا، سپائ جیلیا) دورانِ سر، آنکھوں کے سامنے سیاہی، ہر قسم کی بو بہت تیز محسوس ہو۔ یکایک چھینکیں آئیں اور آنکھوں اور ناک سے پانی بہے۔
حلق کے درد کا ورم جو کہ بائیں طرف شروع ہوا حلق میں دکھن،

بہت لمبیدار بلغم۔

منہ کا ذائقہ میٹھا، پیاس نہ ہو، میٹھی چیزوں کی رغبت، پیٹ میں
ٹھنڈک معلوم ہو۔ رال ہے۔

حیض بہت دیر میں ہو، حیض ٹھہر ٹھہر کر ہو۔

جلد خشک، ناخن سخت۔

بخار، سردی زیادہ محسوس ہو، سر، منہ، ہاتھ، پیر ٹھنڈے، آنسو
بکثرت نکلیں، پیاس نہ ہو۔

زیادتی :- ٹھنڈک سے، ٹھنڈی چیز کے پینے سے، پورا چاند ہونے پر،
کمی :- گرم کھانے سے، گرم چیز سے، لیٹنے سے۔

معاوض :- سیپا۔

مصلح :- کیمر، کونیم، پسٹیل۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SABINA

سیانہ

تخصوصی علامات

۱۔ رال اور گانا ناقابل برداشت ہو۔

۲۔ کمر میں کھینچنے والے درد چوتھڑ کی ہڈی سے پٹرو تک۔

۳۔ تکلیفات استسقاء حمل یا قبل از وقت وضع حمل کے بعد، درد چوتھڑ

کی ٹہیوں سے پیر کو جانیں۔

۴۔ حیض جس میں درد چوڑی کی مڈی سے پیر تک ہو۔

عام استعمال

یہ دوا جریانِ خون کو روکنے کے لئے جبکہ خون قد سے غلیظ اور قد سے رقیق ہو نہایت کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ بریں عادتِ استسقاءِ حمل، سیلانِ امبض، مشکل سے پیشاب آنا، طامِ مفاسلی اور اعصابی درد اور سوزشی سوزاک وغیرہ عوارض میں بھی مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

حیض جلد آئے، بکثرت ہو اور ایامِ دیر تک رہیں، خون قد سے غلیظ اور رقیق ہو، کمر سے لے کر پیر تک درد، درینچے سے اوپر کو اٹھے، اندامِ نہانی میں ٹیس مارتے والے درد ہوں، حیض کے دنوں کے علاوہ بھی خون آئے، تیسرے مہینے استسقاءِ حمل کا میلان۔

مردوں میں سوزشی سوزاک، حشفہ میں جلن، دکھن، ٹٹکانہ اور پیشاب کی نالی میں سوزش ہو، خون آمیز پیشاب آئے، پیشاب کے لئے بہت زور لگانا پڑے۔

مقعد بھری ہوئی معلوم ہو، تبض ہو، بواسیر جس میں بکثرت خون آئے، نفیسی اور مفاسلی عوارض بالخصوص ایسی عورتوں میں جو دمھی عوارض میں مبتلا ہوں، جوڑوں میں سوزشی درد۔

نرلیا دتی :- گانے بجانے سے، حرکت سے گرم اور گرم ہوا سے

کھڑی ہوئیں۔

معاونہ:- تنصوفا۔

مسلح:- کیمفر، پلساٹیل۔

طاقت:- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SPONGIA TOSTA

سپانچیا ٹوسٹا

خصوصی علامات

۱۔ مریض ذق کے مزاج والا ہو۔

۲۔ کھانسی خشک، ہر چیز مکمل طور پر خشک، بغم کی کہیں آواز نہ ہو۔

۳۔ کھانسی خشک، سنسناہٹ کی آواز، سخت ککڑی میں آواز ککشی کی

سی آواز، زیادتی میٹھی چیزوں سے، ٹھنڈی چیزیں پینے سے۔

۴۔ کروب میں سیٹی کی سی آواز، زیادتی سانس اندر لینے سے۔

عام استعمال

دل کے کوڑوں کی بیماریاں، کھانسی جو قلبی عارضہ کی وجہ سے ہو،
گلہڑ، کروب، بڑا کادی کھانسی، ورم، نمونیہ، ذات الجنب، ورم
حجاب القلب اور سوزش باریطون میں حسب علامات مستعمل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

تمام ہوائی نالیوں اور خند شک ہوں، آواز بھاری، منجھو خشک، جلتا ہوا، رکھا ہوا، کھانسی خشک، صوٹکنے والی، خنقاں، کھانسی کچھ پینے کے بعد کم ہو جاتے۔

تنفس وقت سے چلے صبحیہ خجرو میں کوئی شے چھپسی ہوئی رہے تھا۔
 گھنٹہ کا تمام سخت سوس ہو، شب کو اچانک نیند کھل جاتی ہو، اس کے ہمراہ شدید کھانسی ہوتی ہو، جی بہت گھبراتے، سانس وقت سے آتا ہو، سر کو نیچا کر کے لیٹ نہ سکتا ہو، دوسے کے دوران نیند آ جاتی ہو۔
 سپرٹیک کارڈ (منی کن مانی) سوچی ہوئی اور درد کسے، خصیتین میں درد اور سوجن ہو۔

زیادتی پر اونچائی پر چڑھنے سے، آندھ سے، آدمی رات سے قبل، سرٹنے سے، مغرب ہواؤں سے، تمباکو سے، گرم کمرے میں، میٹھی اشیاء سے۔
 کبھی بہتر ترنے سے، سر کو نیچا کر کے لیٹنے سے، کھانے کے بعد۔
 مصلحہ :- ایجوٹائیٹ، کمیٹر۔

طاقت :- درمیان سے ۳ طاقت تک (۲۰۰ طاقت گریپ میں، اونچی طاقتیں قلبی عوارض میں اور چھوٹی طاقتیں عام امراض میں مفید ہیں)

سپائی جیلیا

تخصوصی علامات

- ۱۔ جسم ذکی الحس ہونے کے باعث چھونے سے درد کرے۔ جھلس کو چھونے سے جاڑا محسوس ہو۔
- ۲۔ آنکھوں کے ڈھکیوں میں ناقابل برداشت، دبانے والا درد۔
- ۳۔ آنکھوں میں چھونے سے ذکی الحسی
- ۴۔ چہرہ کا عصبی درد، صبح سے عروب آفتاب تک۔
- ۵۔ دانت کا درد تمباکو نوشی سے، جس میں کئی کھانے کے دوران ہو (پلاٹیکو)
- ۶۔ دھڑکن شدید، آنکھ سے دکھائی دے اور خود مریش کو سنائی دے۔

عام استعمال

آنکھوں، دل اور نظام عصبی پر اس دوا کا اثر نہایت واضح ہوتا ہے۔
 پانچویں مزد (عصب) کے عصبی درد میں بھی مفید ہے۔ خصوصاً کمزور اور
 کمی خون کے شکار مریضوں کے لئے مفید ہے، ایسے مریض جن کو وجع المفاصل
 ہوتا ہو اور ان میں خنارہ پیری مادہ موجود ہو، بھی لگنے کے سے درد جلتے ہیں۔
 قلبی دہش اور عصبی درد ہوتے ہیں، چھوٹا ناقابل برداشت ہوا اعصار کو
 سردی محسوس ہوتا ہے، تاکہ بدن میں سرد لہریں دوڑیں، گرم امعار کی وجہ سے پیدا

شدہ عوارض وغیرہ میں متعل اور مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض ذہنی طور پر تیز نوکسیلی چیزوں آل پن، سویوں وغیرہ سے خوف زدہ

ہوتا ہے۔

ہاں کی تکلیف قلب کی (ایڈم، نابجا)۔ دل کے اوپر ہی حصہ میں دل کے
کرنے کی آواز۔

اعصابی درد سر، نوبتی، صبح کے وقت دماغ میں شروع ہو کر تمام سر
میں پھیل کر بائیں کن پٹی، ابرو میں سے ہوتے ہوئے بائیں آنکھ میں مجتمع ہو
جاتے۔ (دامنی جانب، سنگو نیریا، سلیٹیا) درد تسکین والے، شدید۔
درد سر سوج نکلتے ہی شروع ہوں، دوپہر تک بڑھ جائیں اور غروب
آفتاب تک جلتے رہیں (ٹوبیکم)

چہرہ کا عصبی درد بائیں جانب کا، نوبتی، آنکھ کے گڑھے کا، آنکھوں کا،
جڑے کی ہڈی کا، دانتوں کا، صبح سے غروب آفتاب تک۔

کینسر کا زخم مہرز میں جس میں ناقابل برداشت درد ہو (ایمیون)
زیادتی :- حرکت سے، شور و غل سے، چھونے سے، آنکھوں کو حرکت

دینے سے، سر پر چوٹ آنے سے، اندر سانس لینے سے، لٹھکے سے۔
کسی :- آرام سے، سر اونچا کر کے اور داہنی کمرٹ لیٹنے سے۔

مصلح :- اورم، کیفیر، کوکولس، پساٹیللا۔

طاقت :- ۱۔ درمکھر سے ۲۔ طاقت تک۔ عصبی عوارض میں ۲ طاقت سے ۳ طاقت
تک سوزش علامات کیلئے اونچی علامتیں عموماً عصبی دروں (نیوریلجیا) میں ۳۰ طاقت زیادہ

خصوصی علامات

- ۱۔ عمل جراحی کے بعد کی تکالیف۔
- ۲۔ گوانتھنیاں پیوٹوں پر یا اوپری پیوٹوں پر، یکے بعد دیگرے، چوڑے
بعد سخت گلٹیاں پیچھے چھوڑ جائیں (کوئیم، تھوہا)
- ۳۔ دانت کا درد، حیض کے دوران، دانت کھانے پینے کی چیز لگنے سے
درد کریں۔
- ۴۔ دانت کناروں پر بوسیدہ ہو جائیں۔
- ۵۔ تباکو کی بے جا خواہش
- ۶۔ پیشاب کی نالی میں جلن جب پیشاب نہ کر رہا ہو۔
- ۷۔ بوڑھے افراد میں غدہ مذی کے مارضہ کے باعث پیشاب کر چکنے کے
بعد درد۔
- ۸۔ جریان، مریض کی نگاہوں میں شریک پلپ اور خطا دہی۔
- ۹۔ کھانسی جس میں تھریک تباکو کے دھوئیں سے ہو (سنبھیا)

عام استعمال

یہ دوا غصہ اور اس کے برے نتائج کو رفع کرتا ہے، غصہ کی وجہ سے
پیٹ درد کو دور کرتا ہے۔ نیز مشت زنی کے برے اثرات، احتلام

جریانِ منی، کثرتِ مجامعت کے برے اثرات وغیرہ کے لئے نافع ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر سرینس کا حافظہ کمزور ہو، کوئی کام طبعی نہ کر سکتا ہو، غصہ کے برے اثرات، بے قراری، بے چینی، اپنے آپ پر قابو نہ ہو۔
زیریں جڑے کے غرور سوچے ہوئے، دانتوں سے پیپ آئے، آنکھ کی پتلی میں آتشکی سوزش، گولہ بخنی۔

مردوں میں قوتِ باء کمزور ہو، جریان، اختلام، مشقت زنی کے نتائج، بدخصیتیں، ناکارہ اور سوچے ہوئے جن میں جلن اور ٹوٹک مارنے کے سے درد ہوں۔

مستورات میں نصیۃ الرحم میں درد، خون حیض، بے قاعدہ، دیر سے اور زیادہ مقدار میں آتا ہو، فرج میں خارش اور ٹوٹک مارنے کے سے درد۔
کھانسی صرف صبح کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد زیادتی، تاسف یا تھک کے بعد، دانت صاف کرنے کے بعد۔

زیادتی، چھونے سے، بوجھ سے، دبائے سے، حرکت سے، کھانے پینے سے، غصہ سے، جذبات سے، پیشاب کرنے کے بعد اور پیشاب نہ کرتے وقت۔

معاون :- کاسٹیکم، کالوسنتھ۔

مخالف :- رینج کولس بلب۔

مصلح :- کمیفر۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

STANNUM

سٹانم

خصوصی علامات

- ۱۔ مرینن ٹنگین ، ایس ، تمام وقت سننے کی سی حالت محسوس کرے ۔
- ۲۔ کمزوری اور غشی سی خصوصاً ذہن اترتے وقت ۔
- ۳۔ درد سر یا عصب درد آہستہ آہستہ بڑھیں اور آہستہ آہستہ کم ہو ۔
- ۴۔ رحم کا اپنی جگہ سے گرنا ، مریض اس قدر کمزور کہ وہ بجائے بیٹھنے کے کرسی میں گر پڑے ۔
- ۵۔ سینہ میں بے حد کمزوری ، اس قدر کمزوری کہ باتیں نہ کر سکے ۔
- ۶۔ کھانسی ، سینہ میں خالی پن کا احساس ۔
- ۷۔ بطن میں میٹھا یا تلکین

عام استعمال

نظام عصبی میں انتہائی درجہ کی کمزوری ہو ، جسم و جان خستہ و ماندہ ہوں ، ہوائی نالیوں اور پیچیدوں میں کمزوری اور درد آہستہ آہستہ بڑھتے اور گھٹتے ہوں ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض اداس، پشمرده، مائل بہ گریہ لیکن روتے سے تکلیف
اور بڑھ جائیں۔ مستورات کو زینہ اترنے میں کمزوری محسوس ہو لیکن
پڑھنے سے تکلیف نہ ہو۔

مزمن سوزش براں کا دی، ذوق کے آخری درجوں میں جبکہ چھاتی میں
بجہ کمزوری ہو، ناتوانی کے سبب بولنا، گانا، ہنسا یا بلند آواز نہ کرنا شروع
ہو، کھانسی بلند آواز والی، بلغم بکثرت خارج ہوتا ہے۔ بلغم شیریں،
نکلیں، کھٹا یا بدبودار زرد اور سبز پیپ خارج ہوتی ہے۔ کھانسنے اور
بلغم نکلنے سے حلق کی خشکی کو آرام محسوس ہو۔
بانتھل میں تشنچ، رعشہ، فالج۔

زیادتی :- دائیں جانب لیٹنے سے گرم شیار پینے سے۔
کچی :- دبانے سے، کھانے سے اور اخراج بلغم سے۔

معاون :- پیاسیلا۔

مصلح :- پیاسیلا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک متعلیٰ مضیہ۔

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض مسلسل دعائیں، التجائیں اور منتیں و سماجیتیں کرے۔
- ۲۔ خواہش کرے روشنی کی اور ساتھیوں کی، اکیلا رہنا برداشت نہ ہو۔ (بسمتھ)۔ زیادتی اندھیکے میں اور تنہائی میں۔
- ۳۔ آنکھیں بالکل کھلی ہوں، چکدار، پتیلیاں بہت پھیلی ہوئی۔
- ۴۔ کسنت۔
- ۵۔ تپے، جوں ہی سرتیکہ سے اٹھائے۔
- ۶۔ بہت سی تکلیفات کے ساتھ درد نادر۔ درد کا نہ ہونا اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔ (ادیس)

عام استعمال

نظام عصبی اور دماغی عوارض میں عام طور پر مستعمل ہے۔

عمومی علامات

دلیوانگی، مریض متواتر ہڈیاں بکتا اور شور مچاتا ہے، خطرناک بیہوشی عجیب و غریب دہمی اشیاء سے خائف رہتا ہے۔
خدراک کا ذائقہ گھاس کا سا محسوس ہو، پیاس کی شدت، صفائی

اور بے غمی تھے۔

حبس البول، مشائخ خالی ہو۔

مردوں میں خواہش جماع حد سے زیادہ ہو اور بخش خیالات میں غرق ہے۔ عورتوں میں پر سوتلی جنون جبکہ نفاس کم خارج ہر مختلف قسم کے وہم آمیں، اعصابی اکساہٹ و بیقراری۔

درد جبکہ اعصاب متورم ہوں۔

سرخیاد میں دماغی علامات واضح ہوں، تپ محرقہ حبس البول ہو۔ پسینہ بکثرت، لیکن بنجار میں تنخیف۔

زیادتی :- چھونے سے، دبانے سے، حرکت سے، ہوا سے، ٹھنڈک سے، شام کے وقت، اندھیرے میں، چکدار چیزیں دیکھنے سے، دھوپ میں، اکیلے ہونے پر۔

کسی :- گرمی سے، روشنی میں۔

مخالف :- کاؤیا۔

مصلح :- بیلادونا، کیمفر، نکس و امیکا، ادیم، پساٹیل۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک درد۔
- ۲۔ تمام تکلیفات یا علامات رات کے وقت بڑھ جائیں (مرک)
- ۳۔ سیلان الرحم، مقدار میں زیادہ کپڑوں سے بہہ نکلے۔
- ۴۔ سر کے بال گریں۔
- ۵۔ بے جا خواہش شراب کی، کسی بھی شکل میں۔

عام استعمال

آتشک نہ ہر سے ہونے والے امراض کے علاوہ دیگر متعدد عوارض میں حسب علامات مستعمل ہے۔

عمومی علامات

حافظہ کمزور، کتابوں، اشخاص اور جگہوں کے نام بھی یاد نہ رہیں۔ حساب کے سوالات حل کرنا مشکل ہو۔

درد سر، سر کی ٹہریوں میں درد، سر سام، بال گریں۔

بوشنی برداشت نہ ہو، آنکھوں سے پانی بہے، رات کو دور میں زیادتی۔

نک کی ٹہی ہیں سٹرن، تالو میں سوراخ، زبان میں شگاف، رال بکثرت
عرق الناسر جورات کو زیادہ ہو، شانہ کے جوڑوں یا انگلیوں کی گانٹھوں
میں مفاصل درد۔

خواتین میں فرج کے لبوں پر زخم، سیان رحم بکثرت، پیلا، پانی کا
سا، اس کے ہمراہ بھیتہ الرحم میں درد۔
موسم گرما میں مزمن درد زور کرے، خشک کھانسی رات کو زیادہ ہو
جلد پر سرخ، بھوٹے بدبودار دانے۔

زیادتی :- رات کو، گرمی میں، ساحل سمندر پر۔

کٹھی :- دن میں، آہستہ آہستہ گھومنے پھرنے سے، خشکی پر
پھاڑوں پر۔

طاقت :- ۲۰ طاقت سے ہزار طاقت عام طور پر متعل ہے۔
اونچی طاقت ہی مفید ثابت ہوتی ہے اور اس کی خود اکیس بار
بار دہرائی نہیں چاہئیں۔

نصوصی علامات

- ۱۔ کھڑے ہونا سلفر کے مریض کے لئے ایک بدترین وضع ہے، سلفر کے مریض کھڑے نہیں ہو سکتے۔
- ۲۔ میلے کھیلے لوگ۔
- ۳۔ تکالیف میں ہمیشہ غسل کے بعد زیادتی۔
- ۴۔ بچے نہ ہلایا جانا یا منہ لٹختہ دھویا جانا پسند نہ کریں۔
- ۵۔ جب بہترین منتخب شدہ اودیہ اپنا تسلی بخش اثر دکھانے سے قاصر رہیں۔
- ۶۔ تکالیف مسلسل بار بار عود کر آئیں۔
- ۷۔ احساس جلن کا جسم کے مختلف حصص میں۔
- ۸۔ مسلسل حدت اور گرمی چاند میں، رات کے وقت تلووں میں جلن کے ساتھ۔
- ۹۔ دست صبح سویرے بستر سے جھگائیں (الیو، سورینم)۔
- ۱۰۔ قبض، پاخانہ بڑا اور درد بھرا، بچہ درد کی وجہ سے پاخانہ پھیرنے سے ڈرتے۔
- ۱۱۔ پیشاب اور پاخانہ جہاں سے گزریں ان حصص پر درد ہو۔
- ۱۲۔ مقعد کے گرد سرخی اور پھلین، جسم کے تمام مخارج بہت سرخ۔

عام استعمال

سب سے بڑی واقعہ جہربہ دو اسے۔ اس کا استعمال امراض کو اندرون جسم سے باہر سطح پر لاتا ہے۔ یہ جسم کے ہر رگ و ریشہ پر اثر کرتی ہے اور متعدد امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے زیر اثر اخراج خراش پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اعصاب پر اثر کرنے سے منو بے قاعدہ ہوتا ہے۔ یہ خاص کر ان مزمن امراض میں مفید ہوتی ہے جن کا آغاز گلیٹیوں سے ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم ہمت، بد مزاج اور رخصنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سر میں چکر، بعض دفعہ کل سر میں بوجھ، عموماً رات کو زیادہ۔ در دہر ہر ہفتہ یا دو سر سے نفیہ ہوا کرے۔

آنکھوں میں گرمی، جلن اور سرخی، پوٹے متورم۔

نکسیر، ناک میں خشک زخم یا پیڑیاں۔

زبان سفید، کنکے اور نوک سرخ، حلق میں رکاوٹ۔

معدہ میں کمزوری، خالی پن یا بیٹھنے کا احساس قبل دوپہر۔

قبض بہت جلد جلد۔ مقدار میں زیادہ اور زیادہ دنوں تک رہے۔

پھوٹے یکے بعد دیگرے نکلیں، خارش جو بہتر ہیں بڑھے۔

بواسیر جس کا علاج خارجی مرہموں سے ہوا ہو۔

درم کی کیفیات اندرونی یا بیرونی مختلف حصص کی۔

زیادتی بہ آرام سے، جب کھڑا ہو، بستر کی گرمی سے، نہانے سے،
 موسم کی تبدیلیوں سے (رسٹا کس)
 کسی بہ خشک گرم موسم میں، داہنی جانب لیٹنے سے۔
 معاون :- ایجنٹ، ایکس و امیکا، پلسٹیل۔
 مصلح :- ایجنٹ، کیفور، کمیوٹا، چائنا، مرکپورس، پلسٹیل،
 رسٹا کس، سیپا، سلیشیا، تقو جا۔
 طاقت :- درٹیکچر سے ۲۰ طاقت تک نیز ۲۰۰ طاقت اور اوپر۔
 نوٹ :- کلکیر یا کے بعد سفر نہیں دینا چاہیے

سلیشیا

SILICEA

خصوصی علامات

- ۱۔ تنہا زیری مزاج وہ بچے جن کے سر بڑے ہوں، تالو کو لے ہوئے اور پیٹ
 پھولا ہوا۔
- ۲۔ دیرینہ درد سر گردن کی پشت سے شروع ہو کر چاند کو جائے۔
- ۳۔ قبض ہمیشہ حیف کے قبل اور دوران حیف۔
- ۴۔ پاخانہ مشکل سے ہو جیسے مہر کی نا اہلیت سے ہو۔
- ۵۔ پاخانہ کا کچھ حصہ باہر نکل کر پھر اندر لوٹ جائے (تقو جا)
- ۶۔ شرمگاہ کی نالی سے خون کا سیلان ہر مرتبہ جین کچھ پستان منہ میں سے۔

۷۔ ہاتھوں، پاؤں کی انگلیوں، پاؤں اور نعل کا بدبو دار پسینہ۔
۸۔ علامات میں سے چاند کے دوران زیادتی ہو۔

عام استعمال

پیپ والے عوارض میں عام مستعمل ہے۔ چھوٹی طاقتیں پیپ کو جلد
پکا کر خارج کرتی ہیں اور اونچی طاقتیں پیپ کو خشک کر کے اندام
میں ردگار ہوتی ہیں۔

علامہ بریں نا کافی نشوونما سے بدن، خناریری مزاج والے بچوں کا مرض
سوکھا، حرارت غریزی کا کم ہونا، سردی جھٹ لگ جانا، ٹیکہ لگانے
کے برے اثرات مابعد وغیرہ بھی اس دوا کے مقتضی ہوتے ہیں۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض اعصابی، چڑچڑاہوتا ہے، بے چین، پریشان اور حلیم۔
نڈاپور سے طور پر جنوہ بدن نہ بنے۔ سیدھا تھکاوٹ اور کمزوری
ناسور، مقعد یکے بعد دیگرے سینہ کی علامات کے ساتھ (بربریں)
پستان کی گھنٹی اندر کی طرف کھینچ جائے (سار سا پیلا)
جلد غیر تندرست، ہر چھوٹی سی ضرب پک جائے (گر ایفائٹس) سر پر
مرکب، بیڑ ولیم،

ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ٹیڑھے (انیم کرد وڈ)
آنکھوں کا ناسور، پاؤں کے ناخن گوشت میں گھس جائیں، بے ہری
چمکے جن میں محض خون ہو، کارنیکل، سرطان، ناسور، مقعد میں شکاف۔

یہ دوا جسمانی ریشوں میں سے غیر جسمانی اشیاء کو خارج کرنے میں بھی مثلاً مچھلی کا کاٹا، سوئیاں، ہڈی کے ٹکڑے۔

زیادتی :- ٹنڈک سے، حیض کے زمانہ میں سننے چاند کے دنوں میں کپڑا اتارنے سے، خاص کر سر پر کپڑا ہٹانے سے

کمی :- گرمی سے، خاص کر سر پر کپڑا لپٹنے سے، سولے پیٹ کی علامات کے جلد دیگر علامات گرمی سے کم ہوتی ہیں البتہ پیٹ

کی علامات میں ٹنڈی اشیاء کھانے پینے سے تخفیف ہوتا ہے۔ معاذن :- حقو جا، سکوئیل، گریفائیٹس، فلورک الیڈ، ہیرپلفر۔

مصلح :- کیفیر

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک نیز اونچی طاقتیں۔

SAMBUCUS NIGRA

سمبوس نائیگرا

خصوصی علامات

- ۱- چھوٹے بچوں کا خشک نزلہ۔
- ۲- بچہ اندر سانس کھینچ سکے لیکن باہر نہ پھینک سکے۔
- ۳- بنجارہ جسم پر کسی قسم کی نمی کے بغیر جب مریض سوتا ہو۔
- ۴- پسینہ کی زیادتی تمام جسم پر جاگنے کے دوران۔

عام استعمال

یہ دوا خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کے اعضائے تنفس کے
عارض میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

بچوں کا خشک نزلہ، ناک بलगم سے بند ہو، بوڑھے افراد کا دمہ،
اس دوا کی تکالیف کے ساتھ عموماً پسینہ کی زیادتی ہوتی ہے۔
آواز بیٹھ جوتی، حلق میں لیس دار بलगم، تشنج کھانسی آدھی رات کے
قریب آئے اور اس کے ساتھ سانس کی تکلیف، کھانسی کے باعث
چہرہ نکلا ہو جائے۔

تو بخ، متلی، نفخ کے ساتھ اور بار بار پینکالیں دار پاخانہ۔
ہاتھ نیلیوں، ٹانگوں اور پیروں کی سوجن، پیر برٹ کے مانند سر
ہلکنے کی حالت میں کل جسم پر پسینہ۔

زیادتی :- آرام کی حالت میں، پھل کھانے کے بعد۔
کسی :- بستر پر اٹھ کر بیٹھنے میں، حرکت کرنے میں۔
مصلح :- آر سیگم البم، رشاکس، کھنفر۔
طاقت :- دے پچھر سے ۳ طاقت تک مستعمل ہے۔

خصوصی علامات

- ۱۔ چھن والے درد جیسے نوکدار شیار چھب رہی ہوں۔
- ۲۔ ہڈیوں کے پردے تک پہنچے ہوئے برونی زخم۔

عام استعمال

عام طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سے متعلقہ عارض میں یہ دوا مستعمل ہے ایسے زخموں کے لئے جو کہ ہڈی کے پردوں تک پہنچ گئے ہوں، یا جب ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑتی نہ ہو یا جب ہڈی کال ہو گئی ہو اور اس کے بعد درد ہوتا ہو یا جب ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دونوں سرے درد کرتے ہوں تو یہ دوا کارآمد ہے۔

عمومی علامات

چوٹ آنے کے باعث ہڈیوں یا ان کے غلاف کی تکالیف، عمل جراحی کے بعد ہڈی کا کٹا ہوا سر اور دوسرے اور ہڈی کے غلاف میں چھن ہو، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سرے پورے طور پر نہ جڑے ہوں، شکستہ ہڈی کا سر درد کرے۔

چوٹ آنے کے باعث آنکھ میں درد۔

طاقت :- در ٹیچر ایک دس قطرے تک یا ۱۰ x ۳ یا ۳۰ طاقت
 زخموں اور خراش متعقد کے لئے خارجی طور پر بھی اس کا روشن مستعمل ہے۔
 (ایک حصہ در ٹیچر اور تین حصے پانی)

CIMICIFUGA

سمی سی فیوگا

(دیکھتے اکثر ایسی موسا)

SANGUINARIA

سنگونیریا

خصوصی علامات

- ۱۔ نوبتی درد سر جسے نیند سے کون ہو۔
- ۲۔ درد سر جو گدی سے شروع ہو۔
- ۳۔ درد سر جو سن ریس کے زمانہ میں عود کر آئے۔
- ۴۔ چہرہ کا اعصابی درد جس میں بعد دوپہر رخساروں پر چھکدار سرخی ہو۔
- ۵۔ دلہنے باز اور کندھے میں بالی کے درد۔
- ۶۔ کھانسی خشک جس کے ساتھ گالوں پر چھکدار سرخی ہو۔

عام استعمال

یہ دوا دہنی طرف کے حصّہ جسم پر اثر کرتی ہے۔ خاص کر بلغمِ جھلی پر اور وہ بھی سینہ کی بلغمی جھلی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

عمومی علامات

چہرہ کا اعصابی درد، اوپر والے جبڑے سے تمام اطراف میں پھیلے ان مقامات پر درد جہاں گوشت کم ہو مثلاً پیٹلی، ہاتھوں کی پشت، نرخرہ اور غذا کی نالی میں جلن۔

حجڑہ میں یا ناک میں بدگوشت (سنگوئیر یا نائٹریٹ سوئیم) سن یا س کی تکلیفات

درد زکام کا ہی کے بعد جس میں زیادتی خوشبو سے ہو۔

نوجوان لڑکیوں یا عورتوں کے چہرہ پر ابھار۔

زیادتی :- میٹھا کھانے سے، دانتیں پہلو میں حرکت کرنے سے، چھپونے سے۔

کھسی :- ترش اشیا سے، اندھیرے میں۔

معاون :- اینٹی ٹیٹھرٹ۔

طاقت :- درخت کے پھر سرد میں اور ۶۴ جرّوں کی تکالیف میں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ مزمن امراض میں اچھی منتخب شدہ ادویہ تسلی بخش فائدہ نہ کریں۔
- ۲۔ بھید کمزوری جو حاد امراض کے بعد باقی رہے۔
- ۳۔ نہانے کے بعد بھی جسم سے گندی بو آئے۔
- ۴۔ جسم کے مختلف حصوں جلد موریج یا ضرب کھا جائیں۔
- ۵۔ بھید ذکی الحسی ٹھنڈی ہوا سے یا موسم کی تبدیلی سے۔
- ۶۔ دورے سے ایک دن قبل غیر معمولی طور پر بہتر محسوس کرے۔
- ۷۔ تمام اخراج سڑے ہوئے گوشت کی سی بو والے ہوں۔
- ۸۔ بھوک آدھی رات کے وقت تنائے۔
- ۹۔ جلد پر خشکی، سستی، سینہ نہ آئے۔ قتل۔

عام استعمال

یہ دوا سورک مزاج افراد کے لئے خصوصاً مفید ہے۔

عمومی علامات

کھجلی جس میں گرمی سے زیادتی ہو، کھلانے سے خون نکل آئے۔
انگلیوں کی گھاٹیوں اور جوڑوں میں کھجلی، دانے بار بار پیدا ہوں۔

دوسر جس کے دوران بھوک محسوس ہو، کھانے سے متلی ۔
 کھوڑی میں پک جانے والے اُبھاروں کے کھنڈ، جو میں ٹپک جائیں ۔
 کان پر نہ جھوسی، لیس دار ماسے والی (گریفائٹس) کان بہنا، تپان
 خارش پیدا کرنے والا سخت متعفن سیلان ۔

کیل تر قسم کے ۔
 حاملہ عورتوں کی متلی جبکہ عمدہ سے عمدہ دوا فائدہ نہ کرے ۔
 زیادتی بہتہ سے، موسم کی تبدیلی میں، گرم دھوپ میں سردی
 سے، ٹھنڈے ہوا کے جھونکے سے ۔
 کبھی :- گرمی سے، گرم کپڑے پہننے سے، موسم گرمی میں بھی
 گرم کپڑوں سے سکون ملے ۔

معاون :- سلفر، ٹیوبہ کبولا، انیم ۔
 مخالف :- کونیم، لیگے، شستس، سیپیا ۔
 مصلح :- قہوہ ۔

طاقت :- ۳۰ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر ۔
 (جلدی جلدی خوراک دہرائی نہ چاہیے) ۔

خصوصی علامات

۱۔ تلی کی مزمن یا حادث کالیف۔

عام استعمال

یہ دوا بالعموم تلی کے عوارض میں ہی مستعمل ہے۔

عمومی علامات

تلی بڑھی ہوئی، تلی کا ورم، بائیں جانب درد ہو، جگر اور تلی کی خرابی کے باعث خون کی کمی، بائیں جانب پسلی کے نیچے درد کے باعث بائیں کمر ٹ لیٹا نہ جاسکے، جگر اور پیٹھ میں درد، تلی کی نمی یا پرانی تلی کالیف کے باعث چہرہ زرد، بھوک کم، سبھاہ

پیشاب تیز، پھینے دار جس میں سلفراز سکر موجود ہو، پیشاب کی بار بار حاجت۔

اسہال، پیٹ اور مقعد میں بوجھ۔

حیض بکثرت، سیلان الرحم زرد رنگ کا ہو۔

زیادتی بد حرکت سے اور بائیں جانب لیٹنے سے۔

مصلح :- نذر مہیوہ

طاقت :- مد رنچر اور چھوٹی طاقتیں نیز ۲۰ طاقت ۔

SEPIA

سیا

خصوصی علامات

- ۱۔ درد مہر جو پیٹھ کی طرف جائے ۔
- ۲۔ بے حد غمگینی اور رونے کا میلان ۔
- ۳۔ لاپرواہی ان سے بھی جن سے بہترین پیار ہو ۔
- ۴۔ درد سر حیض کے زمانہ میں سیلان کی کمی کے ساتھ ۔
- ۵۔ بالوں کا بری طرح گرنا ۔
- ۶۔ ناک کے اوپر گالوں تک پھیلی ہوئی زردی ۔
- ۷۔ زبان گندی جس سے بو آئے ۔
- ۸۔ نغم اور اندام نہانی میں بوجھ اور نیچے کی طرف دباؤ کا احساس جیسے ہر چیز پیڑ سے نکل کر باہر جا پڑے گی ۔

عام استعمال

سیا خاتین کے عام امراض کی مخصوص ترین ادویہ میں سے ہے ۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریضہ پر گھبراہٹ رہتی ہے، بے خیال، گھر کے کام کاج سے نفرت، از حد منہموم، متفکر اور مایوس، ہر ایک شے سے بیزاری۔
 رحم میں درد، پیڑوں کے عضلات میں ٹڈھال کر دینے کی سی تکلیف
 بچے کی طرف شدید دباؤ، مدھم بھادی درد بالخصوص بائیں خستہ الرحم میں
 محسوس ہو، رحم ٹکنے کے ساتھ اجتماع خون ہوا و زرد سیلان الرحم آتا ہوا
 رحم بائیں جانب ٹٹا ہوا جس کے باعث بائیں زیریں دھڑ میں خرد اور درد ہو
 دائیں جانب لیٹنے سے آرام، فم رحم مچھوٹے سے درد کرے، خون حیض
 بہت جلد جلد کبھی مقدار میں کم اور کبھی بہت زیادہ، قبل از حیض
 سیلان الرحم زرد، دودھیا، خراش دار، پیپ کی طرح بدبو دار، جاتے
 مخصوص میں دکھن، حیض بے قاعدہ آمد درد کے ساتھ، صبح کے وقت
 جی ٹٹلاتے۔

زیادتی :- قبل دوپہر، شام کے وقت، نہانے سے، مرطوبیت سے،
 بائیں جانب ٹھنڈی ہوا میں، آندھی اور گرج سے قبل، پسینے کے بعد
 کبھی :- ورزش سے، دبانے سے، بستر کی گرمی سے، گرم چیزوں
 کے لگانے سے، اعضاء کھینچنے سے، ٹھنڈے پانی میں نہانے
 سے، نیند کے بعد۔

معادن :- نیٹرم میور، نیٹرم کارب، نکس و امیکا، سبڈیلا، سلفر۔
 مخالف :- برائ اوٹیا، لیچے کس۔
 مصلح :- ایچو ناسیٹ، اینٹیم کرڈو، اینٹیم مارٹ، رسا کس، سلفر۔

طاقت۔ ۱۲ طاقت سے ۳۰ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔ نیز
۲۰۰ طاقت بھی استعمال ہوتی ہے۔

چھوٹی طاقتیں بار بار دہرائی جا سکتی ہیں لیکن زیادہ تر اونچی طاقت
کا استعمال زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اونچی طاقتیں جلد جلد دہرائی
نہ جائیں۔

SECALE COR.

سیکیل کار

خصوصی علامات

- ۱۔ مریضائیں جو دہلی پتل بیماری سے تباہ شدہ، کمزور ہوں اور جن کے چہرے
سے بیماری ٹپکے۔
- ۲۔ مستورات ہر چیز ڈھیل اور کھلی محسوس کریں، خون کی نالیوں میں ڈھیل پن
- ۳۔ چھوٹے، چھوٹے درد بھرے، سبز مواد کے ساتھ۔
- ۴۔ جلد چھپونے سے ٹھنڈی محسوس ہوتا ہم مریض اور صفا برداشت نہ کرے۔
- ۵۔ دوران وضع حمل ہر چیز ڈھیل اور کھلی محسوس ہو لیکن باہر نکالنے کا فعل
نہ ہو۔

عام استعمال

یہ دوا ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جن کے گوشت میں سکڑن پیدا

ہو رہی ہو، جھریاں پڑ رہی ہوں، خون کی کمی ہو، سردی بہت محسوس کریں،
اعضائے بدن ہوں یا ان میں جھنجھٹا ہٹ یا چوڑھیاں رہینگنے کا احساس پایا جائے
اور اگر خون متوازن ہوتا ہے، تیل اور دھواں سیاہ خون نکلتے۔

عمومی علامات

سیلان خون کی طبیعت، معمولی زخم سے بھی سفید خون بہا کرے۔
(لیکے کس، فاسفورس)

لیکوریڈ (سیلان الرحم) سبز، بھورا، متعفن
دست مقدار میں زیادہ، پانی کے سے، متعفن، بھورے (کرٹن بگ)
پیشاب از خود نکل جائے، بوڑھے آدمیوں کا پیشاب، رکا ہوا۔
جن جسم کے تمام حصوں میں جیسے آگ کی چنگاریاں ہوں۔
حیف بے قاعدہ، مقدار میں زیادہ، سیاہی مائل تیلے۔
استسقاء حمل کا خطرہ یا استسقاء تیسرے مہینہ میں۔
پستانوں میں دودھ پورے طول پر نہ بھرے۔
زیادتی:- گرمی سے، گرم کپڑا اوڑھنے سے۔
کٹھن:- ٹنڈرک سے، کپڑا اتار دینے سے، ملنے سے، عضو پھیلانے سے
مصلح:- کیمفر، اوپیم
طاقت:- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ قبض، پاخانہ بڑا اور سخت جسے خارج کرنے کے لئے انگلیاں استعمال کرنی پڑ جائیں۔
- ۲۔ مسلسل ایستادگی بغیر شہوت کے، خود اوارپ کھینچے ہوئے۔
- ۳۔ آواز زیادہ استعمال کے بعد بیٹھ جائے۔

عام استعمال

اس دوا کا خاص اثر اعضائے تناسل اور بول پر ہوتا ہے، سن رسیدہ لوگوں کے ضعفِ باہ اور اخراجِ مذی میں کارآمد ہوتی ہے، بڑے چاہے میں دماغی اور جسمانی تقاہت جلد ہو جایا کرے۔ یا کسی کمزور کر نیوالے مرض کے بعد کی تقاہت میں بڑی مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

نوسخی طویر پر خیالات، جماع کی طرف راغب لیکن نامردی ہو۔
بال گر جاتیں سر کے، ابرو کے، مونچھوں کے اور آلاتِ تناسل کے۔
پیشاب سرخ گہرے رنگ کا، مقدار میں کم۔

کمزور یا، سر بیض و ماغی یا جسمانی محنت سے جلد تھک جاتے، لاغری۔
 کمزور یا کے باعث خود بخود اخراج منی ہوا کرے، جربان، احتلام
 زیادتی:- سونے کے بعد، گرم موسم میں، کونین کھانے سے، گرم
 ہوا سے، چائے پینے سے۔

کمی:- ٹنڈک سے، ٹنڈے موسم سے، طاقت سنجش پیز کھانے
 معاون:- کیلیڈیم، نیٹرم کارب، فاسفورک ایسڈ، سٹانی سیگریا۔
 مخالف:- چائنا، شراب
 مصلح:- اگنیشیا، پیسا ٹیلا

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک مستعمل ہے۔

SANICULA

سینی کولا

خصوصی علامات

- ۱۔ لاغری مسلسل بڑھتی رہے، سچے بوڑھا دکھائی دے، میلا، چکنا اور
 بلاؤن نظر آتے۔
- ۲۔ گردن کے گرد کی جلد پر کل دار جھریاں ٹیڑھ جاتیں۔

عام استعمال

دوسری متعدد ادویہ کی علامات اس دوا میں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے

کسی کس میں جیب دوسری منتخب دوانا کام ہے تو حسب علامات
یہ دوا مستعمل ہوتی ہے۔

عمومی علامات

بچہ بہت ضدی، چڑچڑا اور غصیلہ۔

کھوپڑی پر، ابرو میں اور دائرہ میں بکثرت بھوسی ہو۔
کان کے پیچھے درد اور کان کے پچھلی طرف کی جڑ سے لیسیدہ
طوبت خارج ہوتی ہے۔

متلی اور تھے گاڑھی یا موٹہ پر چڑھنے سے۔

یشاب اور پاخانہ از خود خارج ہو جاتا ہو۔

تقبض جس میں پاخانہ کا اخراج بہت مشکل سے ہو۔

دست مڑے ہوئے انڈے کی طرح جھاگدار دستوں کی نوعیت

اور رنگت بدلتی ہے۔

مقعد کے قریب شگاف جو بڑھ کر آلات تناسل تک پھیل جائے

سیلان الرحم پھیل کر سی بوالا۔ پیڑ اور رحم کے مقام پر کمزوری سے

ایسا لگے جیسے ہر عضو باہر نکل پڑے گا۔

پاؤں کے پسینے انگلیوں کے درمیان اور پیرے کے کا سارو۔

پاؤں کے نموں میں جلن

طاقت ۳۰ طاقت اور اس سے اونچی طاقتیں مستعمل ہیں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ جلن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مثلاً دونوں کندھوں کے درمیان۔
- ۲۔ درد پسلی کی ہڈیوں کی درمیان جگہ میں، بائیں جانب کرٹ سے بڑھے۔
- ۳۔ کمزوری، خالی پن کا احساس تمام شکم میں
- ۴۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
- ۵۔ دست، جیسے ہی کوئی مقعد یا خانہ کی نالی نہیں پیچے، احساس جیسے مقعد کھل رہی ہو۔
- ۶۔ کھانسی، بائیں کرٹ لینے سے۔

عام استعمال

یہ دوا بالعموم لمبے، دبلے، دموی مزاج افراد پر زیادہ مستعمل ہے، جن کی جلد خوبصورت ہو، پلکیں نازک اور بال طائف اور بھوسے ہوں۔ ذہنی طور پر تیز فہم اور بہت فکری احساس ہوں۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کم سمجھتا، چونک پڑنے کی عادت، کام کرنے

کو جی نہ چاہے، یادداشت خراب ہو۔

صبح بیدار ہونے پر یا بیٹھے ہوئے اٹھنے پر جھکڑ آئیں، میٹھا
میٹھا درد سر۔

آشوب چشم، جلن دار اور کھلی والا، پوچھے پیچھے رہیں۔

کانوں میں زرد کی جھنجھناہٹ، سماعت کم ہو جائے۔

کھانے کے فوراً بعد بھوک، کھانے کے بعد بہت سی خالی ڈکائیں
کبھی تبصر، کبھی دست، جو صبح کو زیادہ ہوں، سبز آؤں کا پاجانہ

یا پتلا، سفید یا خون ملا پاجانہ۔

پیشاب بھورے رنگ کا، نیچے ریت جم جائے۔

مردوں میں جماع کی خواہش جو روکے سے نہ سکے۔

عورتوں میں حیض نہایت جلد اور قلیل ہو، چھلتا ہوا لیکو ریا۔

کھانسی جس میں زنگ آکھو و بغم نکلے۔

ران اور پیر کے انگوٹھوں کا سن ہو جانا، ہاتھ میں رعشہ۔

سنگار لرزہ کے ساتھ۔ سردی بہت محسوس ہو۔

زیادتی :- چھونے سے، مشقت سے، گرم غذا سے، موسم کی تبدیلی

سے، جھگ جانے سے، بائیں کروٹ لیٹنے سے، آندھی سے،

زیر چڑھنے سے۔

کسہ :- اندھیرے میں، دھنکی کروٹ لیٹنے سے، ٹھنڈی غذا سے

کھل ہوا میں، ٹھنڈے پانی میں نہانے سے، نیند سے۔

معاون :- آر سینکیم البم، ایلیم سیپا، کاربوئیج، آپیک۔

مخالف :- ایس، کاسکیم۔

مصلح :- آرسینکیم ایلیم، کلکیریا، کیمفر، کانیا، بکس و امیکا، سیبیا۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ اور اوپر۔

PHYTOLACCA

فائٹولاکا

خصوصی علامات

- ۱۔ ڈنقیریا، حلق میں جلن جیسے آگ کے انگارے، یا گرم سرخ لوبے سے ہو، خشکی۔
- ۲۔ پستانوں میں سخت ہونے کی رغبت، پستان پتھر کے سے سخت اور درد بھرے۔
- ۳۔ درد پستان کی گھنڈیوں میں سے نکل کر تمام جسم میں جا بیٹیں۔
- ۴۔ پستانوں کے ناسور، منہ مل نہ ہونے والے زخم۔
- ۵۔ پستانوں کی گھنڈیوں میں ذک الحسی، پھوٹے کا سادرد اور شگاف۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر حلق اور پستانوں کے عوارض میں مستعمل ہے، علاوہ
 بریں آتش کی تکالیف، ہڈیوں کے غلاف کے مفصلی درد اور عرق النسا
 وغیرہ میں بھی نافع و کارآمد ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض، زندگی سے مایوس اور غمگین۔

گردن کے غدود سوجے ہوئے، حلق میں جلن جیسے جلتی ہوئی گولی رکھی ہے۔ حلق میں سیاہ رنگ کی جھوٹی جھل پیدا ہو جاتی، حلق میں زخم، حلق کے غدود پھولے ہوئے، گردن کی داہنی جانب کے غدود سخت۔

مہرز میں تشکات، گڑھے میں میٹھا میٹھا درد اور دکھن، پیشاب کا رنگ سیاہ، برتن میں جھوٹے رنگ کے حصے پڑ جائیں۔ سوزاک، آتشک، اعضائے تناسل پر زخم، پستان میں درم، سوجن، مواد پڑ جانا، پستان کے غدود سخت ہوں اور درد کریں۔ بائیں گھٹنے میں بائی کا درد، انگلیوں کے پور سوجے ہوئے، سخت اور جھک دار ہوں۔ بائیں کو لیے میں برانا بائی کا درد۔

زیادتی :- بادل، بجلی، بارش کی تری سے، نمی سے، سرد موسم سے، رات کو، دبانے سے، حرکت سے۔

کبھی :- گرمی سے، خشک موسم سے، آرام سے۔

مصلح :- سیلا ڈونا، کانیا، انیشا، آئرس، مرکوریس

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

فانی سو سٹگما

PHYSOSTIGMA

خصوصی علامات

۱۔ غیر معمولی دماغی تیزی، خیالات کی لامتناہی رو کو روک نہ سکے۔

عام استعمال

زیادہ تر آنکھوں کے امراض میں استعمال ہے۔

عمومی علامات

آنکھوں کو استعمال کرنے کے بعد ان میں درد، آنکھوں کے سامنے سیاہ تارے اترنے دکھائی دیں، آنکھوں کے سامنے بجلی کی چمک، آنکھوں کے پوٹوں اور آنکھوں کے عضلات میں اینٹیٹن (اگیر بکس)، آنکھ کے دھیلے کا لرزنا یا جھپٹکنا۔

عضلاتی نظام کی بھید کمزوری، حرکت میں کمی آجائے (جلبسی میم) کم سن افراد میں دماغی یا جسمانی پراگندگیوں سے لرزہ۔

کمزور اصلی یا چوٹ سے پیدا ہونے والا یا چوٹ سے بڑھ جانوالا گناہ جس میں ذرا سی ہوا سے بیان تک کر پاس سے گزرنے والے آدمی کی سانس کی ہوا سے اضافہ ہو (اٹا پیرکیم، یا ٹیڈیہ و قو بینم، نکس و امیکا، سٹرکینا)۔

زیادتی :- عموماً صبح کو ورزش کرنے سے ، دماغی محنت سے ،
 کبھی :- چلنے سے ، کھل ہوا میں ، آنکھ بند کرنے سے ، خاموشی
 سے ، گرم کمرے میں ۔
 مصلح :- اثر دیا ۔
 طاقت :- مدد بخش کچرا ۳ x

FLUORIC ACID

فلورک ایسڈ

نصوصی علامات

۱۔ ان نو عمر افراد کی تکلفات جو بوڑھے دکھائی دیں۔

عام استعمال

یہ دوا بوڑھے افراد کے امراض میں کارآمد ہوتی ہے یا ایسے اشخاص
 جو قبل از وقت بوڑھے ہو گئے ہوں ، جن کو جلدی جلدی حرکت کرنے
 اور ٹھنڈ سے آرام معلوم ہوتا ہو ، جلد کھردری ہو اور لگاتار خارش
 ہوتی رہتی ہو ، ٹھنڈک سے تسخیف ہو اور گرمی سے تکلیفات پڑیں
 بالخصوص ناخنوں کے نرم پڑ جانے میں بھی یہ دوا کارآمد ہوتی ہے ۔

عمومی علامات

بہت بچے پیدا ہونے پر خواتین کی وریدوں کا پھول جانا، پرانے زخم۔

بڑھے اور نحیف افراد کے اعصاب کا استقامت نظام وریدی کمزور
آتشکی زہر سے یا پارہ کے کثرت استعمال سے بڑیاں گل مٹر رہی
ہوں، متاثرہ مقامات سے تپلا، جلانے والا، خون آمیز متعفن مواد
فاسح ہو۔

آنسوؤں کی تحصیل کا ناسور، آنکھوں کے لئے ہونا قابل برداشت۔

دانتوں کا ناسور، دانتوں سے خون آمیز نکلیں مواد نکلتا رہے۔

فوطے متورم، خواہش جماع میں زیادتی۔

تھام خارج میں خارش جو گرمی سے بڑھے۔

زیادتی :- گرمی سے، بوقت صبح۔

کمی :- چلنے پھرنے سے، سردی سے۔

معاون :- سلیشیا

طاقت :- $3 \times$ یا $4 \times$ یا 30 طاقت

خصوصی علامات

- ۱۔ چہرے کی زردی، بلغمی جھلیوں کا پیلا پن جو ذرا سے درد، تحریک، اکساہٹ یا محنت سے تمنا اٹھیں اور سرخ ہو جائیں۔
- ۲۔ چکر ہتے پانی کو دیکھنے پر۔
- ۳۔ خون حیفی پیلا، پانی کا سا، کمزور کرنے والا۔
- ۴۔ تھے آدھ رات کے فوراً بعد۔
- ۵۔ دست آئے جب مریض کچھ کھائے یا پیے۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر کمزور خون والے نوجوان، کمزور افراد پر مستعمل ہے جن کو جلد سری لگ جاتی ہو، پاؤں سرد رہتے ہوں، بہت زیادہ ذک لگس ہوں، سخت محنت کے بعد تکلیفات بڑھ جاتی ہوں۔

عمومی علامات

نوبتی اور تسکین کا درد سر، چہرہ تمنا یا ہوا، چکر آئیں۔
آنکھوں میں پانی بھا ہوا یا سرخی اور جلن، انک سے خون ہے۔
چہرہ زرد جو ذرا سی بات سے سرخ ہو جائے۔

کھانے سے ذائقہ کڑوا، رات کو کھانے کے بعد غذا قے ہو جائے۔
 پتے دست پانی کے سے، جلن دار، چکنی آؤں یا خون والے۔
 مردوں میں ناسروں اور اقلام، عورتوں میں حیض بار بار کثیر المقدار اور
 عورت تک پہننے والا درد کے ساتھ، سیلان الرحم دور دھیا پانی جیسا۔
 کھانسی جو صرف چلنے یا حرکت کرنے سے عود کر آئے۔
 رات کو شانہ کی ہڈیوں میں، یا کولہے سے ران تک یا پندلیوں
 اور ٹانگوں میں درد۔

بخار میں چہرہ سرخ، ماتھ پر ٹھنڈے، پسینہ بکثرت جس کے
 ساتھ متل ہو۔

زیادتی :- رات کو آرام کرنے سے، خاموش بیٹھنے سے، کھانے سے
 کمی :- آہستہ آہستہ چلنے پھرنے سے، موسم گرمی میں۔
 معادن :- ایوٹا، چائنا، تھے میلس،
 مخالف :- ایٹک ایٹڈ۔

مصلح :- آرنیکا، آر سینکلم الیم، بیلا ڈونا، ہیر پرف، اپیکاک،
 پلساٹیل۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور اوپر۔

CARBOLIC ACID

کاربائلک ایسڈ

خصوصی علامات

- ۱۔ درد بہت تیز جو یکایک آئے۔
- ۲۔ بکے بھاری پیشانی کے درد جیسے ریڑک کی پٹی پیشانی پر کس کر باندھی گئی ہے
- ۳۔ قبض جس کے ساتھ سانس میں سخت تڑپ، تعفن ہو (ایریم سورینم)

عام استعمال

یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جبکہ کسی حصہ جسم سے بدبو دار، سٹرا
ہو، مادہ خارج ہوتا ہے، کمزوری بہت ہوتی ہے اور ضعف و نفاہت
بدرجہ کامل ہو۔ تمام جسم سرد پسینہ سے تڑپتا ہو۔

عمومی علامات

قوتِ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت بہت تیز ہو جاتی ہے، سانس و
پانسانے نہایت بدبو دار ہوں، قبض، سرخانی، ذیابیطس، ریاح، چھین
اسہال۔

کام کرنے کو جب نہ چاہے، آنکھ کے گرد حلقہ میں درد۔

انفلوئنزا، منہ اور حلق میں زخم، بدبو دار رال نکلے، حلق سے کچھ
نکھانے جاسکے۔ پیٹ میں نفخ، متلی، حاملہ عورتوں کی متلی،

تبض میں نہایت بدبودار ریاخ خارج ہوں۔ پیٹ میں اینٹھن، اسہال
مستدرات کے حیض یا سیلان الرحم نہایت بدبودار۔
مخالف کار باکب ایڈر سے بلی ہوئی جگہ پر گھسیں یا نباتاتی تیل
ہرگز نہ لگائیں۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CARBO ANIMALIS

کاربوانیمالس

خصوصی علامات

- ۱۔ بوجھ اٹھانے سے جلد موچ آجائے۔
- ۲۔ حیض نمودار ہونے کے بعد مریضہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ
بول بھی نہ سکے۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر خنازیری مزاج والے افراد میں مستعمل ہے جن کی
دریدی پھولی ہوئی ہو، رطوبت مہلبیوں کا رنگ اور غوائ ہو غدد
سخت ہو گئے ہوں، سوجھے ہوئے ہوں اور ان میں بڑا سخت درد
ہوتا ہو۔

عمومی علامات

ماغزہ کا فعل بہت سست، غذا کے ڈکار دینے تک آئیں،
مریض کچھ کھاتے تو اس کا جی متلانے لگے۔
چہرے پر تانبے کے رنگ کی چھنیاں، کاہلی اور نقاہت
بہت ہو۔

درود سر شدید، مریض رات بھر سر پکڑے کمر بیٹھا ہے۔
خون کا دورہ کمزور، حرارت غریزی نہایت کم ہو گئی ہو۔
بڑھاپے کے امراض جبکہ وریدی پھول گئی ہوں، رخسار اور
ہونٹ نیلے پڑ گئے ہوں اور سخت نقاہت ہو۔
زیادتی :- مجامعت کے بعد، جسم سے نیمتی رطوبتوں کے اخراج
کے بعد، نیم شب کے بعد، تخیف چھوٹے سے۔
معاون :- کلیر یا فاس۔

مخالف :- کاربوویک۔

مصلح :- آرسینکیم اہم، کیفر، کالیا، لیکے کس، نکس و امیکا،
سرکہ۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳ طاقت تک معہ کئی تکالیف میں۔
۳۰ طاقت سے اوپر پرانی تکالیف اور مرنی میں۔

CARBO VEG.

کاربو ویج

خصوصی علامات

- ۱۔ تکلیفات بہت زیادہ گرم ہو جانے سے ۔
- ۲۔ مردوں کا سا چہرہ ، سرور چہرہ ٹھنڈے پینے کے ساتھ ۔
- ۳۔ ہاضمہ کی کمزوری ، سادہ سے سادہ غذا بھی موافق نہ آئے ۔
- ۴۔ عروق شریہ میں دوران خون کی کمی کے باعث مسلسل نچکا جھلنے کی خواہش کرے ۔
- ۵۔ رات کے وقت اکثر جاگ اُٹھے ، گھٹنے ٹھنڈے ہو جانے کے باعث ۔
- ۶۔ بیماری کے آخری مرحلہ میں ٹھنڈے پینے ، ٹھنڈے مائیس ، ٹھنڈی زبان اور آواز کے نہ رہنے کے ساتھ ۔

عام استعمال

شدید کمزوری ہو چکی ہو ، رطوبات کے اخراج میں زیادتی سے ترشش کے ہو ، پیٹ اور آنتوں میں خاص کر ناف سے اوپر کے حصہ میں ریاح جمع رہی ہو تو یہ دوا کار آمد ہوتی ہے ۔ مریض کے جانبر ہونے کی امید ختم ہو رہی ہو تو نسا اوقات یہ دوا جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ۔

عمومی علامات

شدید طور پر کمزور کر دینے والی بیماریوں یا رطوباتِ زندگی کے نتائج ہو جانے کے اثرات بہ۔

ناقص غذاؤں مثلاً سُری ہوئی مچھلی، گوشت یا چربی غذاؤں سے پیدا شدہ تکلیفات۔

کمزور اور گرمی ہوئی صحت میں کسی مخرج سے سیلانِ خون ہو۔
معدہ اور آنتوں میں رنج کا اجتماع جس کی زیادتی لیٹنے سے ہو۔
آواز بیٹھ جیسے شام کے وقت، شام کی مرطوب ہوا سے یا گرم مرطوب موسم میں۔

دست، بار بار، از خود مردہ کی سی بو والے جس کے بعد صبح ہو
مردوں میں خواہشِ جماع بالکل دب جاتے، جویاں مٹی ہو،
پاخانہ کے وقت ندی خارج ہو، مباشرت میں جلدِ اخراج۔

عورتوں میں حیضِ کثیر المقدار اور سیلانِ الرحم سفید دودھ کا
ساقٹلا اور گاڑھا جو صبح کو زیادہ ہو۔

زیادتی :- چربی غذا سے، صبح کے وقت، تبدیلیِ موسم میں
خاص کر گرم اور مرطوب موسم میں۔

کھسی :- پٹکھا کرنے سے، سرد ہوا سے، فوکاروں سے۔
معائنہ :- کال کارب، چائنا۔

مصلح :- آر سینکیم ایلیم، کافیا، ایکے کس، کیمفر
طاقت :- معدہ کے پچاؤ میں ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک اور کمرے
کے لئے ۲۰ طاقت و نیز زیادہ طاقت میں کار آمد ہے۔

CAUSTICUM

کاسٹیکم

خصوصی علامات

- ۱۔ بہت زیادہ زبردور اور زبردی مائل رنگت والا افراد۔
- ۲۔ چھلین یا زخم کا سادہ جسم کے کسی حصہ میں۔
- ۳۔ قبض صرف کھڑے ہونے کی صورت پاخانہ باسانی خارج ہو۔
- ۴۔ کھانسی، سینہ میں چھلین اور پھوٹے کے سے درد کے ساتھ۔
- ۵۔ کھانسی، سانس باہر نکالنے پر۔
- ۶۔ آواز بیٹھا جائے حلق میں چھلین کے ساتھ۔
- ۷۔ حیض صرف دن کے وقت۔
- ۸۔ فالج، واحد حصص کا جیسے آلاتِ نطق، زبان، چھوٹے، بازو، ٹانگیں یا مثانہ۔

عام استعمال

اس کا اثر حرام مغز اور حلق کے اعصاب پر ہوتا ہے حلق اور ہڈی کی مانی میں یا جسم کے کسی دوسرے چھوٹے واحد حصہ کا فالج ہوتا ہے دوا نالغ ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غمگین، مایوس، آنکھوں میں آنسو، بے چین۔
 بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں تشنجی دورے (ٹانم)
 آنکھوں کے ارد پر والے پوٹے کھلے نہ رہ سکیں بلکہ نیچے والے پوٹوں
 پر گر پڑیں۔ نظر دفعتاً کمزور ہو جاتے۔

بچے چلنا دیر میں سیکھیں یا لڑکھڑا کر پلتے ہوں، باسانی گر جائیں۔
 پیشاب از خود، کھانسی سے، جھکے سے یا چلنے سے۔
 پرانی چوٹیں پھر ابھرتی ہیں۔

نالیج عموماً داسنی طرف ٹھنڈی ہوا لگ جانے سے۔

زیادتی :- ٹھنڈی خشک ہوا میں، صاف موسم میں، گاڑی کی حرکت سے۔
 کبھی :- مرطوب ہوا یا مرطوب موسم سے، گرمی سے، بستر کی گرمی سے۔
 معاون :- کاربوئیک۔

مخالف :- ناسفورس، کافیا۔

مصلح :- گوائیکم، کس و امیکا۔

طاقت :- ۳ سے ۲۰ تک (نالیج اور پرانے امراض میں اونچی طاقتیں)

COFFEA CRUDA

کافیا کروڈا

خصوصی علامات

- ۱۔ دماغ اور جسم کی غیر معمولی چستی اور فعالیت۔
- ۲۔ زیادہ خوشی کی حالت میں علامات بڑھ جائیں۔
- ۳۔ یکایک جذباتیت یا خوشی یا غم کی خبروں کے اثرات مابعد۔

عام استعمال

حد سے زیادہ ذکاوت کے باعث اگر مختلف قوی غیر طبعی طور پر بہت تیز ہو جائیں مثلاً بنیاتی، سماعت، سونگھنے، چکھنے، یا مچھونے کی قوت، تو یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض خیالات کی یورش کا شکار جس کے باعث سونا بھی مشکل ہو۔ مختلف کام بہت جلد کرنا چاہے۔
ورد سر، زیادہ دماغی محنت، سوچ بچا بہ یا بولنے کی زیادتی سے۔
دانت کا درد جسے ٹھنڈک سے سکون ہو۔
زیادتی :- یکایک دماغی جذبات سے خصوصاً خوشی سے،
منشیات سے۔

کمی :- گرمی سے، لیٹ جانے سے، منہ میں برف رکھنے سے۔

معاون :- ایکونائیٹ

مخالف :- کینتھرس، کاسٹیکم، کاکوسس، اگنیشیا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک

COLCHICUM

کالچیکم

خصوصی علامات

۱۔ سونگھنے کی قوت میں تیزی، کھانا پکنے خصوصاً مچھلی، انڈے

مرغن گوشت کی خوشبو سے متلی اور غشتی۔

۲۔ پیٹ نفخ سے بھید اچھا ہوا۔

۳۔ معدہ اور شکم میں جلن یا برف کی سی ٹھنڈک۔

عام استعمال

ہائی کے اور گٹھیاوی درروں (وجع المفاصل) وغیرہ میں یہ دوا
بہت زیادہ مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

ماتھے، سر یا کان یا چہرے کی جلد میں جھنجھٹا بہت محسوس ہو،

دانت یا تالو میں درد، رال بکثرت۔

پاخانہ قلیل نہایت درد کے ساتھ اسہال ہو، آؤں آمیز، کانچ
نکلا۔

پیشاب بار بار، جلن پیشاب کی نالی میں، پیشاب مقدار میں مختل۔
ہاتھ، پیر کی انگلیوں میں ٹیس اور جھنجھٹا ہٹ۔

زیادتی :- حرکت سے، محنت سے، غروب آفتاب سے
طلوع آفتاب تک، نیند اچاٹ ہونے یا خوراک دیکھنے سے
کمی :- جھکے سے یا سکون کے ساتھ لیٹنے سے۔

مخالف :- ایسی ٹمک ایٹڈ۔

مصلح :- بیلاڈونا، کمیفر، لیٹم پال، کوکولس، نکس و امیکا،
پلساٹیل، سپاٹی جیلیا، شہد اور شکر۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

KALMIA

کالمیا

خصوصی علامات

۱۔ درد گول گھنے کے سے جن کا رخ اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔
(کیٹیس)

عام استعمال

یہ دوا شدید اعصابی درد، بائی کے دریا گھٹیا دی تکلیفات میں کار آمد ہوتی ہے۔

عمومی علامات

قلبی تکلیفات جو بائی کی وجہ سے پیدا ہوں یا بائی کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ہوں۔

درد چپنے والے، تیر لگنے کے سے، دبانے والے۔
بائی کے درد جو ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوا کریں جوڑے گرم اور متورم ہوں۔

دائیں آنکھ اور آنکھ کے گڑھے میں شدید درد جو سورج کے چڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھے اور زوال کے ساتھ کم ہو۔
زیادتی :- آگے کی طرف جھکنے سے، نیچے دیکھنے سے، حرکت سے کھل ہوا میں۔

معادن :- بنزوک ایٹ، سپائی جیلیا۔

مصلح :- ایکونائٹ، بیلا ڈونا۔

طاقت :- مدرٹسکو سے ۳۰ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ پرانی خونی بواسیر، درد وال۔
- ۲۔ پاخانہ سخت درد کے ساتھ اور بہت ریاح کے ساتھ۔

عام استعمال

خصوصی طور پر خونی بواسیر میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

پیشانی میں درد، بواسیر کا خون رک جانے سے مزمن نزلہ۔
 نہایت شدید قبض، بواسیر جس میں درد ہو اور مستے سو جے ہوتے
 ہوں۔ متعذر میں لکڑی کے ٹکڑے بھرے ہوتے معلوم ہوں، حاملہ
 عورتوں کا قبض۔

زیادتی۔ سردی سے، دماغی جذبات کی وجہ سے۔

کبھی۔ گرمی سے۔

مصلح۔ نکس و امیکا۔

طاقت۔۔۔ مدرٹنچر سے ۳ طاقت تک

(دل کی تکالیف میں اونچی طاقتیں مستعمل ہیں)

خصوصی علامات

- ۱۔ پیٹ میں شدید قولنجی درد جس سے مریض دوہرا ہو جائے۔
- ۲۔ پیٹ کے درد کو دبانے سے سکون ہو۔
- ۳۔ جگر سر کو گھمانے پر خصوصاً بائیں طرف۔

عام استعمال

درد قولنج کی خصوصی دوا ہے۔

عمومی علامات

پیٹ کا درد جو کھانے پینے سے بڑھ جاتے، حیض شرمندگی سے یا غم سے یا غصہ سے رک جاتے، حیض میں شدید درد شکم۔
 عرق النسا کا انگیٹھن والا درد، متاثرہ جانب لیٹنے سے زیادہ ہو
 گولی کے سے درد بھلی کے جھٹکوں جیسے، بائیں ٹانگ میں اوپر سے
 نیچے تک آتیں۔

ذیادتی :- غصہ سے، بے عزتی سے۔
 کسہی :- گرمی سے، سر کو آگے جھکا کر لیٹنے سے۔
 معاون :- مرکبہ ریس، کیمریلا، سٹانی سیگیا۔

مصلح :- کیفر، کاسٹیکم، کمیوٹیل، کانیا، اوپیم، سٹرونتھس۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۴ طاقت تک اور اوپر۔

کالوفائلم

CAULOPHYLLUM

خصوصی علامات

- ۱۔ سیلان الرحم، چھوٹی لڑکیوں میں (کلکیریا)
- ۲۔ تشنجی سختی رحم کے منہ میں جس کے باعث وضع حمل جلد نہ ہو۔

عام استعمال

یہ دوا خواتین کے عوارض کے لئے مستعمل ہے جو حمل کے دوران یا وضع حمل کے وقت یا دودھ پلانے کے زمانہ میں لاحق ہوں۔

عمومی علامات

عورتوں میں چھوٹے جوڑوں کے درد جو جگہ بدلتے رہیں، درد نفیسی اور تشنجی ہوں۔

لیکودیا، جنین وار اور کمزور کرنے والا۔
 استقار حمل کا میلان رحم کی کمزوری کے باعث۔
 چھوٹے درد زہ وضع حمل کے آغاز میں۔

گمزوری کی بناء پر یا جلد وضع حمل ہو جانے سے یا اسقاط کے بعد
مسل سیلانِ خون ہو۔

وضع حمل کے بعد کے درد، تقاس عرصۃ تک جاری رہے۔
زیادتی :- کھل ہوا میں، تہوہ سے۔
کمی :- کمرے میں۔ پاخانہ پھرنے سے۔
مصلح :- کافیہ۔

طاقت :- مدرٹنکچر سے ۳ طاقت تک عام طور پر مستعمل ہے۔

KALI BICHROM

کالی باتیکرام

خصوصی علامات

۱۔ بلغھی جھلیوں کی تکالیف، رطوبتِ سخت، گاڑھی تاردارہ
جو جسم کے حصص کے ساتھ چپک جائے اور تاروں کی صورت
میں کھنچ سکے۔

۲۔ دردِ چھوٹے چھوٹے مقامات میں جو ایک جگہ سے دوسری
جگہ جلد جلد منتقل ہو جائیں۔

۳۔ ناک کی جڑ میں دبانے والا درد، ناک سے پیڑیاں یا
کھرنڈ۔

۴۔ گوا پھولا ہوا جیسے ہوا بھری ہو۔

۵۔ کروپ کھانسی، کھکھری، دھات کے مزہ کی جس کے ساتھ سخت بلغم یا صبح سویرے جاگنے پر بڑھکی طرح لچکدار بلغم سانس میں وقت کے ساتھ نکلے۔

۶۔ درد سر، حملہ کے قبل بنیائی میں دھندلا پن یا بینائی جاتی ہے۔
۷۔ تکالیف بالعموم موسم گرما میں ہوں۔

۸۔ اعصابی درد ہر روز ایک ہی وقت پر آتے ہیں (چائیم سلف)

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر فربہ اور موٹے تاسے افراد یا بچوں پر مستعمل ہے جو اس دوا کے بالمثل نزلہ دہی، آنکھ والی یا سوزائی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں یا جن کو کروپ کھانسی یا خناق کے عوارض رہتے ہوں۔

عمومی علامات

کھلی ہوا میں زکام حاصل کرنے کا میلان۔

ہاتھ کے درجہ کے بعد دیگرے آلات ہضم کے عوارض کے ساتھ چھ ماہ کے وقفہ سے ہوں۔

ناک کی درمیانی دیوار میں زخم، خون ملی رطوبت کے ساتھ۔

کھانسی شدید کھڑا ہٹ والی حلق میں تار دار بلغم والی۔

تالو میں گہرے، گوشت کھا جانے والے زخم، اکثر آتشکی۔

زیادتی۔ صبح کے وقت، کپڑے اتارنے سے، دبانے سے، گرم

اشیاء سے، چھوٹنے سے گہرا سانس لینے سے۔

کسی :- جلدی علامات ، سرد موسم میں آرام پانی ہوں ، گرمی ، کھل ہوا سے ، جھکنے سے ، شام کو ، کھانے کے بعد ، کھانے سے ، تقوڑی نیند سے ، قے کرنے سے ۔

مصلح :- آر سینیکم البوم ، لیگے کسس ، پیسا ٹیلا ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر ۔

بیرونی طور پر استعمال کے لئے آٹھ اونس پانی میں ایک گرین خاص یعنی کروٹو کالی بائیکرام ملا کر کوشن بھی تیار کیا جاتا ہے ۔

KALI BROM.

کالی برومیدم

خصوصی علامات

۱۔ قوت حس جاتی ہے ۔

۲۔ اعصابیت ، ہاتھ اور انگلیاں مسلسل حرکت میں رہیں ، ہاتھ مسلسل حرکت کرے ۔

۳۔ حافظہ جواب دے جائے ، بھول جاتے کہ بات چیت کیسے کرے ۔

۴۔ بچے رات کو ڈر جائیں گے ۔ (کالی فاس)

عام استعمال

مرگی ، شدید قسم کے تشنہ ، حلقہ کی خرابی ، حد سے بڑھی ہوئی اعضا

لکنت، نیز احتلام میں عام طور پر متعل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض کو رونے اور سخت ترین غم کے توہمات کے
دوڑے ٹپریں جن پر مریض قابو نہ پاسکے۔ پست حوصلگی، بے چینی، بے خوابی۔
تالو، حنجرہ، پیشاب کی نالی وغیرہ میں بے حسی ہونے کی کیفیت
رہ کر اٹھ۔

بچہ حالت خواب میں ڈرے، چغھے چلائے، سوتے میں چلے پھرے
(سلیٹیا)
تشہی دوسے، دانت نکالنے کے زمانہ میں، کالی کھانسی میں،
بحالت ورم گردہ۔

مرگی پیدا کنشی یا آتشکی، حیض سے ایک دن پہلے یا نئے چاند پر
کیل، چہرے پر، سینہ پر یا کندھوں پر۔
زیادتی۔ اپنے عارض کے بارے میں سوچتے رہنے سے۔
کسمی :- جب داغ یا جسم مختلف مشاغل میں مصروف رہے۔
مصلح :- کیفر، بیگونا تنس، نکس و امیکا، نہ نکم۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

KALI CARB.

کالی کارب

خصوصی علامات

- ۱۔ دروسوئیاں چھینے کے سے، تیرگنے کے سے۔
- ۲۔ درد، متاثرہ جانب لیٹنے سے۔
- ۳۔ چھو جانا برداشت نہ کرے۔
- ۴۔ اکیلا ہونے سے سخت نفرت ہو۔
- ۵۔ اوپر کے پوٹوں اور بڑے درمیان تقبیل کا سادرم۔
- ۶۔ آنکھوں کی کمزوری جمانے کے بعد۔
- ۷۔ دانت کا درد صرف اس وقت جب کچھ کھانا ہو۔
- ۸۔ مکر میں درد۔
- ۹۔ کھانسی، ابکائیوں اور غذا کی تے کے ساتھ۔
- ۱۰۔ حیض سے ایک تہفتہ قبل مریضہ بدتر محسوس کرے۔

عام استعمال

کئی خون، عام کمزوری، نزلہ کیفیتوں، مسلسل درد کمر، بچوں کے نمونیا، بوڑھوں کے عوارض، جگر کے پرانے امراض، استسقاء، دم سے اخراج خون، صفراوی پتھری، احتیاس حیض وغیرہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

معدہ تنا ہوا اور ذکی الحس، ہر غذا کیج میں تبدیلی ہوتی محسوس ہو۔
 سردی یا زکام حاصل کرنے کی بھید و غیبت۔
 دمر میں سکون ہو جب اٹھ کر بیٹھ جائے یا آگے کی طرف جھکے۔
 نکلنے وقت ندرخہ میں چھین دار درد یا پیٹھ میں درد۔
 قبض، پاخانہ سے ایک دو گھنٹہ قبل سوئیاں چھینے کے سے
 قریب درد۔

قلب چربی آنے کی رغبت
 ذیادتی :- جماع کے بعد، ٹھنڈے موسم میں، تہوہ سے، صبح تین بجے
 باتیں یا مافوقہ کروٹ لیٹنے سے۔
 کسبی :- گرم موسم میں چاہے مرطوب ہو، دن میں، حرکت کرنے سے
 معاون :- کاربوئیج اور نکس و امیکا۔
 مصلح :- کیمفر، کافیا۔
 طاقت :- ۳۰ طاقت اور اوپر۔

CROTON TIG.

کروٹن ٹیگ

خصوصی علامات

- ۱۔ دست، جیسے ہی مریض کچھ کھاتا یا پیتا ہو، دست زبردستی پانی کے ساتھ
- ۲۔ سینہ میں کھینچنے والا درد، پستان سے شروع ہو کر کندھے تک۔

عام استعمال

دستوں کو روکنے کے لئے عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔

عمومی علامات

پانی کے سے پہلے دست، مقدار میں زیادہ، مسلسل پاخانہ کی حاجت جس کے بعد یکایک پاخانہ آتا ہے جو مہرز سے گولی کی طرح نکلتا ہے۔ پانی سے قبل آنسوؤں میں پانی پھپکتا محسوس ہوتا ہے۔

جلد میں یا آلات تناسل پر شدید خارش، تمام جسم پر پکوتہ۔

تیکہ پر سر رکھتے، تکیہ سے کھانسی دورے والی شروع ہو جاتی، ایسا شکل ہو۔

زیادتی :- ذرا سی غذا سے کوئی چیز پینے سے، نہانے سے، موسم گرمی میں۔

مصلح :- کالی بزم۔

مصلح :- اناکارڈیم، انٹیم ٹارٹ، کلیمٹیس، رسٹاکس، رینین کولس۔
طاقت ۱- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CROCUS SATIVA

کروس سٹائیوا

خصوصی علامات

- ۱- احساسات میں متواتر تبدیلیاں گھڑی میں بچہ خوش گھڑی میں بچہ مایوس۔
- ۲- مریض کو یکایک ہی کسی پہ پیاد آئے اور پھر یکایک شدید غصہ۔
- ۳- سیلانِ خون، گاڑھا سیاہ جس کے لمبے لمبے تار لٹک جاتیں۔
- ۴- دردِ سر جس میں ماہواری کے مقررہ دو تین روز میں نہ یادتی ہو۔
- ۵- نکسیر، ہر قطرہ لمبے تار کے کی صورت میں خارج ہو۔

عام استعمال

یہ دوا زیادہ تر سیلانِ خون کو روکنے کے کام آتی ہے۔

عمومی علامات

دردِ سر، سن یاس کے زمانہ میں یا ماہواری کے دنوں میں۔

آنکھوں میں احساس جیسے ان میں دھواں لگ رہا ہے، یا ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، زور سے بھینچنے پر آرام محسوس ہو۔

نکسیر پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے ساتھ، چمکدار سرخ خون کی (کاربرجین) بچوں میں جو بہت بڑھ چکے ہوں۔ (کلکیر یا فاسفورس) جسم کے اندر کسی حصہ میں زندہ چیز کی حرکت کا احساس۔ کوریا، ہشیریا، واحد عضلات میں تشنجی سکڑن۔ زیادتی:- لیٹ جانے سے، گرم موسم میں، گرم کمرے میں، صبح کے وقت، بھوک کی حالت میں۔ ناشتہ سے قبل، کسی چیز پر نظر جا کر دیکھنے سے۔

کسی:- کھلی ہوا میں۔
معاون:- چائنا، نکس و امیکا، پلسا ٹیلا، سلفر۔
طاقت:- مدہ ٹینکچر سے ۳۰ طاقت تک۔

KREOSOTUM

کریازوٹ

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض اپنی عمر کی مناسبت سے زیادہ لمبا ہو۔
- ۲۔ بچے بوڑھے نظر آئیں، جھریاں پڑی ہوئی۔
- ۳۔ مستورات میں سن ریاس کی تکلیفات۔
- ۴۔ بچوں میں جو نہی دانت ظاہر ہوں گلنے مٹنے لگیں۔
- ۵۔ حوض کا زیادہ سیلان جب مریض لٹی ہو۔

- ۷۔ حیض بار بار رک کر جاری ہو۔
- ۸۔ پیشاب صرف لیٹی ہوئی حالت میں آسان سے آئے۔
- ۹۔ سچے کا پیشاب پہلی نیند کی حالت میں نکل جائے۔
- ۱۰۔ لیکوریا جس میں زیادتی دو حیضوں کے درمیان ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے اشخاص پر مستعمل ہے جو اپنی عمر کی نسبت زیادہ بڑے معلوم ہوں یا ایسے جھڑیوں والے سچے جوانی عمر سے زیادہ بڑے نظر آئیں۔

عمومی علامات

بچوں کے دانتوں میں درد، مسوٹھے سیاہی مائل سرخ یا نیلے،
دانت بوسیدہ۔
مزمن براںزکائی ٹیس یا مرضِ سل جس میں بلغم بدبودار اور بکثرت ہو۔
ابکائیاں، غذا کھانے کے کئی گھنٹہ بعد قے، معدہ میں دھن۔
پیشاب بدبودار، اندام نہانی میں خارش۔
خارشِ شام کے وقت بے حد شدید۔
زیادتی بہ کھلی ہوا میں، سردی میں، آرام کرتے وقت، لیٹنے پر،
حیض کے بعد۔
کبھی بہ گرمی سے، حرکت سے، گرم خود اک سے۔
مخالف بہ کار بودیج، چائنا۔

مصلح :- ایکونائیٹ ، فیرم ، نکس و امیکا ۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ، ۳ طاقت اور اوپر ۔

CRATAEGUS

کمزیرے ٹگس

خصوصی علامات

- ۱۔ دل کی کمزوری اور دل کے فعل کی بے قاعدگی ۔
- ۲۔ شریانوں کی دیواروں کا سخت ہو جانا ۔
- ۳۔ ذیابیطس خاص کمزوروں میں ۔
- ۴۔ قلبی استسقاء
- ۵۔ خفیف مشقت سے بھی سانس پھول جائے لیکن نبض کی رفتار نہ زیادہ نہ بڑھے ۔
- ۶۔ دل کا پھیل جانا ، دھڑکن کی پہلے آواز کمزور ہو ۔
- ۷۔ نبض بے قاعدہ ، مدھم ، ضربیں چھوٹے چھوٹے کی جلیں ۔
- ۸۔ دل کے مقام پر خاص کر بائیں منتسل کی ٹڈی کے نیچے درد ۔

عام استعمال

یہ دوا خاص کر دل کے عوارض میں مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

مرضِ عصبِ مزاج اور چڑچڑاہو، کمر، گردن اور سر میں درد،
ذہن طور پر پکند ہو، آنکھوں میں سوز و ششی کیفیت اور ناک سے رطوبت
کا اخراج۔

شاہِ رگ کی بیماری، کھانسی، نبض تیز چلے اور بے قاعدہ ہو، دل
میں درد ہو، جلد پر ٹنڈک محسوس کرے، لمبھتوں کی انگلیاں یا پاؤں
کے نیچے نیگیوں، تمام علامتیں مشقت سے یا جذباتیت سے بڑھیں۔
قلب کی مرض میں بیماریا جس کے ساتھ شدید کمزوری ہو، شریانوں کی دیواروں
کا سخت ہوجانا۔ یہ دوا شریانوں کی اندرونی سطح پر چسے ہوئے مادوں کو
تخلیل کرنے کی تاثیر رکھتی ہے۔

جلد پر پسینہ کی کثرت، جلد پر ابھار نکلیں۔
شاہِ رگ کے مریضوں کی جیواہی۔

زیادتی :- گرم کمرے میں۔

کسی :- تازہ ہوا سے، سکوت اور استراحت سے۔

تعلق :- سٹروینٹس، ڈیسی ٹیلیس، ناجا، کیٹس۔

طاقت :- درمیان کو ایک ندرہ قطرے تک نی حرکت۔

دقتِ بخش نتائج حاصل کرنے کے لئے کچھ عرصہ تک اس کا استعمال جاری
رکھنا ضروری ہے،

خصوصی علامات

۱۔ معمول سے جذباتیت و متحرک ٹہ جائے۔

عام استعمال

بغنی سوزاک، دق، مستورات کی سن پائس کی شکایات میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر بوجہ مضحل۔

دورانِ خونِ سر کی طرف یا سینہ میں بائیں جانب۔

دل کی بیماریوں سے پیدا شدہ مرگی۔

شرابیوں میں شراب ترک کرنے پر مختلف تکالیف۔

موٹ خواتین میں سن پائس کے عوارض۔

زیادتی :- معمول محنت سے اور موسمِ سرما میں۔

کبھی :- مکمل آرام سے، گرم سے، گرم کمرے میں۔

مصلح :- کاربوڈیک، گلوٹامین، پلسٹیل۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲ طاقت تک۔

کلیریفاس

CALCAREA PHOS.

خصوصی علامات

- ۱۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور، بمشکل کھڑے ہو سکیں، دیر میں چلنا سیکھیں۔
- ۲۔ ہڈیاں نرم، پستلی تپلی اور آبسانی ٹوٹ جانے والی، تالو بہت دیر تک کھلے رہیں، یا بل جائیں اور پھر کھل جائیں۔
- ۳۔ مریض جب تکالیف کے بارے میں سوچے تو تکلیف زیادہ محسوس کرے۔
- ۴۔ پیٹ میں درد کھانے کی ہر کوشش پر۔

عام استعمال

ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی میں عام استعمال ہوتا ہے۔

عمومی علامات

دبلے پتلے افراد میں خون کی کمی۔

بچوں میں دانست نہ کانے کے زمانہ میں دست اور ریاچ۔

نخے بچوں کی ناف سے خون آمیز رطوبت کا اخراج۔

ہڈیوں کی کمزوری، ریڑھ کا استھن کمزور، ٹیڑھے ہونے کا میلان، جسم

کا بوجھ سہانا دشوار ہو، ٹوٹی ہڈی بمشکل جڑے۔

بھس والی نوجوان لڑکیوں کے چہرہ پر کیلی۔

مقدم میں ناسور کے بعد دیگرے سینے کی ترکیب کے ساتھ (بربرک)
 زیادتی۔ مرطوب ٹنڈے موسم میں، برف پگھلتے وقت۔
 کسی۔ موسم گرمیاں، گرم اور خشک ہوا میں۔
 معاون۔ پیر، روٹا، نہنم ٹیلیکیم، سلفر۔
 طاقت۔ پہلی طاقت سے۔ طاقت تک اور اوپر۔

CALCAREA CARB.

کلکیریا کارب

خصوصی علامات

- ۱۔ فریہ ہونے کا میلان۔
- ۲۔ بچوں میں جلد زکام ہونے کا میلان۔
- ۳۔ سر میں جمید پسینہ جب ستا فو۔ (سلیشیا، یعنی کولا)۔
- ۴۔ بحالت بیماری یا بیماری کے بعد انڈوں کی نہ رکنے والی خواہش۔
- ۵۔ موٹائی تیزی کیوں میں جلد بٹھکنے کا میلان۔
- ۶۔ حیض بہت جلد، مقدار میں زیادہ اور بہت دنوں تک رہے۔
- ۷۔ مستورات میں پاؤں ٹنڈے اور نڈار رہیں، بہتر میں مسلسل سرور۔
- ۸۔ ذرا سی تحریر خون میں کدو بارہ زیادہ مقدار میں جاری کرے۔
- ۹۔ امراض جو غذا کے جذب و بدن نہ بننے سے پیدا ہوں، ہڈی کے نظام کی نشتر نماک بنائی۔

۱۔ جسم کے واحد حصص پر ٹھنڈک ۔

۲۔ زکام جلد لگ جانے سے بے حد میلان ۔

عام استعمال

نور نشوونما سے متعلقہ عوارض و تکالیف میں عام طور پر مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

مریض بغنی مزاج ہو، زنگ گورا، فریہ ہونے کا میلان ۔

بچوں میں سر اور پیٹ بڑا ہو، تالو کھٹے ہوئے، ہڈیاں نرم اور آہستہ آہستہ بڑھیں ۔

بچوں میں خم، خصوصاً بڑھک کی اور لمبی ہڈیوں میں ۔

بچوں کے دانت دیر میں اور شکل سے نکلیں، چننا دیر میں سکیں، آلات ہضم میں تیزابیت، کھٹے ڈکار، کھٹی تہ اور کھٹے پاخانے،

جلد جلد بڑھنے والے افراد میں پھیپھڑے کے عوارض ۔

پسینہ جسم کے واحد حصص کا ۔

زیادتی :- دماغی محنت سے، ذہنیہ چڑھنے سے، ہر قسم کی سردی سے،

پانی سے، نہانے سے، مرطوب ہوا یا موسم سے، پوسے چاند

میں، کھڑے ہونے سے ۔

کسی بد خشک آب و ہوا اور موسم میں، درد لیٹنے والی جانب

پھینکنے سے

معاون :- رسٹا کس، بیلا ڈنڈا، لائیو لوڈیم، سلیشیا

مخالف :- بریٹیا کارب، برائن اونیا، کالی بائیکرام، نائٹرک ایسڈ، سلفر۔
مصلح :- برائن اونیا، چائنا، کیمفر، بیپر، آئیوڈیم، اپیکاک، اسپیا،
نکس و امیکا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

COCA

کوکا

خصوصی علامات

- ۱۔ مایوگیائی کیفیت عصبی تھکن سے، شرمیل پن۔
- ۲۔ تنگی تنفس کھلاڑیوں میں، سانس چھوٹی۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے افراد پر استعمال ہوتا ہے جو کہ شاہ زوری
کے کرتب اور کھیل دکھاتے ہوں یا پیاروں پر چڑھتے ہوں اور کوتاہ دمی
اور نیز دھڑکن کے شاک ہوں یا ایسے افراد جو بہت زیادہ دماغی یا
جسمانی مشقت کے باعث دماغی اور اعصابی تھکن کا شکار ہو جائیں۔

عمومی علامات

اعصاب کے فعل میں نقص اور ساتھ ہی ہضم کی خرابی۔

سر میں چنگ، سر کی پشت اور گردن میں درد یا درد شقیقہ، خاص کر
 اگر یہ عوارض تصکاوٹ اور مانگی کی وجہ سے ہوں، سردی سے پہلے
 روشنی کی لہریں آنکھوں کے سامنے پھریں اور ساتھ ہی پھر آئیں۔
 پھیپھڑوں سے خون کا اجڑا سیل کا پہلا درجہ۔
 دل کی دھڑکن جو کہ شکم میں ہوا کے رک جانے کے باعث یا زیادہ
 محنت کرنے کے سبب بڑھ جائے ہو۔
 دانتوں کا گھنا سڑنا۔

آواز کے بیٹھ جانے کی صورت میں اس دوا کے پانچ پانچ قطرے ہر
 نیم گھنٹہ کے بعد استعمال کرنے سے دو گھنٹہ میں آواز ٹھیک ہو
 جاتی ہے۔

زیادتی :- اوپر چڑھائی چڑھنے سے۔
 کھس :- شراب سے، سواری سے، کھلی ہوا میں، تیز چلنے سے۔
 مصلح :- جلیبی میم۔
 طاقت :- مدر ٹنکچر سے ۳ طاقت تک۔

COCCULUS

کوکولس

خصوصی علامات

- ۱۔ گاڑی، کشتی یا ریل گاڑی میں سواری سے متلی یا تے یا چلتی ہوئی کشتی کو دیکھنے سے متلی یا تے ہو۔
- ۲۔ وقت بہت جلد جلد گزرتا محسوس ہو۔
- ۳۔ اثرات بد، بے خوابی کے، دماغی تحریک کے، اور راتوں کو جاگنے کے۔
- ۴۔ حیض کے دوران مریض اتنی کمزور ہو کہ کھڑی نہ ہو سکے۔

عام استعمال

ہسٹیریا، عصبی عوارض، مرگی، تشنجی یا فالجی امراض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

مریض یا مریض اباحش طبعیت کے ہوں۔

سر کا درد، گردن کے پچھلے حصہ میں اور گردی میں جو ریڑھ کی طرف جاتے، ساتھ ہی متلی ہو، چیت لیٹنے سے زیادتی، درد سر متلی اور تے کے ساتھ کسی قسم کی سواری سے۔
مہوک نہ ہو، منہ کا ذائقہ دھات کا سا (مرکبوریس)

جسم بچید سست، کھڑے ہونے کے لئے جی کافی قوت درکار ہو۔
 بازوؤں اور ٹانگوں کا تحریکی سے یا درد سے کانپنا۔
 شکم میں احساس جیسے تیز پھڑپھڑا پس میں دگر ہے ہوں یا
 شکم کو کاٹ رہے ہوں۔

لیکوریٹا، سبجائے حیض کے یا درد حیض کے درمیان، گوشت
 کے وجود کی طرح تپکا، سوزشی، خون ملا، دوران حمل میں۔
 نام کا ہر نیا

زیادتی :- کھانے سے، نیند خراب ہونے سے، کھل ہوا میں،
 تمباکو نوشی سے، گاڑی میں چلنے سے، تیرنے سے، چھوٹے
 سے، شور و غل سے، جھجکے سے، بعد دوپہر، دوران حیض جلد
 میں پراگندگی سے۔

معاون :- کیومیڈا، اگنیشیا، رسٹاکس۔

مخالف :- کاسٹیکم، کانیا۔

مصلح :- کیفیر، کیومیڈا، کیوریم، اگنیشیا، نکس و امیکا، سٹروٹھس،
 کانیا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

خصوصی علامات

- ۱۔ دورانِ سرخاں کر جب لیٹا ہو یا بستر میں کرٹ بیٹے۔ بائیں جانب سر گھمانے سے (کالوسنتھ)
- ۲۔ کھانسی، زیادتی جب لیٹا ہو۔
- ۳۔ پیشاب رک رک کر آئے۔
- ۴۔ حیض کمزور، رکا ہوا۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے رک جائے۔
- ۵۔ لیکوریا، حیض کے دس دن کے بعد (بوریکس، بورکٹا)
- ۶۔ خواہشات نفسانی یا حیض کے دب جانے کے اثرات بدرجہہ۔
- ۷۔ پسینہ جونہی سوتے یا جونہی آنکھیں بند کرے۔

عام استعمال

آلاتِ تناسل کے عوارض کے علاوہ انفلوئنزا، کالی کھانسی، خنانیر، رمد چشم، معدہ یا جگر کا سرطان، بوڑھے افراد کے امراض بول اور فالج وغیرہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض لاپرواہ، کسی کام، کاروبار یا مطالعہ سے دلچسپی

حافظ کمزور، کوئی دماغی محنت برداشت نہ ہو۔
 خصبوں کے یا پستانوں کے غدود بعد سخت درد کریں۔
 کھانسی حنجرہ میں ایک ہی مقام پر خشکی سے تشنہ دورے
 کی صورت میں۔

حیض بہت دیر میں، مقدار میں کم، تھوٹے وقت سے ہے۔
 جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے جس کے باعث ماہواری رک جاتے۔
 (ڈسکارا)

لیکوریہ، سوزشی، خون ملا، دودھ کا سا، مقدار میں زیادہ،
 گاڑھا رک رک کر بہنے والا۔

جام نہ کرنے سے یا کثرت جامع سے بڑے اثرات مابعد۔
 روشنی سے ذکی الحسی، آنکھوں میں درمی کیفیت نہ ہونے کے
 باوجود مصنوعی روشنی سے تکلیف ہو۔

فالج، پہلے زیریں دھڑ مفلوج ہو اس کے بعد اوپر کا جسم۔
 زیادتی بڑے شب کو لیٹنے پر، کروٹ بدلنے یا اٹھنے پر، بستر میں
 کنوارپن میں، جسمانی یا طبعی ریاضت سے، حیض کے دوران، سردی
 لگ جانے سے، مصنوعی روشنی سے، بازو اوپر اٹھانے سے،
 دودھ پینے سے، زمین پر زور سے قدم رکھنے سے۔
 کسی بد تاریکی میں، روزہ رکھنے سے، اعضاء کو لٹکانے سے،
 حرکت اور دبانی سے۔

معاون :- آرنیکا، آرسینکیم ایلم، بیلایڈونا، کلیریا، نکس دامیکا،

لائیو پوڈیم، فاسفورس، پلساٹیل، سٹرامونیم، رسٹنس
 مصلح: کانیا، ڈسکامارا، نائٹریک ایسڈ، نائٹریک سیڈ، ڈسکامارا
 طاقت: ۳۰ طاقت عام طور پر مستعمل ہے، لیکن گومڑوں و دیگر
 اس قسم کے عوارض میں بہت اونچی طاقتیں جلد دہرائے بغیر
 مستعمل ہیں۔

CAPSICUM

کیپسی کم

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض بلغمی مزاج اور سست، ذرا سی محنت سے جان جائے۔
- ۲۔ بچے کھلی ہوا سے ڈریں، ہمیشہ سردی محسوس کریں، بھدے،
 موٹے، میلے کچیلے بچے۔
- ۳۔ غلاظت، یاد وطن چہرے پر سرخی کے ساتھ۔
- ۴۔ سکڑن تالو کی، حلق کی، ناک کے پچھلے حصے کی، سینہ میں،
 مثانہ میں، پیشاب کی نالی میں یا مہرز میں۔
- ۵۔ احساس جلن اور جھیلن کا حلق میں یا جسم کے دوسرے حصوں میں۔
- ۶۔ حلق میں سکڑن جلن کے ساتھ۔
- ۷۔ جلن دار درد حلق میں جس میں نگلتے وقت زیادتی ہو۔

۸۔ کھانتے وقت درد ہو، درد ملے مقامات میں مثلاً شانہ، گھٹنے
ہانگیں، کان۔

عام استعمال

ایسے عوارض میں بالعموم مستعمل ہے جن میں جسم کے کسی حصہ کی
رطوبات تھکیوں میں مرچیں لگنے کی سی جلن پائی جاتے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مرض میں متوالا پن، دہشت کی طرف طبیعت
مائل، چٹہ چڑا، زرد رینج، تمام محسوسات تیز ہو جاتیں۔
سر کا درد ایک کن پٹی میں یا ماتھے میں خاص کر مرکوز ہوتے
ہوتے یا چلتے ہوئے زیادہ محسوس ہو، آرام کرنے کی کمی۔
آنکھوں میں جلن، سرخی، پانی بہے، چیزیں سیاہ دکھائی دیں۔
کان کے پردے میں یا گہرائی میں کھجیل اور درد، ہلکے سے خون
بہے۔

منہ میں جلن دار آبلے، حلق میں دکھن اور جلن، منہ میں بلغم، دانقہ
سیٹھا۔

پیٹ بھولا ہوا، ریاحی تولنج، پیٹ میں جلن۔
ریاحی تولنج کے بعد پاخانہ ہو، پچپش آؤں اور خون وال، خونی بواہر
مہرز میں جلن۔
شانہ میں انیٹھن، پیشاب کرنے میں جلن ہو، پیشاب میں خون۔

تنگی تنفس، سینہ میں درد ۔

زیادتی :- کھاتے وقت گرمی سے، کھلی ہوا میں، کپڑا اتارنے سے،
ہوا کے جھونکے سے ۔

معاون :- نیئریم میور ۔

مصلح :- کیہفر، چائنا، کیلیڈیم، سائٹا، سلفیورک ایسڈ ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۶ طاقت تک ۔

کیکٹس گرینڈی فلورس

CACTUS GRANDIFLORUS

خصوصی علامات

۱۔ موت کا خوف، یقین کرے کہ مرض لا علاج ہے ۔

۲۔ تمام جسم میں یہ احساس ہو جیسے اسے پتھرے میں بند کر دیا
گیا ہے یعنی بھینچ دیا ہے اور پتھرے کا تار لمحوہ بہ لمحوہ زور زور
سے بھینچا جاتے ۔

۳۔ قلب میں احساس جیسے کوئی ٹوبہ کا پنجہ ڈال کر بھینچ رہا
ہے اور ڈھیلا کر رہا ہے ۔

علام استعمال

یہ دوا عام طور پر دل کے عوارض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غمگین، مایوس، موت سے خوف زدہ، درد کے باعث چلا اٹھے۔

سر میں درد، چند یا سہ بوجھ بڑھا ہوا محسوس ہو، سر کی شریان پھولی ہوئی نظر دھندلی، دور سے آنے والی نظر کی کمزوری۔

اجتماع خون کے باعث اونچا سنائی دے یا کانوں میں دریا کی روانی جیسا شور۔

ناک سے نکسیر پھوٹے جو جلد ہی بند ہو جائے۔
حلق میں دم گھٹنے والے دورے جن کے ساتھ دل میں درد ہو۔

چہرہ نیلا، سرد پسینہ، زرد تہمتایا ہوا ہو، مزمن عصبی درد منہ سے صبح کو بدبو دار تنفس

صبح کو متل، خون کی تہ، یا تیز کھٹی تہ، معدہ میں جلن، ناف کے مقام پر درد۔

پاخانے سیاہ اور سخت، بواسیر متھے سو جے ہوئے اور درد کریں
امعاء سے جریان خون جس کے ساتھ دل کی علامات بھی ظاہر ہوں۔

مٹانہ سے جریان خون، گردن مٹانہ میں رکاوٹ محسوس ہو،

مشیاب بند۔

رحم کے مقام پر اور خصیت الرحم میں لکاوٹ اور جکڑن ہو، وقت حیض
اندام نہانی میں سوزش، خون حیض جلد جلد اور گہرے رنگ کا
منشی کھانسی، سیڑھیوں پر چڑھنے سے سانس لینے میں دقت
ہو، نزل کھانسی، لیسیدار بلغم نکلے، سانس دقت اور تکلیف سے، دم
ورد سے گھٹتا ہو، نبض کمزور، سینہ میں اجتماع خون کے باعث لیٹنا
مشکل ہو، دل دھڑکتا ہو۔

ایسا معلوم ہو کہ دل فولادی بندھن میں جکڑا ہوا ہے جس کے باعث
حرکت میں فرق آگیا ہے، چھین دار درد جس کی وجہ سے سانس لینے
میں دقت ہو، بائیں کروٹ لینا مشکل ہو، نبض تیز مضبوط اور سخت
چلتی ہو، مدھم مدھامی درد جو دبانے سے زیادہ ہو، تنفس رک کر چلنا
ہو، چہرہ نیلگوں اور پھولا ہوا بالخصوص بائیں حصہ، بائیں ہاتھ پر اور بائیں
ٹانگ پر سوجن، نبض بے قاعدہ، درد گولی کی طرح دل کی چوٹی سے شروع
ہو کر بائیں انگلی کے سونے تک جلتے ہوں، اذن قلب بڑھ گیا ہو، دل
کے فتور کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت مفید ہے۔
ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، ٹنڈے اور سن ہوں۔

جلد پر خارش کے بغیر نیشک بھوسی کی طرح پھنسیاں، پہلے بائیں
گھٹنے کے عقبی جانب، پھر دائیں کہنی کے بیرون طرف پھر دائیں گھٹنے
کے عقبی جانب اور آخر میں بائیں کہنی کے باہر کی جانب پھنسیاں
نکلیں۔

جیناں، جسم کے مختلف حصوں میں ٹپکن کے باعث خوفناک
خواب آتے رہیں۔

سناہ ہر روز وقت مقررہ پر، کمر میں سر دی گئے، اس کے ساتھ
جریان خون ہو، سر دی بہت گئے، سر دینہ، سخت گھبراہٹ۔
زیادتی، باتیں جانب لیٹنے پر، چلنے سے، سیڑھیوں پر چڑھنے
سے، صبح کو گیارہ بجے اور رات کو گیارہ بجے، کھانا کھانے کے
بعد، رات کو آوازیں سننے سے۔

کسی :- شام کو، نیند سے، سکون سے، تازہ و کھل ہوا سے۔
معاون :- ڈیجیٹیس، نکس و امیکا، یوٹیویریم پرنٹ، لیکے کس،
سفر۔

مصلح :- اکونائٹ، کیمفر، چائنا، یوٹیویریم پرنٹ۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

ڈاکٹر روبینی شدید سو جن دل کے عضوی امراض میں اس کا مدد ٹنچر
استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

CALENDULA

کیلنڈولا

خصوصی علامات

- ۱۔ بچہ کو دودھ پینے کے فوراً بعد مھوک لگ جاتی ہو۔
- ۲۔ بہرا پن، لیکن مریض ریل گاڑی پر یا دور کی آواز سنبھال
سکے۔

- ۳۔ بہت جلد ٹھنڈاگ جاتی ہو، خاص کر سر طوب آب دیا جائے۔
- ۴۔ غیر معمولی ہلکے، کلیجہ جلتا ہوا، معدہ پھیلا ہوا محسوس ہو۔
- ۵۔ اندام نہانی کے منہ پر مٹے ہوں۔

عام استعمال

زخموں یا جل جانے کے لئے یا سرخباد وغیرہ میں عام طور پر خارجی طور پر مستعمل ہے۔ علاوہ ازیں خوردنی طور پر مذکورہ ذیل کیفیات میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

پرانے ناسور یا نئے زخم جو مندمل ہونے میں نہ آئیں (خارجی طور پر اس کا استعمال زخموں کو بہت جلد مندمل کرتا ہے)۔

ذمہنی طور پر مریض اعصابیت کا شکار ہو، بہت لمبے لمبے سر میں پھاڑنے والے درد، داغ بوجھ، نیچے جھڑوں کے غدد سوجھنے جنہیں چھپونے سے درد ہو، گردن کے دائیں طرف درد، کھوپڑی پر چپے ہوتے زخم۔

آنکھوں میں چوٹ لگنے سے پیپ رسنے کا میلان، آنکھوں پر عمل جراحی کے بعد کی تکلیف، آنسوؤں کی تسلی کا قرحہ۔

ہیرا پن جو مرطوب ماحول میں یا ایگزیا کی کیفیات کے ساتھ بڑھ جاتے۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے وقت یا دور کی آواز بخوبی سن سکے۔ نہ کام جو صرف ایک نختے سے بہے، اخراج سبز رنگ کا ہو۔

بچوں میں درد پلانے کے فوراً بعد ان کو دوبارہ بھوک لگ جاتے۔
غیر معمولی بھوک، معدہ کی صلبی، سینہ میں متلی محسوس ہوتی ہے،
طبیعت شدید طور پر گرتی چلی جاتے، معدہ پھیلا ہوا۔

کھانسی، سبز رنگ کے اخراج ہوں، آواز بیٹھ جاتے۔ کھانسی
جس کے ساتھ چٹے کے چھپے کے پھیلاؤ کی علامت بھی موجود ہو۔
خواتین میں اندام نہانی کے منہ پر مستے، ماسواہی کھانسی کے ساتھ
دب جاتے، بچہ دانی کی گردن کی مزمن اندرونی سوزش، رحم پھیلا
ہوا، پیڑ میں بوجھ اور بھراؤ محسوس ہو، چڑوں میں احساس کھپاؤٹ،
دنقاً حرکت سے درد ہو، حیض بکثرت آئے۔

جلد پر بیرونی زخم، گوشت زرد رنگ کا نظر آتے۔ یہ دوا پیپ
پڑنے کے میلان کو سیت حد تک کم کر کے زخم کو جلد مندمل کرتی ہے۔
جلد کا جیل جانا یا سوزش، سرخباد (ان عوارض میں خارجی استعمال ہوتا ہے)
بخار، ٹھنڈک، کھل ہوا سے ذکی الحسی، کمر میں کیکپا ہٹ، جلد
چھونے سے گرم لگے، شام کے وقت حدت محسوس ہو۔
زیادتی :- مرطوب، بوجھل یا ابر اکود موسم میں۔

معاون :- ہیرسلف۔

مخالف :- کیفر۔

مصلح :- آرنیکا۔

طاقت :- طاقت سے طاقت تک۔

(بیرونی طور پر آبی کیلنڈر دلا، یا اس کے ٹینچر اور پانی کی آمیزش سے
بنا ہوا لوشن زخموں کو مندمل کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جلی

ہوئی جلد، پھوڑوں، پھنسیوں، شقاق یا خراش وغیرہ کے لئے اس کا مرہم مستعمل ہے۔

CALADIUM

کیلیدیم

خصوصی علامات

- ۱۔ نامروی، عضو وھیلہ، خواہش جماع اور تحریک کے ساتھ۔
(لائیکو پوڈیم، لیکیکس)
- ۲۔ خواتین کی شرمگاہ میں خارش جس سے خواہش جلق پیدا ہو۔
(اوربی جینیم، زنگم)
- ۳۔ سو جائے شام کو سناخار کی حالت میں اور سناخار اترنے پر بیدار ہو۔
- ۴۔ پسینہ میں شکر کا اخراج جس پر کھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔
- ۵۔ مریض کو حرکت سے نفرت ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عورتوں کے اعضائے تناسل کی ٹھیکہ میں بہت زیادہ مستعمل ہے۔ علاوہ بریں مردوں کے جنسی عوارض میں بھی کارآمد اور مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض نسیان کا شکار ہو، دماغ یکسو نہ کر سکے، ہاتھ میں درد، متلی، چکر، کان میں پھرکن ہو۔

متلی خاص کر صبح کو اٹھنے پر، معدہ میں پھرکن، کڑوی تہ، پانے کے بعد مبرز میں جلن۔

سردانہ اعضائے تناسل میں کھلبلی، حشفہ سرخ ہو، عضو پر سوجن و وصال ہو اور لمبا معلوم ہو۔ نیند میں ایستادگی مگر بیدار ہونے پر ایستادگی ثابت نامرادی، احتلام، صحبت کرنے کی کوشش میں ایستادگی نہ ہو یا مٹی نہ خارج ہو۔

خواتین میں اندام نہانی کی کھلبلی، عضو کی کھلبلی، حمل کے ایام کی رجم میں آدمی رات کے بعد تشنہ درو ہو، کھلاتے کھلاتے عورت کو جماع کی خواہش ہونے لگے۔

جلد پر میٹھا پسینہ آئے جس پر کھیاں چپکیں، نرغہ اور حلق ایسا خشک کہ سانس لینا مشکل ہو۔ نزلہ کا دم، مریض ہوا سے گہرا لے جسم پر دانے نکلنے اور دم کے زور کے دوپے یکے بعد دیگرے ہوا کریں۔

زیادتی بہ گرمی سے، ٹھنڈے پانی سے، لکھنے پڑھنے سے اور سوچنے سے۔

کسمی بہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے، پسینہ کے بعد، دن کو سونے کے بعد۔

معاون :- نائٹک ایسٹڈ، پلسٹیل، اکونائٹ، کینٹھرس، سیڈیا۔
 مخالف :- آرم ٹرائفلم۔
 مصلح :- کیسی کم، کاربوئیچ، بیوسمس، اگنیشیا، مرکوریس،
 زنجبیر۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

CAMPHOR

کیمفر

خصوصی علامات

- ۱۔ چوٹ کے اثرات بد، سطح جسم ٹھنڈی، چہرہ پیلا، نیلا، نہوٹ نیلے، عید کمزوری۔
- ۲۔ جسم چھونے سے ٹھنڈا تاہم ڈھانکنا نہ چاہیے (میڈورینیم، سکیل کار)۔
- ۳۔ زبان سرد ہو۔
- ۴۔ ناک ٹھنڈی اور نوکیلی، جلد اور سانس سرد (ورٹیرم، جیٹروفا)۔
- ۵۔ سطح جسم ٹھنڈی، یکایک مکمل کمزوری، اور طاقت سلب ہو جانے کے بعد۔
- ۶۔ خسرہ اور سرخ بخار، چہرے پر زہدی یا نیلا پن، چہرہ ٹھنڈا اور مَرْدُول کا سا۔

۶۔ خسرہ کے تمام اثرات مابعد۔

عام استعمال

ہیضہ میں تشنجی دوسے، مرگ، زہر باد، سوزاک، دل کے امراض،
انفلوئنزا، خسرہ، نیند نہ آنا، سانب کا ڈسٹا، تمباکو کھانے کی عادت
اور ٹو لگ جانے کے عوارض میں مشعل و مفید ہے۔

عمومی علامات

آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی، پتلیاں پھیلی ہوتی، تمام اشیاء چمکیلی محسوس
ہوں!

ناک بند ہو، چھٹکیں آئیں، موسم کی اچانک تبدیلی سے زکام، ناک
سرد اور بھیجی ہوتی، نکسیر لگتا رہتی ہو۔

چہرہ زرد، اترا ہوا، حیران، بدلا ہوا، نیلا اور سرد ہو۔

معدہ کی گہرائی میں دبانے والا درد، مری کے بعد جلن ہو۔

پانخانے سیاہ بلا ارادے آتے ہوں، ہیضہ کے ساتھ رانوں میں
تشنج ہوتے ہوں، جسم سرد، گھبراہٹ، سخت نقاہت، کمزوری
نہایں اور منہ سرد ہو۔

پیشاب جل کر اور دقت سے آتا ہو، شانہ کی گردن میں کونٹن،
شانہ پیشاب سے بھرا ہوا اور پیشاب بند ہو۔

مردوں میں خواہش جماع بڑھی ہوتی، ایستادگی بہت ہو،
شب کو احتلام ہو جائے۔

دل میں تکلیف محسوس ہو، دم گھٹنے کے سے دور، دماغ خشک
 کھانسی، دل دھڑکتا ہو، سانس سرد ہو، سانس رک کر جلتا ہو۔
 بخیر الہی کے ساتھ اطراف جسم سرد ہوں، اعصاب کو جھٹکے لگتے ہوں
 اور از حد بقیاری ہو۔

کندھوں کے درمیان مفاصل درد، حرکت میں وقت ہو، خدر یعنی
 سُن ہو جانا، سستی اور سردی، جوڑے کڑکڑاتے ہوں، پٹھے کھینچے ہوئے
 پاؤں برف کی طرح سرد، دکھتے ہوں جیسے موج آگئی ہو۔
 ہنار میں نبض چھوٹ کمزور اور آہستہ چلے، تمام جسم برف کی
 طرح سرد، ٹھنڈے پسینے، سردی جس میں اجتماع خون ہو، زبان سرد موٹی
 اور کانپے۔

جلد سرد، زرد، نیلی، بدن پر کپڑا لپٹا گوارا نہ ہو۔
 زیادتی :- حرکت سے، شب کو، چھوٹے سے، سرد ہوا لگنے سے،
 گتھی :- گرمی سے۔
 معاون :- کینتھرس۔

مخالف :- کالی نائٹریک، کینینڈولا۔
 مصلح :- اویس، ناسفورس، کینتھرس، ڈوسکا مارا۔
 طاقت :- مد ٹنچر اور چھوٹی طاقتیں۔

خصوصی علامات

- ۱۔ نوزائیدہ بچے اور دانت نکلنے کے زمانہ کی تکلیفات، سچہ بد مزاج ہو۔
- ۲۔ سچہ بچہ چڑچڑا، غصہ ور، صرغہ گود میں اٹھا کر چلنے پھرنے سے چپ ہے۔
- ۳۔ درد، ماؤ ذہ حصص میں سن ہونے کے احساس کے ساتھ۔
- ۴۔ دست، غصہ یا پریشانی سے یا دانت نکلنے کے زمانہ میں یا زحمتی میں۔
- ۵۔ پانخانہ، گرم، سخت متعفن، بڑے ہوتے انڈوں کی طرح۔
- ۶۔ ماں پر غصہ کے دوسے کے بعد دودھ پینے سے سچہ کو تشنگی دوسے۔

عام استعمال

چھوٹے بچوں کے عوارض کی خصوصی دوا ہے۔ علاوہ بریں غصہ کے بڑے تپا سچ اور کھوکھلے دانت کے درد کے لئے بھی بچہ نافع ہے۔

عمومی علامات

درد سر جو سوتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے، چکر لپٹنے کے بعد

آنکھوں کی پتلیوں کی سکڑن، پوٹوں کے کنارے خشک لیکن صبح کو
چپک جاتیں، آنکھوں میں جلن۔

کانوں میں بھنبھناہٹ اور بچاٹنے والا درد۔

منہ کا ذائقہ کڑوا، ترش یا پھیکا، منہ سے گندی بو، دانت کا خاص کر
کھوکھلے دانت کا درد جو بالخصوص رات کو ہو، گال پھولے ہوئے، کھانے
پینے سے درد بڑھے، خاص کر گرم اشیا سے، منہ خشک، زبان سرخ
جھٹنی ہوتی۔

بھوک نہ لگے، غذا سے نفرت، ریاح بکثرت، پیٹ میں درد بعض
دفعہ غذا اور صفر اکتے ہو جاتے، ٹھنڈے پانی کی پیاس۔
دست عموماً رات کو اور درد کے ساتھ۔

وضع حمل کے بعد عورتوں کے اعضائے تناسل میں درد اور جلن، زرد
رطوبت کا اخراج، سیاہ پٹکیاں خون کی خارج ہوں۔

سینہ کی لمبی بڑی اور نرخرہ میں بغم ہونے کے باعث گھڑ گھڑاہٹ
کھانسی، سانس کی تکلیف، بچوں کو سوتے ہوئے خشک کھانسی آئے۔
پنڈلیوں میں انیٹھن، گھٹنے چلنے میں آواز دی، ہاتھ پیر ٹھنڈے۔
دل کو ٹنید آئے رات کو بے چینی ہے۔

بخار لرزہ کے ساتھ، ایک گال سرخ اور ایک گال زرد،
جلد ناتندرست، یرقان۔

زیادتی :- شام کو آدھی رات کے قبل، گرمی سے، غصہ سے، کھل
ہوا سے۔

کسمی :- فائدہ کرنے سے، گرم تر موسم میں، لیکر گھومنے سے۔

معاون :- بلیا ڈونا، پلسا ٹیلا، میگنیشیا کارب۔
 مصلح :- ایکونائٹ، بوریکس، الیومنا، کیمفر، کافیا، کوکولس انڈیکا،
 کوئیم، اگنیشیا، نکس واما، پلسا ٹیلا، ولیریانہ۔
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CANNABIS INDICA

کینابیس انڈیکا

خصوصی علامات

- ۱۔ بہت زیادہ بھول جانے والا۔
- ۲۔ بولتے ہوئے ایک جملہ شروع کرے اور پھر بھول جائے کہ آگے کیا کہنا ہے۔
- ۳۔ عجیب و غریب تصورات اور خیالات میں مستغرق رہنا۔
- ۴۔ ہر معمول سے لفظ پر جو بولا جاتے ہے تماشہ منہ سے۔
- ۵۔ دماغ میں ایسے صدات جیسے پانچے چل رہے ہوں۔
- ۶۔ وقت اور فاصلے میں بہت زیادہ مبالغہ کرے، چند لمحے بھی عمریں معلوم ہوں اور چند گز بھی کہیں میل محسوس ہوں۔

عام استعمال

حواس کی رکاوٹ حد سے بڑھ جائے اور دل میں ہر قسم کے توہمات

اور تصورات جاگزیں ہوں تو حسبِ علامات یہ کارگر و مفید دوا ثابت

ہوتی ہے۔

عمومی علامات

دردِ شقیقہ، سردرد جو پیشاب کی خرابی کے باعث ہو، دردِ نہایت شدید جو جو مریض کو بے ہوش کر دے، سر کی چوٹی کھٹکنے یا بند ہونے کا احساس، یا ایسا معلوم ہو کہ اوپر کو اٹھایا جا رہا ہے، سس پیس کی بیخوابی جس کے ساتھ بے چینی ہو، مایغولیا، اعصابی درد اور نصف سر کا درد۔ آنکھوں میں اعصابی تکالیف، تمباکو یا شراب کے کثرت استعمال سے آنکھ میں تار اٹھ جاتے، بوقتِ مطالعہ حرفِ درست نظر نہ آئیں، سوزاک یا خنازیر کے باعث ہو جانے والا آشوبِ چشم۔ معدہ میں فتور ہو لیکن پھر بھی بھوک زیادہ لگے، معدہ میں درد اور نفع۔

سوزاک، پیشاب کی نال میں جلن ہو، پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔ مقامِ گردہ میں چیرنے والا درد ہو۔

مردوں میں سوزاک کے باعث جریان، دائمی شہوت ہو اور بعدِ جماعت کمر میں درد محسوس ہو، عورتوں میں دورانِ حیض میں اشدّتی الرحم ہو اور غمازشِ جماع حد سے بڑھ جاتی ہو، سل ظہری، شدید درد اور ادھر تک کے دھندلے کو دور کرنے کے لئے بہترین دوا ہے، خونِ کھالوں کا آنا یا رات کو خوف سے چونک پڑنا اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔

زیادتی :- صبح کے وقت ، چائے یا تمباکو نوشی سے ، واپس جانب لیٹنے سے ۔

کمی :- تازہ ہوا سے ، سرد پانی اور آرام سے ۔
طاقت :- مدد ٹیکر سے ۳ تا ۴ تک ۔

CANNABIS SATIVA

کینابیس سٹائوا

✽ خصوصی علامات ✽

- ۱۔ احساس جیسے پانی کے قطرے واحد حصص سے واحد حصص پر گر رہے ہیں ۔ سر پر ، مقعد سے ، معدے سے ، دل سے ،
- ۲۔ تنگی و تنفس ، مریض صرف کھڑے ہو کر ہی سانس لے سکے ۔
- ۳۔ سوناک کا پہلا درجہ

✽ عام استعمال ✽

مرض سوناک کے پہلے درجہ کے لئے یہ مخصوص ترین دوا ہے ۔ اگر اس مرض کے لئے کوئی دوسری دوا منتخب کرنا دشوار ہو جائے تو یہی دوا استعمال ہو سکتی ہے ۔ اس دوا کے لئے سوناک کمی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی کو چھوٹے جانے سے یا دبائے سے بے انتہا درد ہوتا ہے جس کے باعث مریض ٹانگیں

پھیلا کر چلتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے مواد گاڑھا اور سبز ہو جاتے تو مرکب دس سال دینے سے پورا فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر کینا بس ساکیا کے بعد مواد سبز اور گاڑھا ہو اور ساتھ ہی جلن کی زیادتی باقی ہو تو مرکب دس سال کا مناسب ہوگی۔ نیز اگر پیلا، سفید یا گاڑھا مواد ہو تو پیلا ٹیلا کی ضرورت ہوگی۔ پرلے سوزاک میں سلفر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

سر میں چکر، ایسا محسوس ہو کہ سر پر پانی ٹپک رہا ہے۔ ناک کی جڑ پر بوجھ۔

آنکھوں میں عصبی خرابی یا شراب اور تمباکو کے کثرت استعمال سے مٹا پڑ جائے۔ نگاہ کے سامنے دھندلاہٹ، سوزاک کی وجہ سے آشوب چشم، خنازیری مافے کی وجہ سے آنکھ کی تکالیف۔

پیشاب رکا ہوا، اس کے ساتھ قبض، پیشاب کی حاجت اس کے ساتھ درد، پیشاب کرنے میں کئی دھاریں نکلیں، پیشاب کی نالی میں چھین، پیشاب کرتے وقت جلن جو کہ مشانہ تک ہو، کھوتنا ہوا پیشاب ہو، شدید سوزاک، پیشاب کی نالی میں سخت جلن، مریض ٹانگیں پھیلا کر چلے، خصیوں میں کھنچاؤ، ایستادگی، پیشاب کی نالی مواد کے باعث بند ہو جائے۔

سانس کی تکلیف اور دھڑکن جس کے باعث اٹھ کر بیٹھنا پڑے، سینہ میں بوجھ، سانس لینے میں گھڑ گھڑاہٹ، کھانسی کے

ساتھ سبز یا خون ملا ہوا بغم نکلے ، ایسا معلوم ہو کہ دل سے پانی کے قطرے
پکٹتے ہیں ، دھڑکن ہو۔

رات کو خواب بہت آئیں ، صبح کو تھکاوٹ زیادہ ہو ، دن میں
نمید آئے۔

موج لگنے کے بعد انگلیوں میں کھنچاؤ ، زہینہ چڑھنے سے گھٹنے کی
بڑی اکھڑ جائے۔ زہینہ چڑھنے پر پیر بھاری معلوم ہوں ، پیر کے
انگوٹے کے نیچے تلووں کی تکلیف۔

زیادتی :- لیٹ جانے سے ، زہینہ چڑھنے سے۔
مخالف :- کیمفر

مصلح :- کیمفر ، رسٹا کس
طاقت :- مدد ٹنچر سے ۲ طاقت تک اور ۳ طاقت

CANTHARIS

کینتھارس

خصوصی علامات

- ۱۔ درد جلن دار ، پھوٹے کے سے جسم کے سرحقہ میں۔
- ۲۔ پیشاب کی مسلسل خواہش یا پیشاب کی یکایک حاجت۔
- ۳۔ پیشاب کی نال میں شدید غارش۔
- ۴۔ پیشاب کے قبل ، دوران اور بعد ناقابل برداشت حاجت۔

۵۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن اور کٹن والے درد۔

۶۔ پاخانہ کے ساتھ ایسی آؤں جیسے آنتوں کے ٹکڑے ہوں۔

۷۔ تمام دمی تکالیف میں جلن دارہ درداورہ پیشاب کی ناقابل برداشت

حاجت۔

عام استعمال

آلات تناسل، پیشاب کے اعضا و نیز آلات ہضم، آلات تنفس اور آنتوں کی رطوبتی جھلیوں میں دکھن اور جلن والے عوارض اس دوا کے طالب ہوتے ہیں۔

عمومی علامات

دہنی طور پر مریض بزدل، پست ہمت، رو دینے والا اور غصہ ہوتا ہے۔

سر میں جکڑن، سر کے نیچے کوچن، بچے میں جلن اور دکھن درد سر گردن کی طرف سے اوپر چڑھے، کن پٹیوں میں تپکن۔ آنکھوں میں جلن اور دکھن، آنکھیں زرد، چیزیں زرد معلوم ہوں مزمن زکام اور نزلہ، ناک سے بلغم نکلے، سرخی اور جلن۔ چہرہ زرد جس سے کہ تشویش اور فکر ٹپکتی ہو، چہرہ پر سرخی اور جلن یا آبلے جن میں کھلی اور جلن ہو۔

منہ میں آبلے پڑے ہوں، حلق میں یا حلق کے غدد میں سوجن اور جلن پانی پینے سے زیادہ ہو، مسوڑھے میں ناسور ہو گیا ہو، منہ

سے مال ہے۔

ہونٹوں کی خشکی کے باعث پیاس مگر پانی سے نفرت ہو،
جھک بالکل نہ ہو، معدہ میں جلن اور ورم، ورم جگر، متلی اور تھکے۔
تبص، سخت پانخانہ ہو، پیمیش میں سفید یا زرد سرخی مائل آؤں
نکلے، ایسا معلوم ہو کہ آنتیں کھری جاتی ہیں، سبز خون مل آؤں، پانخانہ
سے قبل تو لمبی درد، پانخانہ کے دوران میں زرد جلن ہو، بعد پانخانہ کے
مہرز میں انیٹن، جلن دار اور نیش زدن کا سادرد۔

پیشاب بمشکل خارج ہو، پیشاب کی سخت حاجت ہو مگر قطرہ
قطرہ جلن کے ساتھ نکلے، گردہ میں ورم، جلن اور نیش زدن ہو،
سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں جلن ہو اور خون نکلے، مثانہ
کے مقام پر چھونے سے سخت درد ہو۔

خواہش جماع زیادہ ہو، عرصہ تک ایستادگی ہے مگر درد
کے ساتھ جریان ہو، عورت کو حیض بہت جلد اور بہ کثرت ہو اور
سیاہ خون خارج ہو، سیلان رحم چھیلنے والی رطوبت خارج ہو،
پیشاب کرنے میں جلن، خواہش مباشرت بڑھ جائے۔
زیادتی :- چھونے سے، پیشاب سے، ٹھنڈے پانی یا تھوہ
پینے سے۔

کسی :- ملنے سے

معاون :- کیمفر

مخالف :- کافیا

مصلح :- ایکونائیٹ، ایپس، کیمفر، پلساٹیل، لاروسیرا

ریوم، سمفٹم۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

CUPRUM METALLICUM

کیوپرم ٹیلیکم

خصوصی علامات

- ۱۔ تشنچ یا انیٹھن کی کیفیت نوبتی طور پر بیک وقت کئی ایک مقامات پر۔
- ۲۔ جاگتے رہنے سے ناقابل برداشت پریشانی کے دورے۔
- ۳۔ ابھاروں کے دوبارہ اندر چلے جانے کے نتائج بد، خاص کر تشنچ دوسرے۔
- ۴۔ تشنچ دوسرے جو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں سے شروع ہوتا ہے۔
- ۵۔ کھانسی سے گڑ گڑاہٹ کی آواز جیسے بوتل سے پانی نکل رہا ہو۔
- ۶۔ کالی کھانسی جس سے دم گھٹے، سانس نہ آتے، چہرہ نیلا پڑے جلتے، جسم سخت ہو جائے یا اکڑ جائے، مسلسل تین حملے (سٹائم)۔

عام استعمال

مختلف عوارض کے ساتھ اگر تشنچ اور مروڑ پڑنے کی علامات ہیں

موجود ہوں تو یہ مستعمل و مفید ہوتی ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غم و اندوہ کا شکار ہو، سرسام کا میلان۔
سر ہچکے لے، مریض محسوس کرے کہ آگے کی طرف گر پڑے گا۔
سر میں پاگل بنانے والا بوجھ اور چاند پر جھنجھناہٹ۔
آنکھ میں درد، بے چینی کی وجہ سے آنکھیں گھانا پڑیں، شہایت شدید
ذہام جس کی وجہ سے نیتھتے بند ہوں، چہرہ زرد، ہونٹ نیلے۔
دانت میں درد، جو کہ کن پٹی تک ہو، منہ میں جھاگ، زبان پر
سفید میل، ذائقہ میٹھا۔

ہچکچ، متلی، تے کرنے کو جی چاہے، صفرا کی تے ہو، معدہ میں
تشنج، دست اور دور، معدہ میں تکلیف، وہ بوجھ جو کہ چھپونے
اور حرکت کرنے سے زیادہ ہو، یکا یک درد اور دورہ ہوا اور اس
کی وجہ سے چیخے۔

سخت اسہال و دست آنا، بار بار اور تھوڑا تھوڑا پیشاب ہو۔
خشک کھانسی، دم گھٹنے والے درے کے ساتھ، سینہ کے درد
کے ساتھ، آلات تنفس کا سکڑنا اور اس میں تشنج ہونا۔

ہیضہ شکم اور نیڈلیوں میں انہیٹن کے ساتھ۔
تشنجی دوسے، چہرہ نیلا پڑ جائے اور انگوٹھے ہتھیلیوں میں جکڑ
جائیں۔

بازوؤں اور ٹانگوں میں انہیٹن، درد تلووں میں، نیڈلیوں اور اعضا

میں بچہ تھکاوٹ کے ساتھ ۔

بہالت محل، ولادت کے بعد تشنجی دور ۔

زبان کا فالج، لڑکھڑاہٹ والی نامکمل گفتگو ۔

مرگ، شعلہ گھٹنوں سے شرمع ہوا اور اوپر کو جائے زیادہ تر رات

کے وقت، نیند کی حالت میں (بیوقوف) نئے چاند کے قریب باقاعدہ
وقفوں پر، سر کے بل گرنے سے یا سر کو چوٹ لگنے سے ۔

زیادتی :- وایاں جانب چھونے سے، حرکت سے، لیٹنے سے،

دبانے سے، جھبکنے سے، تے کرنے سے، حیض سے قبل ۔

کھی :- بہالت پسینہ ٹھنڈا پانی پینے سے، گرمی سے، پاخانہ آنے

سے، پسینہ کے دوران ۔

معاون :- کلکیر یا ۔

مصلح :- اورم، بیلڈونا، کیموٹا، چائنا، کونیم، سائیکوٹا، ڈکامارا

ہیپر سلف، مرکبوریس، اپیکاک، نکس و امیکا، پلسا ٹیلہ،

دریئم ۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۳ طاقت تک اور اوپر ۔

GRAPHITES

گریفائٹس

خصوصی علامات

۱۔ مریضہ غم زدہ اور مایوس ہے، گانے سن کر رونے۔

۲۔ آلات تناسل کے بیجا استعمال سے کمزوری۔

۳۔ لیوکوریا، دن اور رات کئی بار شدت سے بہے۔

۴۔ جلد کی خرابی، ہر چوٹ یک جہے (ہیرسٹاف)

۵۔ ابھار کانوں پر جن سے پانی کا سا شفاف چپکے دار مواد یا رطوبت

درتے۔

۶۔ مریض شور و غل میں بہتر طور پر سن سکے۔

۷۔ دیرینہ قبض، پاخانہ بہت بڑا خارج ہو (سلفر)

عام استعمال

اس دوا کے خاص اثرات جلد پر ہوتے ہیں۔ تہہ چھپانے، اکوتہ،

جلد میں شگاف پڑ جانے وغیرہ علامات والے عوارض میں مستعمل د

مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض غم زدہ اور بد مزاج ہو، ذرا ذرا سی بات سے چڑ

جائے، کام کرنے کو جی نہ چاہے۔

سر میں نشہ کی سی کیفیت محسوس ہو، صبح کے وقت جاگنے پر دردِ سر ایک جانب تھے کرنے کو جی چاہے، دردِ دانتوں اور گردن تک جائے، چاند پر جلن، سر پر تر اور چھپے بدبودار دانے۔
آنکھوں کے پوٹے سرخ اور سوجھے ہوتے، پوٹے خشک، پوٹوں پر زخم۔

کان کے اندر خشکی، کان کے پیچھے تری ہو اور دانے نکلے ہوتے ہوں۔
کم سناتے، منہ چلانے میں کان میں بچٹ بچٹ ہو (سلیشیا جلیسیا)
ایکے کس، کان میں گویا بندوق چھوٹے۔

دورانِ حیض صبح کے وقت معدہ کی خرابیاں، معدہ بوجھل، پیٹ میں جلن اور جھوک معلوم ہو، پیٹ پھولا ہوا اور سخت جیسا کہ ریح کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کبھی قبض بڑے سددوں والی، کبھی دست بے وقت رنگ کے، غیر مضم شدہ نہایت بدبودار، مبرر میں شکاف۔

مردوں میں خواہشِ جماع زیادہ مگر قوتِ مباشرت کم ہو جائے۔
قبل اس کے کہ کافی ایستادگی ہو منی خارج ہو جائے، فوطوں کا درد، مستق۔

مستورات میں اندامِ نہانی میں دھن، خصیۃ الرحم میں درد، حیض بہت دیر میں اور قلیل ہو۔

سانس کی نالی میں کھر کھراہن، دمہ، دل میں دھڑکن، پستان کی گھنڈی میں شکاف۔

انگلیوں کے جوڑوں میں موچ کا سادرو، ناخن اندر کی طرف
 بڑھیں، ٹانگوں کے دانوں سے شہد کا سا مواد نکلے۔
 جلد کے غدودوں میں ورم جہاں اعضا کی شکن ہو، زخم جن سے
 بدبو دار یا چیچھا مواد نکلے۔ جلد ناتندرست، جلد پک جایا کرے۔
 زیادتی :- سردی سے یا سرد ہو جانے سے، رات کو دورانِ حیض
 میں، اس کے بعد، کھانے کے بعد۔

کھی :- ڈکاروں سے، کھل ہوا میں چلنے سے۔
 معادن :- کاسٹیکم، ہیرسلف، لائیکو پوڈیم۔
 مصلح :- آرسینکیم البم، نکس و امیکا۔
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

GLONOINE

گلو نائن

تخصوصی علامات

- ۱۔ سر کی تکلیفات، چولہے کی گرمی یا دھوپ میں پھرنے سے
 (لیکے کس، نیٹرم کارب)
- ۲۔ سن سٹروک (لوگنا) یا دھوپ سے پیدا شدہ درد سر۔
- ۳۔ دماغ بہت بڑا، بھرا ہوا اور ٹھٹھا محسوس ہو، ہر جھٹکے، ہچکولے،
 قدم یا نبض کی ہر ضرب پر دماغ میں تسپکن محسوس ہو۔

۴۔ حیض کی بجائے سر میں درد شروع ہو جائے ۔

۵۔ درد سر جس کے ساتھ سر میں اجتماع خون کی علامت بھی موجود ہو۔

عام استعمال

گرمی یا سردی کی کثرت کے باعث یا آگ کی تیز تپش کے قریب کام کرنے سے یا شدید دھوپ سے یا حیض کی خرابیوں سے دوران خون دل و دماغ کی طرف بڑھ جانے سے جو عارض ہوں ان میں یہ دوا کلامد ہے۔

عمومی علامات

سر میں الجھن، چکر، سر کو شدید گرمی لگ جانا، ٹو لگنا، سر بھاری ہو لیکن تکیہ پر نہ رکھا جاسکے، سر کے گرد گرمی برداشت نہ ہو سکے، تپکن والا درد سر، سر کو کھلا رکھنے سے درد سر، دھوپ کے باعث درد سر، حیض کے بجائے درد سر، حاملہ مستورات کے سر کی طرف دوران خون، ورم دماغ۔

آنکھوں کو ہر چیز نصف روشن اور نصف تاریک معلوم ہو، حروف چھوٹے چھوٹے معلوم ہوں، آنکھ کے سامنے تاریک معلوم ہوں، کان میں تپکن، دل کی رفتار اپنے کانوں میں خود سنائی دے۔ دانت میں تپکن والا درد، گردن بھاری محسوس ہو، کالر ڈھیلے کی خواہش، چہرہ سرخی۔

پیٹ میں درد، مثلی وقتے، پیٹ میں کھرن ہو، قبض یا اسہال
براسیر میں کھجلی اور درد، خفیف مشقت سے دل و دماغ کی طرف دورانِ
خون بڑھ جاتے۔

مستورات کے حیض میں دیر ہو یا یکا یک بند ہو جاتے اس کے
باعث دماغ میں اجتماع خون۔

زیادتی :- دھوپ سے، آفتاب سے، آگ یا گیس کے سامنے،
تھکنے سے، بال کٹانے سے، صبح سے بارہ بجے دوپہر تک۔
کھی :- برانڈی سے۔

معاون :- بیلاڈونا۔

مصلح :- ایکونارٹ، کیمفر، کافیا، نکس و امیکا
طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ تک

GOSSYPIUM

گوسی پیم

خصوصی علامات

- ۱۔ بیضتہ الرحم میں رہ رہ کر مہونے والا درد۔
- ۲۔ ایسا محسوس ہو کہ حیض جاری ہو گا مگر جاری نہ ہو۔

عام استعمال

رچی خرابی کے اثر معکوس سے لاحق ہونے والے عوارض میں یہ دوا عام طور پر مستعمل و مفید ہے۔ حیض کو جاری کرنے کے لئے یہ دوا مدد ٹنکچر کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ دیگر عوارض میں ہومیوپیتھک طریقہ پر ۶ طاقت تک مستعمل ہے۔

عمومی علامات

عصبی مزاج، دراز قامت اور کم خون والی مریضائوں کی تکالیف حیض۔

سر میں درد جس کے باعث مریضہ سر کو پشت کی جانب جھکانے پر مجبور ہو۔

متلی، صبح کو ناشتہ سے پہلے تھ ہونے کا میلان۔

اندام نہانی کے لب سوجھے ہوئے اور کھجلاتے ہوں۔
حیض بالکل بند ہو۔

پستان میں رسول ہو۔

حیض پانی جیسے ہوں، کمر میں درد، پیڑ میں کھچاؤ اور بو بھل پن۔

رجم میں رسول جس کے ساتھ معدہ کا درد اور کمزوری۔

طاقت :- مدد ٹنکچر سے ۶ طاقت تک۔

خصوصی علامات

- ۱۔ پانی کو دیکھنے سے، چلتے پانی کی آواز سے یا عراجی سے پانی کے نکلنے کی آواز سے تمام تکالیف بڑھ جائیں۔
- ۲۔ زخم نیگلوں ہو جائیں (لیکے سس)
- ۳۔ دھوپ یا سورج کی گرمی برداشت نہ ہو سکے۔
- ۴۔ دردِ سر، زیادہ چکدار روشنی سے یا چلتے پانی سے۔
- ۵۔ چلتے پانی کو دیکھنے پر مسلسل پیشاب کی خواہش (کنیتھرس)

عام استعمال

باؤلے کتے یا دوسرے عام کتے کے کان کے علاج میں عام طور پر استعمال اور مفید ہے۔

عمومی علامات

باؤلے کتے کے کان کے باؤلے پن کا اندیشہ ہو۔
تکلیفات جو خواہش جماع کی زیادتی سے پیدا ہوں (خواہش جماع کو روکنے سے تکلیفات ہوں تو کو نیم)
ذہنی جذباتیت یا بے عزتی سے تکلیفات میں اضافہ ہو۔

تشخیصی دوسے کسی چیز سے منعکس ہو کر آنے والی تیز روشنی سے
یا چونڈھیا دینے والی روشنی سے (سٹر امونیم) کسی سیال چیز کا خیال
آنے پر، چھوٹے جانے سے یا ہوا کے جھونکے سے۔
ورد سر، باؤں یا دوسرے کتے کے کاٹے سے۔

تھوک، تار دار، لہیں دار، سخت، جھاگ دار منہ میں اور حلق میں
مسلل تھوکنے کے ساتھ (ہائڈراسٹس)
حلق میں ورد مسلل نکلنے کی خاموشی کے ساتھ (لیک کینٹم،

مرک)

نکلنے میں دشواری، غذا کی نالی میں سیال چیزوں کو نکلنے سے
انہیٹن، پانی نکلنے وقت کلا گھٹتا ہوا محسوس ہو۔

رحم کا اپنی جگہ سے گرنا، شرمگاہ میں ذکی الحسی۔

زیادتی :- پانی کو دیکھنے یا پانی کی آواز سے، چمک دار، چونڈھیا دینے
والی روشنی سے (سٹر امونیم) گاڑی کی سواری سے (کو کولس)،
سورج کی گرمی سے، جھپکنے سے۔

مصلح :- اگنیس کاسٹس، بیلاڈونا، سڈرن، فگیس سلوٹیکا، ہایوسیا،
لیکس، سٹر امونیم۔

طاقت :- ۳۰ طاقت اور اوپر۔

خصوصی علامات

- ۱۔ گہری ترقی کرنے والی اور دیرینہ بیماریاں ۔
- ۲۔ درد، جس میں زیادتی چار بجے شام سے آٹھ بجے رات تک ہو۔
- ۳۔ داہنی جانب ماؤف ہو جائے یا درد دائیں سے بائیں کو جائیں۔
- ۴۔ نحتنوں کی حرکت پکھے کی سی (اینیم ٹمارٹ)۔
- ۵۔ نذر خشک، ناک رات کے وقت بند ہو جائے۔ منہ سے سانس لینا پڑے۔
- ۶۔ ڈنٹھیریا، جھل داہنی درد سے بائیں کو جائے۔ زیادتی ٹھنڈی چیزیں پینے کے بعد ہو۔
- ۷۔ ماضیہ کی خرابیاں، ریاچ بچہ مجتمع ہو جائیں۔
- ۸۔ بھوک اچھی لیکن چند ہی لقموں کے بعد محسوس ہو کہ گلے تک بھرا گیا ہے۔
- ۹۔ پیٹ میں اونچی آواز سے گرگرٹا ہٹ ہو۔
- ۱۰۔ پیشاب میں سرخ ریت ۔
- ۱۱۔ بچہ پیشاب سے پہلے چلائے (بورکیں)۔
- ۱۲۔ بوڑھے افراد کی نامردی، بچہ خواہش جماع کے ساتھ لیکن ایسا نہ کیا گیاں ناممکن ہوں، دوران جماع سو جائے، انزال قبل از وقت۔

۱۳۔ مستورات میں شرمگاہ میں خشکی۔

عام استعمال

عام طور پر نظام ہضم کی خرابیوں اور جنسی کمزوری اور ضعف باہ میں مستعمل ہے۔ علاوہ بری حسب علامات مذکورہ ذیل کیفیات میں کارآمد ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض مغموم، رو دینے والا اور لا پرواہ ہو۔ سر میں درد، آنکھوں پر گویا سمیٹنی، کانوں میں کھجلی، مواد بہاؤ، سرد ہوا سے کان میں درد، سونگھنے کی قوت نہایت تیز، تجسیر خلق کے غدد کا درم جو داہنی طرف سے شروع ہو کر بائیں جانب کو جاتے۔

ماضیہ کمزور، معدہ میں سٹرن اور گٹ گڑا ہٹ، پاخانہ اور پیشاب مقدار میں کم۔ پیشاب کرنے سے قبل درد۔ مردوں میں خواہش جماع بہت کم، غصہ ناسل چھوٹا، ٹھنڈا اور ڈھیلا ہو جائے۔ مستورات کے حوض بکتر اور بکثرت ہوں، فرج سے ہوا کا اخراج، کثرت سیلان رحم مع درد کے داہنی طرف سے بائیں طرف۔

خشک کھانسی، دق، سیل مع کھانسی کے۔ گردن کی جاکڑن، کمر میں ریڑھ کے قریب درد۔

انگلیوں کے جوڑ اور سرے پر درد اور دم، کوہے میں، رانوں میں
 ابری میں اور پیر کے انگوٹھے میں درد، پاؤں سرد۔
 بنجار لرزہ کے ساتھ ہو۔
 جلد پر کھجلی تر یا ناسور۔

زیادتی :- چار بجے شام سے آٹھ بجے تک، کھانا کھانے کے بعد،
 ٹھنڈا کھانے پینے کے بعد، نکلین کھانے کے بعد۔
 کھی :- ٹھنڈک پانے پر، کپڑا اتار دینے سے، گرم کھانے یا پینے پر،
 کپڑا ڈھیلا کرنے پر۔

معاون :- چیلڈونیم، آئیوڈیم، اگنیشیا، اپیکاک، کالی آئیوڈائیڈ،
 پسائیلا، کاربوئیج۔

مخالف :- کافیا، نکس موسکاٹا (سلفر کے بعد لائیو پوڈیم کا استعمال
 نامناسب ہے)۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ طاقت تک نیز زیادہ اونچی طاقتیں۔

LILIUM TIG.

للیئم ٹیگ

خصوصی علامات

- ۱۔ سر کی چوٹی یعنی چاند پر وحشت کا احساس۔
- ۲۔ بے حد بے حوصلگی۔

۳۔ اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھتے تاکہ خواہش نفسانی دبی رہے۔

۴۔ بے مطلب تیز حرکات (ارد خنٹم ناثر یکیم)

۵۔ بار بار حاجت پیشاب کی۔

۶۔ نیچے دبائے والے احساس شکم میں اور پیڑ میں۔

۷۔ حیض، اورار، صرف اس وقت ہو جب مریض حرکت کرتی ہو۔

۸۔ احساس جیسے دل شکنجہ میں جکڑا گیا ہے (لیکے سس)

عام استعمال

اسہال، پیمیش، آنکھ و دل کے امراض، ہسٹیریا کی دھڑکن، تلوں کی تکالیف، اندام نہانی کی کھلیں، امراض رحم، پیشاب زیادہ آنا، دھڑکن، درد دل وغیرہ کے امراض میں مفید ہے۔ جسم کے بائیں جانب اس دوا کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ لیکے سس میں بھی ہوتا ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض پست ہمت ہو، رو دینے کو طبیعت چاہے بغیر رستے رہنا نہ جائے، یادداشت خراب، بے چینی، درد سر خاص کر دھمی تکالیف کے باعث۔ کبھی بائیں طرف کبھی دایہنی طرف، درد سر چاند پر بوجھ، جب دھمی تکالیف کم ہوں تب دماغی شرمع ہوں، گدی میں درد، خاموش نہ رہ سکے، خواہش نفسانی کو دبائے کے لئے کسی کام میں مشغول رہنا پڑے، تنہا رہنے سے گھبراہٹ ہو۔

نگاہ و منڈل، پڑھنے لکھنے کے بعد نظر کی کمزوری، ناک بند، ناک کو

زور سے ملے، داہنے کان میں درد، سونے کے وقت کان میں آوازیں
گرمی کی وجہ سے چہرہ تھماتیا ہوا، داہنی طرف کی گال کی ہڈی میں درد
اور داہنا نتھنا بند ہو، دانت سے لے کر کان تک درد ہو، زبان پر
زرد میل، رال بکثرت، داہنی طرف کی حلق کی گٹلی پھولی ہوئی۔

جھکی، تسلی، پیٹ میں کچھ سخت چیز گھومتی معلوم ہو، پیٹ پھولا ہوا
گڑگڑاہٹ، ایسا بوجھ معلوم ہو کہ ہر ایک چیز اندام تنہائی کی طرف
نکل جائے گی۔ پیڑ میں تھرتھراہٹ، ایسا معلوم ہو کہ پیڑ میں سے کچھ
لٹکا پڑتا ہے یا یہ کہ پیڑ کے تمام اعضاء باہر نکل جائیں گے۔ (میورکس)
سیا، ٹیک کینٹم،

مقعد پر بوجھ، متواتر پاخانہ کی حاجت، صبح کو اسہال، اس کے
ساتھ خروج رحم، نبض سخت پاخانہ، پیشاب برابر ہو اور پیشاب کی
نالی میں جھک ہو، صبح کو پیشاب دودھیا ہو، خصیتہ الرحم اور پیڑ کے
ریشوں میں کمزوری جس کے باعث رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے (ہیلونائس)
سیا

حیض جلد، مقدار میں کم، سیاہ متعفن، نلوں میں درد اور حس
نلوں کا درد ران تک جائے، خواہش جماع زیادہ۔

سینہ میں کسادٹ، داہنے پچھلی پٹے میں درد، دل میں پھپھار
دل کی رفتار بڑھی ہوئی قریباً ۱۵۰ سے ۱۸۰ تک ہو۔
لمفہ پیر، کمر گردن وغیرہ میں جلن، درد اور تشنچ۔

زیبادتی :- گرم مکان میں، دلجوئی سے۔
کھلی :- تازہ ہوا میں۔

مصلح :- ہیلونائس ، نکس و امیکا ، پلساٹیل ، پلائینیا ،
طاقت :- ۳۰ اور اوپر

LOBELIA INFLATA

لوبیلیا انفلاٹا

خصوصی علامات

- ۱۔ بھید متلی اور تپے ۔
- ۲۔ کالی کھانسی ، جس کے ساتھ سانس میں تنگی ہو اور دم گھٹنے کا اندیشہ ہو ۔
- ۳۔ تپے ، جس کے ساتھ چہرہ پسینہ سے شرابور ہو جائے ۔
- ۴۔ حمل کے دوران بھوک کی زیادتی اور مزمن تپے کی تکلیف اچھی خاصی بھوک کے ساتھ ، متلی کے ساتھ اور پسینہ کی زیادتی کے ساتھ ۔
- ۵۔ سینہ میں بو بھل پن اور دم کا احساس جس میں کمی تیز چلنے سے ہو ۔
- ۶۔ کمر میں بھید نوکی الحسی ، ذرا سا چھوٹا یا نرم تکیہ بھی برداشت نہ ہو سکے ۔

عام استعمال

یہ دوا تمباکو ، شراب اور چائے کے کثرت استعمال کے اثرات بہ

کو دور کرتی ہے۔ نیز باضمہ کی خرابی جو غم معده کی کمزوری پر مشتمل ہو یا شدید قسم کی متسلی، تپ، نقاہت، زرد روی، ٹھنڈے پسینے اور خشوک کی کثرت، قے الدم، بد بھمی کے باعث دردِ سر اور دماغ کو نافع ہے۔

عمومی علامات

خشک دہر جس کے باعث سینہ میں بوجھ اور رکاوٹ محسوس ہو، سینہ میں اجتماعِ خون ہو، تکلیف پھیپھڑے کے قاعدے میں شدت سے ہو، دل کی حرکت میں رکاوٹ۔

چوڑی کی پٹری ذکی الحس ہو اور مریض جھک کر بیٹھنے کے لئے مجبور ہو۔
پیشاب گھاڑھا سرخ رنگ کا ہو۔

جلد پر خارش سے امتلا پیدا ہو۔

زیادتی، تمباکو نوشی سے، سرد پانی سے، غسل اور حرکت سے کسمی، تیز چلنے سے، گرمی سے اور شام کو۔
طاقت پر عموماً، طاقت بہت متعل ہے۔

لیڈم پال

LEDUM PAL.

خصوصی علامات

- ۱۔ بال کے درد یا گٹھیا نیچے سے شروع ہوا اور اوپر کو چڑھے۔
- ۲۔ درد چھیننے والے، بستر کی گرمی سے اور کپڑا اوڑھنے سے بڑھیں۔
(مکسوریسی) کمی ہو جب پاؤں کو بریف کے پانی میں رکھا جائے۔
(سکیلی)
- ۳۔ تکلیفات ان لوگوں کی جو ہر وقت سردی محسوس کرتے ہوں۔ ہمیشہ سردی اور جاڑا محسوس کریں۔
- ۴۔ زخمی حصص چھونے سے ٹھنڈے معلوم ہوں۔
- ۵۔ سرخ پٹیاں یا گٹھیاں پیشانی اور رخساروں پر۔
- ۶۔ چوٹیں لگنے کے بعد مدت مزید تک بدنہی قائم رہے یا سہز نشان بن جائے۔

عام استعمال

درد، کثیروں مکوڑوں کا ڈنک مارنا یا کاٹنا، پٹیاں، بہاؤ، اکوتہ، چہرے پر مہاسے، پیروں میں درد گٹھیا، گرمی لانے، وجع مفاصل، بسہری، زخم وغیرہ میں مفید ہے۔

عمومی علامات

دورانِ سر درد سر، ٹوپی پہننے سے تکلیف بڑھ جائے۔
 آنکھ میں درد اور خون جاری ہو، مفاصل دردوں کے ساتھ متایبند
 بخساروں پر سرخ مہاسے اور پھنسیاں، چہرہ ذکا المحس۔
 پاؤں کے تلموؤں اور ایڑیوں میں سردی سے یا بھیگ جانے سے
 زخم، نوک دار آلات سے زخم، خاصہ جی طور پر مچھروں، بھڑوں کے
 لائن کے لئے بہترین دوا ہے۔
 زیادتی، رات کو، بستر کی گرمی سے۔
 کمی، سردی سے۔

معاون :- سیپا
 مخالف :- چائنا
 مصلح :- کیفنر، رٹاکس
 طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور اوپر۔

خصوصی علامات

- ۱۔ سن یاس کی تکلیفات
- ۲۔ بائیں جانب خصوصاً ماؤٹ ہو جائے ، تکلیفات بائیں جانب شروع ہوں اور دائیں جانب جائیں۔
- ۳۔ سجدہ کی المحسن چھونے سے ۔
- ۴۔ تمام علامات خصوصاً دماغی بڑھ جائیں ، نیند کے بعد یا تکلیفات کی زیادتی سے بیدار ہو جائے اور پھر تکلیف کی زیادتی میں ہی سو جائے ۔
- ۵۔ مریض بے حد باتوں ، ایک ایک لفظ سے کوئی سی کہانی لے بیٹھے ۔
- ۶۔ قبض ، مقدر کے چھتے میں سکرٹن کا احساس ۔
- ۷۔ حیض ٹھیک وقت پر ہوں اور حیض کے دوران دوسری تکالیف میں کمی ۔
- ۸۔ پنکھا ہلائے جانے کی خواہش لیکن آہستہ اور ذرا دور سے ۔
- ۹۔ پھوٹے ، کالہ منگل ، سیاہ بینگنی یا نیلے رنگ کے ۔
- ۱۰۔ بنجارہ ، جس میں زبان کانپے یا باہر نکالتے وقت نچلے داخول میں پھنس جاتے ۔

۱۱۔ ڈنٹھیر یا بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں جانب کو جائے، گرم چیز پینے سے زیادتی، تقیل اشیا کی نسبت زمینق اشیا ر نگلنے میں زیادہ درد اور تکلیف ہو۔

عام استعمال

حیض وقت سے یادر کے ساتھ، ٹائیفائیڈ، ہڈیان، بائیں جانب کافالج، جگندہ، بیتقان، پھوٹے، خفاق، خون کا نہ ہر یلایں، دمہ، ہیضہ اور جگر کی سوزش میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض ٹنگین، پست حوصلہ اور کامل الوجہ ہو۔

درد سر جن میں زیادتی حرکت سے، دبائے سے، جھکنے سے، لیٹنے سے یا نیند کے بعد۔

دماغی اکساہٹ، قریب قریب الہامی اور پیغمبری دعوے۔

بواسیر حیض کی کمی کے ساتھ یا سن یاس میں، مسول میں درد۔

سیلان خون کا میلان، چھوٹے چھوٹے زخموں سے جلد تر اور مقدار

میں زیادہ، خون سیاہ جو مغبد نہ ہو۔

سجھانہ نوبتی طور پر ہر سال آئے۔

مٹانہ میں گیند لڑھکنے کا احساس۔

زیادتی :- نیند کے بعد، نیند کے دوران، بائیں جانب، موسم بہار میں گرم غسل سے، دباؤ یا سکڑن سے، گرم چیزیں پینے سے، آنکھیں

بند کرنے سے ۔

کسی :- رطوبات کے یا حیض کے جاری ہونے سے ۔
معاون :- ہیرسلف ، لائیکوپوڈیم ، آئیوڈیم ، کالی آئیوڈائیڈ ، ٹارٹرک
ائیڈ ۔

مخالف :- ایسٹیک ایڈ ، امونیا کارب ، سیپیا ، ٹورکامارا ،
سورینم ، کاربانک ایڈ ۔

مصلح :- آرسینکیم ، بلیاڈرنا ، نکس و امیکا ، فاسفورک ایڈ ۔

طاقت :- ۱۲ طاقت سے ۲۰۰ تک اور اوپر ۔

MOSCHUS

ماسکس

خصوصی علامات

- ۱۔ ہسٹیریا اور اعصابیت جس کے ساتھ غمش کے درے ہوں ۔
- ۲۔ مریض کو نفس پر قابو نہ ہو ۔
- ۳۔ تشنجی اور عصبی نوعیت کی بچکی کے درے ۔
- ۴۔ مردوں میں خواہش جماع بہت بڑھی ہوئی ۔
- ۵۔ دماغ بیدار چینی کے ساتھ ، بہت زیادہ کھانسنے کے بعد بھی
بلغم خارج نہ کی جاسکے ۔

عام استعمال

یہ دوا دردِ دل، ذیابیطس، ذاتِ المجب، مرگی، دمر، غش، دل کی حرکت رک جانا، جھکی، ہسٹیریا اور نامردی وغیرہ میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

سر میں چکر اور درد
آنکھوں سے پانی بہے، آنکھیں اور پٹھیں موٹی، کانوں میں گڑگڑاہٹ
ناک سے خون جاری ہو۔
دور کی حالت میں منہ خشک، چہرے کے عضلات میں تشنج،
پیٹ میں درد، اچھار، متلی، پیڑوپ بوجھ اور دباؤ۔
نامردی، ایستادگی کے بغیر اعتلام، مستورات میں خواہش جماع
نیاوہ، حیض جلد اور بکثرت، حیض کے وقت درد اور غشی۔
سانس کی تکلیف، ہسٹیریا کے ساتھ تنگی تنفس، سینہ میں درد،
تشنج، دل کی دھڑکن، دل کے حوال میں لرزہ کی سی کیفیت، مریض کو
موت نظر آئے۔

مختلف اعضاء میں تشنج، کھنچاؤ اور درد
زیادتی :- ٹھنڈکے، ذرا سی بھی ٹھنڈی ہوا بہت سرد محسوس ہو۔
کھلی :- کھل ہوا میں، نلنے سے۔
معاون :- ایمر اگریٹیا۔

مصلح :- کیمبر، کافیا۔

طاقت :- پہل طاقت سے ۳ طاقت تک۔

MERCURIUS

مرکیوریس

خصوصی علامات

- ۱۔ ہڈیوں کی بیماریوں میں درد رات کے وقت بڑھے۔
- ۲۔ نزلہ جس میں زیادتی مرطوب موسم سے ہو۔
- ۳۔ منہ سے تھوک تانبے یا دھات کے سے ذائقے کا۔
- ۴۔ دفتھیر یا مقدار میں زیادہ اور متعفن تھوک کے ساتھ۔
- ۵۔ دفتھیر یا میں مسلسل خواہش نگلنے کی۔
- ۶۔ پیچش میں پاخانہ چھپا اور خون آمیز۔
- ۷۔ لیکوریا درد، جلن اور خارش جس میں ہمیشہ زیادتی رات کے وقت ہو۔

عام استعمال

ہڈیوں کے عوارض، نزلہ دہی تکالیف، دانتوں کا درد یا بوسیدہ ہونا، سانس، تھوک یا جسم بدبودار ہو، دفتھیر یا پیچش، سیلانِ رحم مسوڑھوں کے زخموں وغیرہ کی صورت میں مستعمل و مفید ہے۔

اگر چھوٹی طاقت میں دیا جائے تو درموں کو جلد پکا دیتا ہے ۔
مگر تحلیل نہیں کرتا ۔

عمومی علامات

مریض بات چیت بہت تیزی سے اور جلدی جلدی کرے معمولی سی محنت سے بے حد کمزوری اور لرزہ ہو جائے ۔

ہڈیوں کی بیماریاں، ٹھنڈے درم، وہ دنبل جو پکنے میں بہت مدت لیں ۔

ہر تکلیف میں پسینہ کی زیادتی ہو، لیکن پسینہ سے بھی سکون نہ ملے ۔

نزلہ بہت چھینکوں کے ساتھ، سوزشی، چھیل دینے والا، زردی مائل سبز، متعفن، مواد کی سی رطوبت، ناک کی ہڈیاں متورم ۔
دانت کا شدید درد جس میں کمی رخساروں کو ملنے سے ہو، دانتوں کا اوپر کا حصہ بوسیدہ اور جڑیں ٹھیک ہوں ۔

زبان بڑی موٹی جس میں دانتوں کے نشان بن جائیں ۔

طو فقیہ یا کی جھلی موٹی، سیلٹی رنگ کی، دہجی دار کنارے ۔

پیشاب، اینٹھن اور کمزوری کے ساتھ، پاخانہ کے بعد بھی سکون نہ ہو، زیادہ تر خون کا زیادہ اخراج ۔

زیادتی :- رات کے وقت، مرطوب موسم میں، موسم خزاں میں، گرم اور

ٹھنڈی مرطوب راتوں میں، داہنی جانب لیٹنے سے، پسینہ سے ۔

کمی :- آرام سے، جماع سے، روتنے سے ۔

معاون :- بڈیا گا۔

مصلح :- آر سینکم اہم، کاربوویج، کاسٹیکم، ہائیوسیمس، لائیو پوڈیم۔
طاقت :- ۳ سے ۲۰۰ تک اور اوپر۔

مرکبوریس بن آئیوڈائیڈ

MERCURIUS BINIODIDE

خصوصی علامات

۱۔ ڈفقیہریا اور اس سے متعلقہ تکالیف۔

عام استعمال

ڈفقیہریا میں خاق کی مخصوص ترین ادویہ میں شامل ہے۔

عمومی علامات

ڈفقیہریا اور غدودوں کی تکالیف، خاص کر بائیں جانب کی بیماری میں مستعمل ہے۔

تالوسیا ہی مائل اور سرخ ہو، ثقیل اور رقیق دونوں قسم کی اشیاء

نگلنا مریض کے لئے دشوار ہوتا ہے، خناق کی جھلی بہت ہلکی ہوتی ہے جسے آسانی سے اتارا جاسکتا ہے۔

وبائی سرخ بخار کے مریض جن کو تالو اور حلق کے غدودوں پر زخم ہوں، غدود بڑھے ہوئے، زرخرہ سے یا حلق میں اوپر سے سخت، سینہ بلیغم یا بلیغم کے نوٹھڑے۔ سانس کی نالی میں دق کا درم ہو۔

طاقت :- ۳۰ سے ۳۰ تک اور اونچی طاقتیں۔

مرکیوریس پروٹو آئیوڈائیڈ

MERCURIUS PROTO IODIDE

خصوصی علامات

۱۔ وفتھیر یا در اس سے متعلقہ عوارض۔

عام استعمال

۱۔ وفتھیر یا یعنی خناق میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔

عمومی علامات

۱۔ وفتھیر یا یعنی خناق اور حلق کی بیماریاں جبکہ گردن کے غدودوں میں

بہت درم ہو۔
 ڈھتھیر یا کی جھلی کی ابتداء پہلے دائیں جانب ہو یا اس جھلی کی زیادتی
 دائیں جانب ہو۔

گرم چیزوں کے پینے سے یا خلق کو نکلنے والے انداز پر حرکت
 دینے سے تکلیف میں شدت ہوتی ہے۔

زبان موٹی، جڑ کی طرف زرد میل کی تہ ہو (کالی بائیکرام) سونے
 جیسے زرد رنگ کی تہ ہو (نیٹرم قاس) زبان کی جڑ میں میلی یا سبزی مائل
 سیلٹی میل کی تہ ہو (نیٹرم سلف)

زبان کی نوک اور کنارے سرخ ہوں، خلق اور گردن کی داہنی جانب
 مرض کا زیادہ اثر ہو۔

آتشک جس میں دوسرے درجہ کی علامات ظاہر نہ ہوں، کنج ران
 کے غددوں میں درم جس میں پکنے کا میلان نہ ہو۔
 طاقت ۱۔ ۳ تا ۳۰ اور اونچی طاقتیں۔

MERCURIUS SOL.

مرکبو لیس سال

خصوصی علامات

- ۱۔ ناک سے سوزش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہو۔
- ۲۔ نکسیر، رات کے وقت، نیند کے دوران، ناک سے سیاہ منجمد
 تار نکلتی جاتی ہیں۔

۳۔ سوزاک، سبز مواد کا اخراج، جورات کو زیادہ ہو۔

عام استعمال

آتشکی عارض، سوزاک، پیچش، نزلہ کا دوسرا درجہ اور پیپٹائے عارض وغیرہ میں مستعمل و مفید ہے۔ علاوہ بریں جن عارض میں مزے وال کثرت بہنے کی علامت پائے جاتے ان میں بھی بھیجہ کارآمد ہے۔ مسوڑھوں میں پھونسنے کا میلان ہوتو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

عمومی علامات

کان سے خون ملی بدبو دار رطوبت کا اخراج اور شدید درد، کان کے بیرونی مخرج پر مسہ کی شکل کا بدگوشت پیدا ہونا۔ سوزاک، پیشاب کی نالی کے اگلے حصہ میں جلن، حشفہ گرم، متورم پھولا ہوا اور چھونے سے ذکی احساس ہو جو تندہست ہونے میں نہ آئے۔

بد کے نکلنے یا یک جانے کا اندیشہ

آتشکی بد کا ابتدائی درجہ، زخم گہرے، گول جو عضو کے اگلے حصہ یا حشفہ کو کھانے جاٹیں، خون بہے اور درد ہو، زردی مائل بدبو دار رطوبت خارج ہو۔

جلد پر شدید خارش جس رات کو بستر کی گرمی سے زیادتی ہو۔ زیادتی رات کو، مطلوب ٹھنڈی ہوا میں، کپڑا اتارنے سے، داہنی طرف لیٹنے سے، پسینہ آنے سے، بستر کی گرمی سے، کبھی بکھل ہوا میں، تیزی سے چلنے میں، کام کرنے میں، بستر

پر آرام کرنے میں ۔

معاون :- بیڈیاگا ۔

مخالف :- سلیشیا ۔

مصلح :- کیفر، بلاڈونا، کاربوئیج، سلفر، آرٹک، نکس و امیکا

سلیشیا، آئیوڈیم، لائیو پوڈیم، ٹاسفورس، ایکے سس ۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۳۰ طاقت تک اور ادنیٰ طاقتیں ۔

مرکیوریس سانی

MERCURIUS CYANIDE

خصوصی علامات

دقتھیر یا اس سے متعلقہ امراض ۔

عام استعمال

یہ دوا بھی دقتھیر یا غاق کی مخصوص دواؤں میں شامل ہے ۔

عمومی علامات

شدید قسم کا خناق یعنی ڈنٹھیریا، جس میں فوری اور حد سے زیادہ
مشابہت بھی ہو جائے، بے حد تیز نبض، مرض کی ابتداء ہی میں کمزوری
غضب کی ہو جائے اور کو لیپس (حالت کمال ضعف و مشابہت) کی
کیفیت ابتداء ہی میں پیدا ہو جائے۔ اول اول حلق میں سفید رطوبت
پیدا ہو۔ جو بعد میں سیاہی مائل ہو، تنفس بدبودار، ناک سے
جریان خون۔ بھوک نادر اور لعاب دہن پیدا ہو۔
طاقت :- ۶۰ سے ۳۰ ہر دو گھنٹہ بعد۔

MERCURIUS CORR.

مرکبہ لیس کار

خصوصی علامات

- ۱۔ انگیٹھن اور مروڑ میرنہ میں، پاخانہ آنے کے باوجود آرام نہ ہو۔
- ۲۔ پاخانہ مقدار میں کم، خون آمیز، چیچپا، بدبودار۔
- ۳۔ سوزاک و دھلہ درجہ، سبزی مائل مواد کا اخراج۔
- ۴۔ نندلاوی ورم کان کے درمیانی حصہ کا۔
- ۵۔ کان کی نالی بند، بہرائش۔

عام استعمال

پیمپش کی خصوصی ادویہ میں سے ہے۔ علاوہ برسی آتشک، سوزاک، خنازیری، مدحشیم، حمل کے دوران درفرگروہ، سوزش باریطون، نرطیک، جن امراض میں مرکبوریس سال کا آمد ہے، انہی عوارض کی علامات نسبتاً زیادہ شدید ہوں تو مرکبوریس کا رکی طالب ہونگی۔

عمومی علامات

آتشک عوارض، سوزش مواد والے زخم، گروہ کی بیماریاں۔
پیمپش اور موسم گرما میں لاحق ہونے والے آنتوں کے عوارض۔
پاخانہ مروڑ کے ساتھ گرم، آنتوں کی بلغمی جھلکیوں کے بہنے سے جمع ہوں اور ساتھ ہی شدید تونجی درد ہو۔

مثانہ میں تشنج اور پیشاب کی نالی میں شدید جلن کے ساتھ پیشاب آئے۔ گرم جلن دار، مقدار میں کم، قطرہ قطرہ، خون آمیز، البیومن ملا۔
آنکھوں اور کانوں کی بلغمی جھلکیاں نزلہ دہی عوارض کا نشکار ہوں۔
بچوں کے دست سہزی ماکھ، پیٹے ہوتے انڈے جیسے۔
زیادتی :- رات کو، شام کو، تیزابی استیاری سے، کھلی ہوا میں، بیرونی دباؤ سے، نکلنے سے، گہرا سانس لینے سے، حرکت سے، کسمی :- دہرا ہونے سے، اٹھنے سے، گرم پسینہ سے۔
مصلح :- سلیشیا، میرپلسف، نائٹرک ایسڈ۔
طاقت :- آلات انضمام کے مرن من نزلہ اور پیمپش میں ۲x یا ۳x

مستعمل و مفید ہے ۔

دیگر عوارض میں ۶ طاقت سے ۳۰ تک ۔

MILLEFOLIUM

ملی فولیم

خصوصی علامات

- ۱۔ چوٹ آنے کے بعد زخم سے بکثرت سیلانِ خون ۔
- ۲۔ سیلانِ خون جسم کے کسی مخرج سے، دہرے بغیر ۔
- ۳۔ حیض بکثرت ہواور زیارہ دنوں جاری ہے ۔

عام استعمال

عام طور پر سیلانِ خون کو روکنے کے لئے مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

ادوارِ خون ناک سے ، منہ سے ، پانخانہ سے ، بواسیر سے ، آنتوں سے ،
حیض بہت جلدی ، بکثرت اور بہت دیر تک ہے ۔
پیشاب کے راستے سے خون جاری ہو ۔
نسل میں منہ سے خون جاری ہو ، کھانسی میں خون آئے ۔

تکسیر زور سے ہے ۔
 بواسیر کا خون رک جانے پر منہ سے خون آنے لگے ۔
 زیادتی :- شام کے وقت ، رات کے وقت ۔
 مخالف :- کافیا ۔
 مصلح :- آرم میکولیٹم ۔
 طاقت :- در ٹنگر سے ۲۰۰ طاقت تک ۔

میڈورینم

MEDORRHINUM

خصوصی علامات

- ۱۔ بھید اعصابیت اور شدید تھکن اور تقاہت کے باعث تمام جسم پر لرزہ ۵۔
- ۲۔ ضعف اور ناتوانی کی کیفیت ۔
- ۳۔ بات بات پر رو دینے کا میلان ۔
- ۴۔ مختلف اشیاء خورد و نوش کی پہچان نہ کرنے والی خواہش ۔
- ۵۔ ٹانگوں اور پاؤں میں شدید بے چینی اور ریشہ (زنگم) ۔
- ۶۔ ہاتھوں اور پاؤں میں جلن (یکے کسے ، سلفر) ۔
- ۷۔ بڑی بڑی پھولی ہوئی گانٹھوں سے انگلیاں بد وضع ہو جائیں ۔

عام استعمال

مزمن سوزاک یا قے ہوتے سوزاک کے باعث لاحق ہونے والے عوارض کے لئے مخصوص تدرین دوا ہے ۔

عمومی علامات

سوزاک مادہ کے باعث جوڑوں کی مزمن سوزش ، وجع المفاصل ، نقرس اور امراض شماع ۔ نیز سوزاک نہر سے خواتین کے پیڑوں میں پانے عوارض ۔

تقریباً تمام نامزدہ میں دیکھن ہو ۔

رکٹ کے شکار سب سے قامت بچے جن کے جسم و دماغ کی نشوونما صحیح طور پر نہ ہو سکی ہو ۔

حافظہ کمزور ، وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو ۔

سجھار میں متواتر نیچے کی ہوا کی خواہش ، چہرے اور گردن سے

حرارت کی لہریں اٹھیں ، رات کو پسینے آئیں ، دق کا بھار ۔

زیادتی :- اپنے مرض کا خیال آنے پر صبح سے شام تک خشکی پر ،

آندھری اور طوفان سے ، خفیف حرکت سے ۔

کسی :- ساحل سمندر پر ، معدہ کے بل لیٹنے سے ، مطلوب آب و ہوا میں ۔

معاون :- سفر

مصلح :- اسپیکاک

طاقت :- صرف اونچی حالتیں مستعمل ہیں لیکن جلد جلد اور بار بار

نہ دہرائی جا میں ۔

MEZEREUM

مینزیریم

خصوصی علامات

۱۔ چیچک کے ٹیکے کے اشارات مابعد کے طور پر اکوتہ اور خارش والے
اجبار ۔

۲۔ سر پر موٹے چمڑے کا سا کھنڈ جس کے نیچے گاڑھا مواد جمع ہو ۔

عام استعمال

یہ دوا آتشکی و ختازیری علامات میں کام آتی ہے خصوصاً جبکہ پردہ
استخوان اور جلد جسم متبلائے مرض ہوں ۔

عمومی علامات

مریض مراق اور مایوسی کا شکار، لاپرواہ، بات بابت پر غصہ اور
پھریشیانی ۔

آتشک میں پائے کے بیجا استعمال سے پردہ استخوان کی سوزش
یا جوڑوں کے درد، مڈیوں پر گکٹیاں ۔

بوسیدہ دانتوں میں درد، دانت کو درد زیادہ ہو ۔

زخموں کے اور پے سفید موٹے پیڑیاں جن کے نیچے زرد سپ پھج ہو۔
بچہ کے چہرے پر تر ہنسیاں جن میں رات کو شدید کھلی ہو،
چہرہ سرخ اور سو جا ہوا۔

زیادتی :- سرد ہوا میں، رات کو، شام سے لے کر نیم شب تک
گرم غذا سے، چھوٹے سے، حرکت کرنے سے۔
کسی، کھل ہوا میں۔

مصلح :- ایجوٹائیٹ، کلکیریا، بلائیونیا، کیفیر، کال آئیوڈائیڈ،
مرکوریس، نکس و امیکا۔

طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰ تک اور سار پر۔

MELILOTUS

میلی لولس^ط

خصوصی علامات

- ۱۔ اجتماع خون جس کو سیلان خون سے سکون ہو۔
- ۲۔ شدید درمی یا اعصابی درد سر جسے نکسیر بہنے سے سکون ہو۔
- ۳۔ نکسیر سے قبل چہرہ پر شدید ترین سرخی، تمام ہٹ اور کن پٹیوں
میں تنگن۔
- ۴۔ کسی عضو سے سیلان خون سے قبل چہرہ پر شدید سرخی۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر ایسے اجتماع خون میں نافع ہے۔ جسے خون کے جاری ہو جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

عمومی علامات

کسی حصہ یا کسی عضو کی خون کی نالیوں میں اجتماع خون، بھراؤ یا ورم، تشنجی دور سے دانت نکلنے کے زمانہ میں، اعصابی بچوں میں، چھوٹے بچوں میں اینٹھن اور مرگی کے دورے۔
قبض، متعذ میں سکرٹن، درد اور پاخانہ دقت سے ہو، تپکن، بھراؤ۔ حاجت ندارد تا آنکہ پاخانہ کافی مقدار میں اندر اکٹھا نہ ہو جائے۔
زیادتی، برسات و تبدیلی موسم میں طوفان کی آمد پر، حرکت سے، چار بجے شام کو۔
طاقت :- ۱۰ ایک سے ۲۰ قطرے تک۔

MUREX

میورکس

خصوصی علامات

۱۔ آلات تناسل کو ذرا سا چھو دینے سے شدید شہوانی تحریک۔

۲۔ رحم میں پھوٹے کا سادہ۔

عام استعمال

عام طور پر مستورات کے عوارض گردن رحم کی خرابیاں، اسقاطِ حمل، حیض درد کے ساتھ ہونا، حیض کثرت سے ہونا، سیلانِ الرحم، ذریا ببطیس، مستورات میں خواہش جماع نہایت زیادہ، دورانِ حمل کی تکالیف اور خروجِ رحم وغیرہ میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

مریضہ زود رنج اور غمگین ہو۔
شام کے وقت پیٹ خالی معلوم ہو (سیدیا)
سن یا س کے زمانہ کی تکالیف (لیکے سس، سیدیا، سفیر)
رحم میں زخم جیسی دکھن، دھڑکن، شانہ اور کہنی میں درد، تفکاک
ٹانگوں میں کمزوری، جلد میں خشک، حیض بے قاعدہ، سیلانِ رحم نسلوانی
اعضاء لٹکے پڑتے ہیں جیسے بانہر نکل پڑیں گے۔
زیادتی :- نحیف چھوٹے سے۔
طاقت :- نیچلی طاقت میں مستعمل ہے۔

NAJA

ناجبا

خصوصی علامات

- ۱۔ ذہنی خرابی، خودکشی پر مائل رہے۔
- ۲۔ دل کی تکالیف جن کے ساتھ خشک کھانسی ہو۔
- ۳۔ بائیں خستہ الرحم میں عصبی درد کے ساتھ دھڑکن تیز ہو۔

عام استعمال

یہ دوا عام طور پر دل کے عوارض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

دل کا بڑھ جانا، خشک خراش دار کھانسی کے ساتھ، دل کی اندرونی جھلی میں سو جن ہو اور ساتھ ہی وجع المفاصل کی تکلیفات۔
دل میں شدید چھین کی دریں، دھڑکن بہت تیز، دم گھٹتا ہو اور بولنا دشوار ہو۔

درد سر نوبتی، بعض اوقات اس کے ساتھ دیرپہ میں بھی درد،
دل کی دھڑکن تیز، چہرہ نیلگوں، تپے۔

زیادتی :- غشیات کے استعمال سے ۔
 کھمی :- کھلی ہوا میں ، سیر کرنے یا سواری کرنے سے ۔
 مصلح :- امونیا ، ٹوبیکم ۔
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک ۔

NUX MOSCHATA

نکس موسکاٹا

خصوصی علامات

- ۱۔ جسم پر خشکی ، پسینہ شاذ و نادر آئے ۔
- ۲۔ تمام تکالیف میں غنودگی اور نیند کا غلبہ یا غشی کا میلان ۔
- ۳۔ تکالیف غنودگی یا نیند کا غلبہ پیدا کر دیں ۔
- ۴۔ منہ میں بجمد خشکی ، زبان اس قدر خشک کہ تالو سے چپک جائے ۔

عام استعمال

یہ دوا ان عوارض میں کامیاب ہوتی ہے جن کے ساتھ غنودگی ، نیند یا غشی کا میلان پایا جائے اور مختلف اعضاء میں بجمد خشکی ہو ۔

عمومی علامات

فردی طور پر مریض کمزور ، خیالات منتشر ، گھڑی میں خوش اور

گھڑی میں غم زدہ ، مزاج یکایک تبدیل ہوتا ہے ۔
 ہر غذا کے بعد پیٹ تن جائے ، آنتوں میں جلن اور خراش ، منہ
 اور گلا خشک ، ہر چیز پر بایح بن جائے ۔

حیض قبل از وقت اور بکثرت ، خون گاڑھا اور سیاہ ، نیند
 کے بعد گلا خشک اور کمر میں درد ہو ، حیض کی جگہ سفید سیلان ۔

خشک ہسٹیریکل کھانسی جب یکایک گلا بیٹھ جائے ۔

آنکھیں ، منہ ، گلا ، زبان بیکہ خشک ۔

اسہال ، موسم گرما میں یا موسم خزاں کے وبائی دست یا بچوں
 میں دانٹ نکلنے کے زمانہ میں یا خواتین کو چھل کے دوران دست ۔
 گاڑی میں سواری سے کمر درد ، جس پہلو لیٹے اس پہلو میں درد ہو ،
 جسم پر بستی زخم ہوں ۔

سنگار لرنہ کے ساتھ اور پیاس کے بغیر پینہ نہ آئے ۔

زیادتی :- ٹھنڈی تر ہوا سے ، سردی کھانے سے ، سرد پانی سے
 دھونے سے ، درد والی کرٹ لیٹنے سے ، حرکت سے ۔

کبھی :- گرمی سے ، خشک موسم سے ۔

مصلح :- کمیوند ، جلسی میم ، نکس و امیکا ، اوپیم ، ولیریانہ ،
 زنگم ۔

طاقت :- پہلی طاقت سے ۳۰ طاقت تک نیز ۲۰۰ طاقت

NUX VOMICA

نکس و امیرکا

خصوصی علامات

- ۱۔ مریض جھگڑالو، کینہ ور اور بد خواہ ہو یا دبلا پستلا، غصہ ور اور اعصابی طبیعت والا ہو۔
- ۲۔ بچہ ذکی الحس بیرونی اثرات، شور، خوشبو یا ت، روشنی یا رگ زنگ سے (نکس موسکٹا)
- ۳۔ معمولی تکلیفات بھی ناقابل برداشت ہوں (کمیوٹا)
- ۴۔ جو مریض پہلے ایو پیٹیک ادویہ استعمال کر چکے ہوں، ان کا علاج شروع کرنے کے لئے یہ ایک کار آمد دوا ہے، بشرطیکہ ہلش بھی ہو۔
- ۵۔ تشنجی دوسے ہوش و حواس کے ساتھ جذباتیت سے، چھوٹے سے یا حرکت سے۔
- ۶۔ دروزہ شدید دورہ والے جو پانخانہ پیشاب کی حاجت پیدا کریں۔

عام استعمال

یہ سب سے بڑی روزمرہ کی دوا ہے کیونکہ اس کی بہت

سی علامات بیشتر تمام امراض میں پائی جاتی ہیں ۔

عمومی علامات

سر میں چکر کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد، درد سر اور اس کے ساتھ متلی خاص کر کھانے کی خرابی کے باعث ۔
صبح کو آنکھوں کے پوٹے چپک جاتیں، صبح سے دوپہر تک روشنی برداشت نہ ہو اور سہ پہر کو مریض مزے سے دیکھے ۔

صبح کے وقت کانوں میں گرگڑاہٹ اور درد ۔

زکام ناک سے دن میں بہتا رہے اور رات کو خشک ہو جائے ۔

دانتوں، مسوڑھوں اور چہرہ کی ہڈیوں میں درد ۔

کھانسی جو ٹھنڈی ہو اسے یا منت مشقت سے زیادہ ہو ۔
! منہ کا ذائقہ کڑوا، صبح کو کڑے کھٹے ڈسکار، بھوک ہو مگر کھانے کو جی نہ چلے، کھانے کے بعد متلی، حاملہ کی متلی، معدہ میں دباکے سے درد، پیٹ میں جلن، حوال جگر میں کوچن ۔

دائمی قبض، اجابت ناممکن ہو، پیمیش، ناف کے نیچے درد، مقعد بوجھل، پاخانہ میں خون اور آڑوں ہو، بواسیر بادی یا خونی ۔
پیشاب کم یا جلتا ہوا، درد کے ساتھ، درد گردہ جو اعضا تناسل اور ٹانگ تک ہو ۔

قرطہ میں درد داہنی جانب، حیض بے قاعدہ، کبھی جلدی، کبھی

دیر سے کبھی بہت کم کبھی بکثرت، سفید سیلان و رحم درد کے
ساتھ، اور اٹھنے یا دباؤ ڈالنے سے خروجِ رحم۔

خشک کھانسی آدھی رات کے بعد

ماقہ پیروں کی یکایک ناخاتق صبح کے وقت، یا سُن ہو
جائیں، چلنے میں ٹخنے آواز دیں۔

سُخارِ لزرہ کے ساتھ، سُخار کے دورانِ فمِ معدہ پر کچھ حصّہ
چھونے سے سرد معلوم ہو۔

زیادتی :- صبح کے وقت، دماغی محنت سے، کھانے سے،

یا زیادہ کھانے کے بعد، مصالحہ دار، منشی اشیار، چھوٹے سے
شور و غصّہ سے، خشک موسم سے۔

کمی :- شام کو، آرام سے، لیٹنے سے، فمِ اوتر موسم سے

معاون :- کلکیریا، کالی کارب، سیپیا، سلفر۔

مخالف :- ایک ایڈ، اگنیشیا، زرنک، سٹیفم۔

مصلح :- ایکونائٹ، کیمر، کیوملا، کافیا، اگنیشیا،

پلسا ٹیلا۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ تک اور اوپر۔

نازک مزاج افراد کو یہ دوا صبح کو نہار منہ نہ دینا چاہیے۔

اور نہ ہی کھانا کھاتے یا دماغی محنت کے فوراً بعد دینا چاہیے۔

اس کے استعمال کے بعد بھی کچھ کھانا پینا یا دماغی کام دو

گھنٹہ کے وقفہ سے ہونا چاہیے۔ اس کے استعمال کا بہترین

وقت سونے سے کچھ پہلے یا چار گھنٹہ قبل ہے ۔

NATRUM SULPH.

نیٹرم سلفٹ

خصوصی علامات

- ۱۔ تکالیف جو موسم کی یا ماحول کی مرطوبیت سے پیدا ہوں یا بڑھیں ۔
- ۲۔ مریضہ پست حوصلہ ہو، خوش کن گانے سے بھی غم زدہ ہو جائے ۔
- ۳۔ دماغی چوٹیں ۔
- ۴۔ پوٹوں پر چھوٹے چھوٹے آبوں کی طرح دانے ۔
- ۵۔ دست، پہلی بار اسٹھنے پر یا پاؤں پر کھڑا ہونے پر ۔
- ۶۔ سوزاک، سبزی مائل زرد، بے درد ۔
- ۷۔ سچوں میں تہہ در تہہ جو ہر مرطوب موسم کی تبدیلی کے ساتھ آئے ۔
- ۸۔ سائیکوٹک نمونیہ، بائیں ہیمیٹھ کے کا سچلا حصہ متاثر ہو ۔
- ۹۔ ورم دماغ کے باعث دماغ کی جڑ میں شدید کھینے اور نوخیزے والے درد ۔

عام استعمال

مرطوب آب و ہوا یا مرطوب مکان و نرم دار جگہ میں رہنے سے
یا صفراوی اثرات سے جو عوارض لاحق ہوں ان کے لئے خصوصی طور
پر مستعمل و مفید ہے، مریض کو موسم برسات برا لگتا ہے۔

عمومی علامات

اسہال جو علی الصبح زیادہ ہوں، پیٹ میں گر گر کا مہٹ ہوا اور ریا
بوتے ہوں، قھوڑا چلنے پھرنے سے اسہال زیادہ ہوں، دست آنے
کے ساتھ، ریح کے باعث پھٹ پھٹ کی آواز پیدا ہو۔
اسہال یا دمہ کی تکالیف موسم برسات میں زیادہ ہوں۔
مزمن دمہ میں تر کھانسی ہو، سینہ کے بائیں جانب دکھن ہو،
جس کے باعث مریض کو اٹھ کمر بیٹھا پڑے۔
زیادتی :- بائیں طرف لیٹنے سے، نمی سے، نرم دار موسم سے۔
کمی :- خشک موسم سے، دبانے سے، پہلو بدلتے سے۔
معاون :- آر سینیکم البم، حقو جا، بیلا ڈونا، فیرم مٹیلیکم، فاسفورس،
نیزم میور۔

طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک

NATRUM MUR.

نیرم میور^ط

خصوصی علامات

- ۱۔ کمٹی خون اور جگر کی ہوئی مزاجی کیفیت رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے۔
- ۲۔ بے حد لاغری، باوجود اچھی غذا کھانے پینے کے۔
- ۳۔ درد سر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔
- ۴۔ درد سر جو آنکھوں میں دھندلا پن کے ساتھ شروع ہو۔
- ۵۔ زبان پر نقشہ سایا سرخ بکھرے ہوئے چٹے۔
- ۶۔ اثرات نمک کے زیادہ استعمال کے۔
- ۷۔ بخار کے آبلے موتیوں کی طرح۔

عام استعمال

خون کی کمی، نوبتی بخار، شدید قبض، مزمن درد سر،
منہ ہونٹوں یا زبان کی خشکی یا سن ہو جانا، اچھی سے اچھی
غذا جسم کو طاقت نہ پہنچائے، ہاضمہ اور پیٹ کی خرابیاں
یہ کیفیات ہوں تو مستعمل و مفید ہے۔ مالنخولیا، وہم، مایوسی

استسقا، سیلان الرحم وغیرہ میں بھی حسب علامات نافع ہے۔

عمومی علامات

طبیعت گری رہنا، بد مزاجی، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو، سر چکرائے، ذہن میں الجھاؤ، سر کے بال گریں۔
پیوٹوں میں بے حد سرخی اور دکھن، آنکھوں سے پانی گرے۔
کانوں میں درد اور کوچن، بھنبھناہٹ، کھنکھناہٹ،
کان سے لے کر گردن اور کندھے تک درد۔
ناک کی ہڈی میں درد، ناک پر دانے۔
ہونٹ سوچھے ہوئے، آبلے پڑے ہوئے، ہونٹ
چٹخے ہوئے، زبان بھاری اور آبلہ دار، جلندار، نصف
زبان سن اور جکڑی ہوئی۔ مسوڑھوں سے خون آئے۔
دانت میں درد جو ہوا لگنے سے بڑھے۔
ہاضمہ خراب، خُم معدہ میں دکھن۔
پاخاز سخت قبض کے ساتھ یا پھر تپلے دست پانی جیسے۔
مردوں میں خواہش جماع زیادہ مستورات میں حیض کی
خرابیاں اور سیلان الرحم۔
خشک نزلہ، صبح کو بلغم گرے۔
پلیٹھ، ہاتھ، پیر یا کرہوں میں کمزوری سوجن جکڑن یا
درد۔ عرصہ تک رہنے والے سخت لرزہ کے ساتھ بخار۔
زیادتی، دس یا گیارہ بجے صبح گرمی سے، سمندری ہوا

سے ، بات چیت یا مشقت سے ۔
 کمی :- کھلی ہوا میں ، ٹھنڈے پانی سے دھونے سے
 بیٹھنے سے ، فاقہ کرنے سے ۔

معاون :- ایپس ، کیپسی کم ، سپیا ، اگنیشیا ۔
 مصلح :- آر سینکم البم ، کیمفر ۔
 طاقت :- ۳ سے ۳۰ ، ۲۰۰ اور اوپر ۔

GNAPHALIUM

نیفالیلم

خصوصی علامات

- ۱۔ عرق النسار (سنگڑی کا درد) جس متاثرہ حصہ جسم میں سن ہونے کا میلان ہو ۔
- ۲۔ پیڑ بھرا بھرا اور بوجھل محسوس ہو ۔ حیض وقت سے آئے ۔
- ۳۔ کولہے سے لے کر ٹخنے تک کے عصب میں شدید درد
 یکے بعد دیگرے سن ہونے اور درد کا میلان ۔

عام استعمال

یہ دوا خصوصی طور پر عرق النسار اور وجع المفاصل میں مستعمل ہے ۔

عمومی علامات

عرق انساں جبکہ عضو مٹوٹ میں درد کے ساتھ سُن ہو جانا بھی ہو۔
وجع المفاصل اور صبح کے اسہال۔

دونوں طرف رنخساروں کی ہڈی میں یہ کہہ کر درد ہو۔
پیٹ کے مختلف حصوں میں تو لنجی درد، بچوں میں ہیفہ کی
قسم کے دست اور تپ، مثانہ کی غدود میں اشتعال۔
مستورات کے پیڑ میں ایسا معلوم ہو کر بھرا ہوا ہے اور
بوجھ ہو، حیض درد اور کمی کے ساتھ۔

کمر میں مزمن درد، پیٹھ کی طرف سہارا لگانے سے درد کم
ہو۔ کمر میں درد اور سُن ہو جانا، پیڑ کے نیچے حصہ پر بوجھ بہتر
میں لیٹنے پر پنڈلیوں، ٹانگوں اور پیر میں تشنجی درد ہو، شمنوں کے
جوڑ اور ٹانگوں میں وجع مفاصل۔ پنڈلی اور پیر میں بار بار درد
ہوں، پاؤں کے پنجے میں گٹھیاوی درد، ٹانگیں پیٹ کی طرف سکیڑ
لینے سے افاتہ محسوس ہو۔ گٹھیا کے باعث ہڈی کا بڑھ جانا، ران کے
اندرونی جانب عصبی درد، جوڑوں میں درد جیسے ان میں روغنیت کا
نقدان ہو، کمر اور گردن کے پٹھوں میں مزمن مفاصلی درد۔
طاقت :- ۳ طاقت سے ۲۰ طاقت تک متعل ہے۔

VERBASCUM

درہسکم

تخصوصی علامات

- ۱۔ نزلہ وزکام جس کے ساتھ فوجی درد اعصاب ہو۔
- ۲۔ چہرے کے عصبی درد جیسے متاثرہ حصے کچلے جاتے ہوں۔
- ۳۔ آواز کا بیٹھ جانا۔
- ۴۔ پیشاب کا غیر ارادی طوبہ پر اخراج۔
- ۵۔ مائیکوں کے جوڑوں میں سختی اور دھکن۔

عام استعمال

یہ دوا کانوں، نظام تنفس اور مثانہ سے تعلق رکھنے والے اعصاب کے عوارض میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

چہرے کی ہڈیوں میں اعصابی درد، ایسا معلوم ہو کہ کسی نے ہڈیوں کو کھیل دیا، بولنے، جھکنے اور حرارت کی تبدیلی سے درد زیادہ ہو گا۔ کان میں درد، بہرا پن، بواسیریں، آواز بیٹھی ہوئی، رات کو کھانسی آئے، دمہ، پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکا کرے۔

درد سر، خشک کھانسی، آواز بیٹھ جانے میں مفید ہوتی ہے۔
 معنوں کے اوپر درد، لڑکوں کا مزمن نزلہ اور کھانسی، دمہ میں
 بھی مفید ہوتی ہے۔ اسے مولین آئیل کی شکل میں بہرے پن کے
 لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ میں مویج کا درد، کھڑے ہونے میں دابنہ
 پیر کے تلوے میں تشنجی بوجھ جو کہ چلنے سے غائب ہو جائے۔
 کھانا کھانے کے بعد پیشاب بہت آئے، سچے بستر پہ پیشاب
 کہہ دیا کریں۔

دابنہ پیر میں، ٹخنے اور تلوے میں دکھن، ٹانگیں بھاہی،
 انگوٹھے سُن ہوں۔

زیادتی :- موسمی ٹمپریچر (درجہ حرارت) کی تبدیلی سے، گفتگو سے
 چھینکے سے، دانت بھینچنے سے، ۹ بجے صبح سے ۴ بجے شام
 تک۔

طاقت :- مدر ٹمپریچر اور چھوٹی طاقتیں۔

VERATRUM ALBUM

وربیرم البوم

خصوصی علامات

- ۱۔ امراض جن میں قوت حیات اور دوسرے جسمانی قوتوں جلد جلد کم ہوتے جا رہے ہوں، ممکن نقاہت مردی کی سی۔
- ۲۔ قریباً تمام تر کالیف کے ساتھ پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ۔
- ۳۔ چاند پر برف کے ڈھیلے کا احساس ٹھنڈک کے ساتھ (سیا)
- ۴۔ چہرہ پیلا، نیلا، آنکھیں اور چہرہ کھینچ جائے اور مردہ کی سی شکل بن جائے۔
- ۵۔ تہش اور فرحت بخش اشیا کی خواہش۔
- ۶۔ جسم کے کسی حصہ کی برف کی سی ٹھنڈک۔
- ۷۔ شدید قے زیادہ مقدار میں دستوں کے ساتھ۔
- ۸۔ رمی یا فاسد میوے یا بخاروں میں سجدہ سردی اور پیاس کے ساتھ چہرہ ٹھنڈا اور سردوں جیسا۔

عام استعمال

میضہ کا پہلا اور دوسرا درجہ، نمونہ، دمر، ہارنکائی ٹس، تپ محرقہ، میوے وغیرہ میں ہونے والی مردی کی سی نقاہت اور

ٹھنڈے پینے نیز جنوں، پرسوتی، دیوانگی وغیرہ متعدد عوارض میں حسب علامات مفید ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر دیوانگی کی کیفیت، ہر چیز کو کاٹنا چاہیے، مراقبہ در در سر متل اور قے کے ساتھ، دماغ کے اندر جلن لیکن سر پر سرد پسینہ، چاند پر سردی، سر کا بھاری پن، دبانے سے افاقہ ہو۔ آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، پیچھے مفلوج، دوہری نگاہ، تونڈی آنکھوں کے سامنے سیاہ نکتے اور چنگاریاں گھومیں۔

چہرہ سرد، اترا ہوا، نیلیوں، بد شکل، پیشانی پر سرد پسینہ۔ زبان سرخ، سوچی ہوئی یا سیاہ چٹخی ہوئی، حلق میں رکاوٹ یکایک نیز جلن اور کھرکھرا پن۔

ٹھنڈے مشروب نیز ترش اور مفرح اشیاء مثلاً پھل وغیرہ کی خواہش۔

متواتر متل اور قے، جس کے ساتھ تپے دست نہایت کمزور کرنے والے، معدہ میں جلن۔

تبض مقعد کے فعل نہ کرنے سے، سچوں میں تپے دست یا

سبز سیاہی مائل پاخانہ جس کے ساتھ چہرہ زرد ہو اور ٹھنڈے پینے آئیں۔

پیشاب سبزی مائل یا سرخی مائل قصور یا قصور۔

حیض کے وقت درد، تھکے اور دست مع سرد پینے کے۔
 دفعۃً کھانسی دم گھٹنے والی
 بنجارہ لرزہ کے ساتھ جو دیر تک رہے۔ اندرونی جلن اور باہر
 چہرہ، ہاتھ، پیر سرد اور ساتھ ہی ٹھنڈا لیس دار پینے۔
 مرض خواہ کچھ بھی ہو اگر ساتھ سردی کمزوری اور سرد لیس دار پینے
 موجود ہو تو وریٹرم البم کا خیال کرنا چاہیے۔
 زیادتی، حرکت سے، پینے سے، حیض کے قبل اور دوران میں،
 پانچانہ کے وقت، پینے کے وقت، ٹور سے۔
 معاون :- آرینیکا
 مصلح :- ایکونائٹ، آرسینکم، کیمفر، چائنا، سٹانی سیگیا،
 کافیا۔
 طاقت :- ۶ طاقت سے ۳۰ طاقت تک۔

VERATRUM VIRIDE

وریٹرم ویرائیڈ

خصوصی علامات

- ۱۔ درم اور احب تمام خون دماغ کی جڑ میں، سینہ میں، ریٹھ
 اور معدہ میں۔
- ۲۔ درمی سکتہ میں نبض مدہم، بھری ہوئی لوہے کی طرح سخت۔

- ۳۔ ورم دماغ کے ساتھ تشنجی دورے ۔
- ۴۔ ریڑھ اور دماغ کے ورم کے ساتھ ٹھنڈا چمچیا پسینہ ۔
- ۵۔ زبان سفید یا زرد اور بیچ میں سرخ لکیر ۔
- ۶۔ نبض بے قاعدہ ، مدہم ، نرم ، کمزور ۔

عام استعمال

حاد امراض جبکہ شریانوں میں خون کا جوش ہو یا اجتماع خون ہو، نبض تیز اور بھری ہوئی، اکثر پسینہ، ابکائیاں اور تپ بھی ہوتا تو یہ دوا کارآمد اور مفید ہوتی ہے ۔

عمومی علامات

دماغ میں اجتماع خون، سر ٹھٹھا ہوا محسوس ہو، خواہ یہ اجتماع خون کثرت خون کے باعث یا ٹو گنے اور ورم دماغ کے سبب ۔
 سر سام کا ابتدائی درجہ، ابکائیاں تپے ۔
 منویہ جس کے ساتھ معدہ کی اکسا ہٹ شامل ہو، پسینہ بکثرت ۔
 ٹوہ میں بھی اس دوا کا نمایاں اثر ہوتا ہے ۔
 شدید بانگائی شش اور ورم، سنجار تیز، ابکائی تپے ۔
 پر سوت میں پردہ صفاق کی یا خصیۃ الرحم کی سوزش، ورم رحم تشنجی چہرہ نیلا، ہندیان، متلی ۔
 ذات الخب، سوزش جگر، ورم گردہ، سوزش شانہ کا ابتدائی

درجہ۔
 بخار، صبح کو حارث کم شام کو تیز، گھٹنا بڑھا بار بار ی۔
 زیادتی، حرکت سے، صبح جاگنے پر، شام کے وقت۔
 کسی۔۔۔ کٹنے سے، دہانے سے۔
 طاقت،۔۔۔ طاقت سے، طاقت تک

VARIOLINUM

ویرلولینم

خصوصی علامات

۱۔ چیچک کا حملہ یا اندیشہ

عام استعمال

چیچک کے علاج کے لئے یا چیچک سے بچاؤ کے لئے مستعمل ہے۔

عمومی علامات

چیچک کا حملہ ہو چکا ہو یا اس کا احتمال ہو۔

گدی میں درد، پیوٹے سو جے ہوئے، بہل پن، فرمن نزلہ، بدن پر

آبلے۔

سانس لینے میں تکلیف، حلق بند محسوس ہو، کمر میں سخت درد
 رے چینی، درد کمر سے ہٹ کر پیڑوں میں چلا جائے۔
 کلائی میں بائی کا درد، ٹانگوں میں درد، قلعن، تیز سجار، مواد بھر
 آنے، بدبودار سینہ۔

مصلح :- اینٹی ٹارٹ، میلنڈیرینم، فلو جا، وکسینیم
 طاقت :- ۳۰ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک اور اوپر۔

HYPERICUM

ہائپرکیم

خصوصی علامات

- ۱۔ زخمی ہو جانے پر جھوگا کا اندیشہ۔
- ۲۔ بہت زیادہ حساس اعصاب کے مقام پر چوٹ یا زخم۔

عام استعمال

اعصابی ضرب یا زخم وغیرہ کے درد کے لئے مستعمل ہے۔

عمومی علامات

چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اعصاب کو سخت نقصان پہنچ جائے۔

ریٹھ اور دماغ میں ضرب آنے کے اثرات مابعد۔

کسی کیل، کانٹے یا نوکیلی چیز سے انگلیوں وغیرہ پر نخم ہو۔

ورم عصب کے ساتھ صلیب اور درد

کسی ضرب کے باعث درد سر یا ورم دماغ۔

جلد پر پسینہ بکثرت، ضربات کے باعث بالچڑ۔

ذیادتی :- بند کمرے میں، کپڑے سے۔

کسی :- سر پیچھے کی طرف جھکانے سے۔

مصلح :- آر سینکیم البہم، کمیولا۔

خودراک :- پہلی طاقت سے ۶ طاقت تک۔

HYDRASTIS

ہائڈرا سٹس

خصوصی علامات

۱۔ تاردار رطوبتوں کے اخراج۔

۲۔ معدہ میں کمزوری کا احساس۔

۳۔ باضمہ اور جگر کی خرابیوں، کمزوری اور لاغری۔

عام استعمال

باضمہ کی خرابیوں، انزلاوی کیفیت، لیکوریا اور کنسر میں مستعمل ہے۔

عمومی علامات

نستھوں سے زرد رنگ گاڑھی رطوبت کا بکثرت اخراج جس میں تار موجود ہوں۔

نزلاوی رطوبت داغ سے حلق میں گرتی محسوس ہو، حلق یا تالو سے کھکھانے پر زرد رنگ کا تار دار بلغم خارج ہو، آنکھیں حلق یا پارہ اور طوریت آف پرمائش وغیرہ کے استعمال کے اثرات بد۔ شراب کے بکثرت استعمال سے صحت تباہ ہونے پر ماضیہ اور جگر کی خرابیاں۔

لیکوریہ یعنی سیلان الرحم، تار دار، گاڑھا، لیس دار، زرد جو شرمگاہ کے منہ سے لمبے لمبے تاروں کی طرح نکلتے رہتے (کال بائیکرام) شرمگاہ میں کھلیں۔

کینسر سخت، جلد میں چپکی ہوئی گانٹھ، جلد پر داغ اور دھبے، جلد سکڑی ہوئی، درد چاقو کے سے تیز کاٹنے والے۔ مستورات میں سرپستان اندر دھنسے ہوئے، دودھ پلانے والی عورتوں کا منہ آجاتے، زبان بڑی جس پر دانتوں کے نشان ہوں۔

زیادتی :- رات کو گرمی سے، نہانے سے، خشک تیز ہوا سے، کسی :- دبانے سے

مصلح :- سلفر
طاقت :- مد ٹیکچر سے ۲ طاقت تک۔

HYDROCOTYLE

ہائڈروکوٹائل

خصوصی علامات

- ۱۔ خدام کے اثرات
- ۲۔ مختلف جلدی عارض

عام استعمال

متعدد جلدی تکالیف میں عام طور پر مستعمل ہے۔

عمومی علامات

ذہنی طور پر مریض منہموم رہے، سر میں بیماری پن، تھکن اور طبیعت کا گرس رہنا۔

غذا سے نفرت، پیٹ میں بے یاج (دغغ)، جگر کی خرابی، مستورات کو اندام نہانی کے اندر گرمی معلوم ہو اور اوپر کھجلی اورد کو چن ہو۔

جلد پر زہر باد کی سی سرخی، سرخ چکوتے، جلد موٹی ہو گئی ہو، جلد پر پھٹنے پھٹ گئے ہوں، سینہ پر دانے نکلیں، تنوں میں ناقابل برداشت کھجلی، آتش کی مادہ ہو، کوڑھ یا نیل یا کمارہ۔

یہ دوائیں یا، کوڑھ، اکوتہ، جلد کا موٹا ہوجانا وغیرہ میں بہت کامیابی سے استعمال کی گئی ہے۔
 طاقت :- در شکر اور ۶ طاقت - نیز ۲۰۰ طاقت بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

HYOSCYAMUS

ہائوسیا مس

خصوصی علامات

- ۱۔ امراض جن میں دماغی چستی بڑھ جائے، لیکن کس قسم کی درمی کیفیت موجود نہ ہو۔
- ۲۔ جسم کے ہر عضلہ میں (آنکھوں سے پاؤں کے انگوٹھے تک) تشنج
- ۳۔ خوف، شک، ہو کس سازش کے ہونے کا۔
- ۴۔ شہوان جنون، بے حیائی، کپڑا نہ پہنے، ننگا ہے، یا ننگا ہو جائے۔
- ۵۔ کھانسی جو لیٹنے پر بڑھ جائے اور اٹھ کر بیٹھنے سے کم ہو۔
- ۶۔ شدید بیخوابی، چڑچڑاہٹ اور غصیلے انسانوں کی، جو کاروباری پریشانیوں کے باعث ہو۔
- ۷۔ سنجار جو جلد ہی ٹائیفاؤڈ بن جائے۔

عام استعمال

اس دوا کا اثر اعصاب پر ہوتا ہے، مریض مایوسیا کی محسوس تصویر ہو، طبیعت جھگڑا اور مضبوط الحواس بے شرم اور بے حیا ہو، پیٹھوں میں اینٹھن، سرسامی حالت اور اعصاب کا کمزوری سے متعلقہ عوارض میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

بچوں میں تشنجی دورے، خوف یا آنٹوں میں کیڑوں کے باعث ہشیر یا بالندہ والا نڈیان، مریض بے چینی کے ساتھ بستر سے کود پڑے اور بھاگنے کی کوشش کرے۔ سوالات کا جواب بالکل مہمل اور بے تکلف، خیال کرے کہ وہ غلط مقام پر ہے، خیال کاموں کے متعلق بات چیت کرے۔

خوف، اکیلا ہونے سے، زبردستی جانے کا، کاٹے جانے کا۔ اثرات بد محبت ناکام ہونے کے، جسد، عقدہ، بے تکی بات چیت اکثر اس کے بعد مرگی ہو۔

شہوان جنون، تنگا پڑا ہے اور بک بک کرے۔ فالج مشانہ، وضع حمل کے بعد، پیشاب کے رک جانے کے ساتھ۔ بنجار میں سرسامی کیفیت، ہوا میں اثر تے ذرات کو پکڑے یا بستر کو نوچے۔

زیادتی :- رات کو حیض کے دوران، کھانے کے بعد، لیٹنے سے۔
کسی :- بھکنے سے۔

مصلح :- اینکاسیڈ، بلاڈونا، چائنا، سٹرامونیم۔
طاقت :- ۶ طاقت سے ۲۰۰ طاقت تک۔

HEPAR SULPH.

ہیپر سلفر

خصوصی علامات

- ۱۔ ذرا سی چوٹ بھی پک جائے۔
- ۲۔ پیشاب کی دھار بہت آہستہ آہستہ بغیر زور یا طاقت کے نکلے۔
- ۳۔ ذکی الحسی جسمانی اور دماغی۔
- ۴۔ حد سے زیادہ ذکی الحسی ٹھنڈی ہوا سے۔
- ۵۔ جلد میں ذکی الحسی چھونے سے یا کپڑا مس، ہونے سے۔

عام استعمال

جہاں پیپ خارج کمرنی مقصود ہو، یہ دوا پیپ بننے کو روکتی

بھی ہے۔ مگر جب پیپ پڑ گئی ہو تو اسے جلد خارج کر کے زخم کو مندل کرتی ہے۔ نرلی درد سر، نمونہ، خفاق، سرخ بخار کے بعد استسقاء ہو، لوزتین کا برر جانا، پرانہ آشکی عوارض، جگر کا بڑھ جانا، بواسیر آنکھوں کے امراض غددوں کے عوارض اور پائے کے استعمال کے برے اثرات مابعد وغیرہ کے لئے مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

مریض شام کے وقت افسردہ ہو، معمولی سی بات سے رنجیدہ ہو جائے۔ رونے پر آمادہ ہو۔

سر میں خاص کر داہنی کن پٹی میں میخ ٹھونکنے کا سادرد، ناک کی جڑ میں درد، سر کے بال گر کر کنچ ہو رہا ہو، سر پر کھجلی والے دانے آنکھوں میں ورم اور درد۔

کان سے بدبودار پیپ خارج ہو۔

چہرے کی ہڈیوں میں چھونے سے درد ہو، زہر بادی چھالے باچھول میں۔

مسوڑھوں سے آسانی خون نکل پڑے، دانت میں درد جو گرم کمرے میں یا دبانے سے زیادہ ہو۔

ترکش اور مصالحمہ دار اشیاء کی رغبت، مرغن اشیاء سے نفرت پیٹ میں ریح کا اجتماع، ران کے غدد میں سوجن۔

پتلا پاخانہ بھی وقت سے خارج ہو، دست پتلے، غیر مضہم شدہ،

سفید یا مٹی کے رنگ کے پافانے۔ پیشاب جلن کے ساتھ آئے، پیشاب
جلن کے ساتھ آئے، پیشاب کی نالی کا منہ متورم اور پیپ آئے۔
خشک کھانسی۔ ذات الخشب میں کھانسی صبح کو زیادہ ہو۔
بسہری کا ابتدائی درجہ، بغل کی گلیٹیوں کا پکنا۔

لرزہ و تپ پیاس کے بغیر یا پیاس کے ساتھ، ذرا سی حرکت
پر پسینہ آجائے۔

جلد ناتندرست، خفیف چوڑ بھی پک جائے۔
زیادتی :- درد کے پہلو لیٹنے سے، ٹھنڈی ہوا سے، کپڑا اتارنے سے،
چھونے سے۔

کمی :- گرمی سے، کپڑا لیٹنے سے خاص کر سر کو، کھلنے کے بعد۔

معاون :- کیلنڈولا

مصلح :- ایسٹیک ایسڈ، بیل ڈونا، کیمومیل، سلیشیا۔

طاقت :- اسے ۲۰۰ گم (چھوٹی طاقتیں پھوڑوں کو پکاتی ہیں۔ اور
بڑی طاقتیں میٹاتی ہیں۔)

تخصّوصی علامات

- ۱۔ ہڈیوں کی سوزش، اجار یا سرطان
- ۲۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی تکالیف

عام استعمال

جیڑوں، مسوڑھوں اور دانتوں کے عوارض میں عام طور پر مستعمل ہے اور مفید بھی۔

عمومی علامات

مسوڑھوں کے پھوٹے، ہڈی کا غیر معمولی اجار، دانت نکلنے کی تکلیف، ہڈیوں کا نتھرتا یعنی سخت ہو جانا، ہڈیوں کی سوزش، ہڈیوں کے سرطان اور ہر قسم کی رسولیاں۔

ناک کی ہڈی میں زخم، کھائے ہوئے دانت کی وجہ سے چہرہ میں عصبی درد ہوتے ہوں۔ دانت درد کے ہمراہ جیڑے کے قریب سوزش ہو،

جہڑے کی پڑی بٹھ گئی ہو، مسوڑھوں میں پھوٹا ہو، گردن کے غدد بڑھے ہوئے اور سخت ہوں۔

طاقت :- چھوٹی طاقتیں ہی عام طور پر مستعمل ہیں۔ اس کا معین بھی بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

HAMAMELIS

ہیما میلس

خصوصی علامات

- ۱۔ وریدوں میں درم آنے کا میلان، ماؤنڈ حصص میں چوٹ لگنے کا سا اور پھوٹے کا سا درد۔
- ۲۔ چوڑوں سے آشوبِ چشم، آنکھوں میں شدید پھوٹے کا سا درد۔
- ۳۔ سیاہ رنگ کا سیلانِ خون جسم کے کسی مخرج سے۔

عام استعمال

جسم کے کسی بھی مخرج سے وریدی (سیاہ) سیلانِ خون ہو تو یہ دوا مستعمل و مفید ہوتی ہے۔ علامہ بریں استقاطِ حمل کے سیلانِ خون کو روکنے کے لئے اور خونی بواسیر کے لئے بہت کارآمد ہے۔

عمومی علامات

سر میں درد جس کے ساتھ غفلت ہو، گردن، ماتھا اور سر بو بھل
معلوم ہو، آنکھ کے پردے پر خون کا اجتماع۔

ناک سے خون کا بکثرت استعمال، جس سے دماغ ہلکا ہو۔
حلق کے غدود سوجھ ہوئے ہوں، مسوڑھے سوجھ ہوئے ہوں، جن
سے خون نکلے۔

پیشاب سے خون جاری ہو، گردوں میں اجتماع خون، قوط
کا دم، قوط کی رگ میں درد ہو جو قوطے سے ران تک ہو۔
حیض چمک دار خون والا جو جم نہ سکے۔

پھیپھڑوں سے خون آنا، کھانسی کے ساتھ خون جیسے ذائقہ والا
بلغم خارج ہو۔

رگوں کا اجتماع خون سے پھول جانا اور ان سے ادرار خون،
بواسیر، دکھن اور درد والی، خونی بواسیر۔

زیادتی :- گرم ہوا سے، تر ہوا سے، ٹیٹنے سے، دوپہر کے
بعد، آگے جھکنے سے۔

کسی :- شام کو گھرتے باہر۔

معاون :- فیرم ٹیلیکیم۔

مصلح :- آر نیکا، کیفر، چائنا، پیسا ٹیلدا۔

طاقت :- مدد بخیر سے ۳۰ طاقت تک۔

EUPATORIUM PERF.

یوپٹیوریم پرف

خصوصی علامات

- ۱۔ شہابیوں کی صحت کی تباہ شدہ کیفیت ۔
- ۲۔ تمام جسم میں چوٹ کا سا احساس یا ایسا معلوم ہو کہ تمام جسم ٹوٹا ہوا ہے ۔
- ۳۔ ٹہریوں کے درد، پیٹھ میں، سر میں، سینہ میں ۔
- ۴۔ آنکھوں کی تپلیوں میں درد بھرا چھوٹے کا سا درد ۔
- ۵۔ زکام جس کے ساتھ ٹہری ٹہری میں درد ہو ۔
- ۶۔ سنجار جس کے ساتھ ٹہریوں میں درد ہو ۔

عام استعمال

نقرس، انفلوئنزا، ایسے عوارض کے لئے مستعمل و مفید ہے جن میں ٹہریاں اور پسلیاں درد کریں، سینہ بہت کم یا بالکل نہ آتا ہو ۔

عمومی علامات

بوڑھے آدمیوں کی تکلیفات ۔
 صفراوی یا دبیر یا سبھروں کے لیے یا مسلسل حملوں سے پیدا شدہ تکلیفات
 کے لئے بھی مفید ہے ۔
 یہ دوا آلات مضغ و جگر، ریشہ جات و بلغمی جھلیوں پر اثر کرتی ہے ۔

سر، آنکھ، ناک، اور دوسرے اندر دکھن، ہوا میں نکلنے سے زیادہ ہو، روزانہ صبح
 کو متلی اور در دوسر ہو، آنکھ کے ڈھیلے میں دکھن (برائیونیا، سسی سی فیوگا) نشہ
 برداشت نہ ہو (ایکونائیٹ بیلڈونا، مرکیورس) زکام چھینکیں (ایکونائیٹ،
 سنگونیریا) ہڈیوں میں سخت درد ۔

ٹھنڈے پانی کی پیاس (ایکونائیٹ، آرسینکم ایلم، برائیونیا) متلی اور
 غذا کی قے (ایپیکا) صفرا کی قے ہو (آرسینکم ایلم، پاڈوفاٹلم) قے کے قبل
 پیاس ہو، ہر دفعہ پانی پینے کے بعد قے ہو (فاسفورس، سیلیشیا)

گلا پڑا ہو (کاربوریک، ہیدیر، فاسفورس) شام کو ہک ہک کرنے والی
 کھانسی، کھانسی کے ساتھ سینہ میں دکھن ۔

گردن پیٹھ، ہاتھ، پیر، گردن اور گدی میں درد (جیلیڈونیم) کمر میں چوٹ
 کا درد (آرنیکا) کل جسم میں ایسا شدید درد کہ گویا گویا ٹپٹا گیا ہے (آرنیکا) کلائی
 میں ایسا درد کہ گویا اکھڑ گئی ہے (برائیونیا، کلکیریا، رٹاکس)

بخار، سردی کم لگے پھر بھی لرزہ بہت ہو، کمر اور اعضا میں دکھن (سٹاکس)
 لرزے کے بعد قے، لرزہ کے بہت پہلے پیاس شروع ہو اور لرزہ اور

تپ میں برابر جاری رہے۔ کپکپی اور بدن کی دکھن زیادہ ہو، پسینہ نہ دارد۔
یہ دوا انفلوئنزا میں، لرزہ والے بخار میں انتہائی دکھن، نزلہ وغیرہ
کی حالت میں بہت مفید ہے۔

لرزہ والا بخار جو کہ روزانہ ۷ بجے سے ۹ بجے تک آئے اور دوسرے
روز دوپہر کو آئے، جسم میں درد اس قدر زیادہ ہو کہ کل جسم کو ٹاپٹاپا ہوا محسوس
ہو جیسے ہڈی ہڈی ٹوٹی جاتی ہے، لرزہ کے اختتام پر اور بخار سے پہلے
قتے ہو، درد سر شدید ہو، پسینہ بہت کم آئے یا بالکل نہ آئے، انفلوئنزا یعنی
نزلہ والا بخار جس میں کہ بدن میں سخت درد ہو، آنکھ کے ڈھیلے میں دکھن، سر
میں تپکن، گدی میں درد، پیاس، متلی اور صفر اکی تھے، ہچکلی، زکام، چھینکیں،
گلا پڑا ہوا، کھانسی اور سینہ میں دکھن، رات کو کھانسی زیادہ ہو، کمر ہاتھ
اور پیر الغرض کل جسم کے گوشت میں درد ہو۔

زیادتی :- نوبت تیسرے یا ساتویں دن بائیں جانب
کمی :- بات چیت سے، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہونے سے۔
طاقت :- مدر نکچر سے ۳ طاقت تک۔

EUPHRASIA

یوفریشیا

خصوصی علامات

- ۱۔ تیز سوزش پیدا کرنے والے آنسو، بہنے والے زکام کے ساتھ۔
- ۲۔ آنکھ سے ہر وقت پانی بہے۔
- ۳۔ حیض درد بھرے جو صرف ایک گھنٹہ رہیں۔
- ۴۔ کھانسی کے دوران آنکھوں سے آنسوؤں کی زیادتی، کھانسی صرف دن کے وقت۔ (قیرم، نیٹرم میور)

عام استعمال

آلات تنفس کی بلغمی جھلی اور آنکھ اور ناک کی رطوباتی جھلیوں سے رطوبت کثرت سے جاری ہو، نزلہ، زکام کی کیفیت ہو، نیز آنکھوں کی مختلف تکالیف میں مستعمل و مفید ہے۔

عمومی علامات

آنکھ میں جلن اور پانی بہنا، آنکھوں سے پانی نکلے جو جلد کو کاٹتا

ہوا محسوس ہو، آنکھوں میں کھجلی اور جلن (مرکیوریس اور سلفر)
 نگاہ دھندلی ہو، ایسا معلوم ہو کہ آنکھ کے سامنے پردہ پڑا ہے (کاسٹیکم،
 مرکیوریس، پٹرولیم، پلسٹیل، سلفر) ایسا معلوم ہو کہ آنکھ کے کناروں
 پر کیچڑ بھرا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے نگاہ دھندلی ہو جائے اور مجبوراً
 پلکوں کو دبانا پڑے۔ (کروکس، پلسٹیل) ایسا معلوم ہو کہ آنکھ پر بال
 لٹکا ہوا ہے۔ جس کو مٹانا چاہئے۔ روشنی کی طرف دیکھنا جاسکے۔

شدید زکام، گاڑھی رطوبت بکثرت ناک سے خارج ہو (آرسینکم
 اہم مرکیوریس) اس کے ساتھ جلتے آنسو آنکھ سے بہیں۔ روشنی کی
 طرف دیکھنا جاسکے۔ شام اور رات کو تکلیف زیادہ ہو، زکام کے
 بغیر ہی بہت چھینکیں آئیں۔ (کیمومیل)

نزلہ کی وجہ سے آواز بگڑی ہوئی (ایکونائیٹ، کاربوویج، ہیرپرسلفر،
 فاسفورس) صبح کو اٹھنے پر کھانسی ہو اور کثرت سے بلغم نکلے سینے کے
 بیچ کی ہڈی کے نیچے درد۔

جاگنے میں اور کھلی ہوا میں جمائیاں آئیں۔ ہیرنگ صاحب کے
 آزمودہ علامات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوا آنکھ کے
 ہر قسم کے امراض میں خواہ چاہوں یا مزمن ہوں، مفید ہے۔ خاص
 علامات یہ ہیں۔

آنکھوں سے پانی بہتا ہو، آنکھوں میں چیچا کیچڑ جمع ہو، آنسو
 اور جلن، زکام میں درد، آنکھوں سے پانی بہے، زکام اور نزلہ میں
 آرسینکم اور مرکیوریس سے مشابہ ہے۔ انفلوئنزا میں بہت کارآمد
 ہوتی ہے۔ ایلیم سیپا اور یوفریشیا کے زکام میں یہ فرق ہے۔ کہ

یو فریشیا میں آنکھ سے خراش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔
لیکن ناک محفوظ رہتی ہے۔ اس کے برعکس ایلیم سیپا میں ناک سے
خراش پیدا کرنے والی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اور آنکھ بچی
رہتی ہے۔

قبض، حبض درد کے ساتھ قلیل، صرف ایک گھنٹہ یا ایک دن
رہے۔ اس کے ساتھ آشوب چشم بھی ہو، کھانسی، کالی کھانسی
خسرہ کی بیماری کا ابتدائی درجہ جس میں آنکھ کی تکلیف ہو۔

زیادتی :- صبح کوشام کو، مکان کے اندر، گرمی سے، روشنی سے
کمی :- قہو سے، اندھیرے میں کھانا کھانے سے، مکان کے باہر
گھومنے سے، سو کر اٹھنے کے بعد۔

معاون :- ایکونائٹ، کلکیریا، کونیم، نکس و امیکا، فاسفورس،
پلسا ٹیل، رٹاکس، سلیشیا۔

مصلح :- کیمفر، کاسٹیکم، پلسا ٹیل۔

طاقت :- ۳ سے ۲۰ طاقت تک۔



• ادارے کی نئی طبی اور جدید کتب

آرٹ آف ہومیوپیٹھی
Art Of Homoeopathy



سیلیکٹ میٹریا میڈیکا (انجمنی)



ایٹن، پی، کمپو، بوگر، بورک، کینٹ

آ کو پریشتر سے علاج



آ کو پنچر سے علاج



(چینی طریقہ علاج)

عابد کینٹ گائیڈ



پشاور بازار کتب
اردو بازار لاہور۔

Ph # 042-7660736

شیخ محمد بشیر امین سنہ

تقسیم کار